



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>





BIBLIOTHEEK GENT



0067048





025

HISTOIRE  
DES RECHERCHES  
SUR LA  
QUADRATURE  
DU CERCLE;

Ouvrage propre à instruire des découvertes réelles faites sur ce problème célèbre, & à servir de préservatif contre de nouveaux efforts pour le résoudre :

*Avec une Addition concernant les problèmes de la duplication du cube & de la trisection de l'angle.*



A P A R I S,

Chez CH. ANT. JOMBERT, Imprimeur-  
Libraire du Roi en son Artillerie, rue  
Dauphine, à l'Image Notre Dame.

---

M. DCC. LIV.

*Avec Approbation & Privilège du Roi.*







## PRÉFACE.

**I**L est dans les Sciences certaines recherches qu'on pourroit à juste titre appeller les écueils de l'esprit humain. Parmi celles à qui mille efforts inutiles ont acquis ce nom , la Quadrature du cercle est des plus célèbres ; ce n'est pas , on se hâte de le dire , que la Géométrie ne présente des questions plus utiles , plus intéressantes , & à certains égards plus difficiles. Mais trop relevées pour ceux qui n'ont pas fait de grands progrès dans cette science , elles ne sont guères connues que du petit nombre de ceux qui se sont rendu familières les nouvelles méthodes & les découvertes que nous devons au dernier siècle.

A l'égard de la Quadrature du cercle, il s'en faut beaucoup que sa célébrité soit renfermée dans des bornes si étroites : plus fameuse, & de bien plus grande importance aux yeux de ceux à qui la Géométrie n'est connue que de nom, ou qui y sont à peine initiés, qu'auprès des Geometres habiles ou intelligens, elle ne cesse d'exciter des efforts infructueux ; aucun problème n'a été tenté à plus de reprises, avec des forces plus inégales & plus disproportionnées à sa difficulté. La plupart de ceux qui se livrent à cette recherche, ont à peine une idée claire de la question, & des moyens qui y conduisent, & qui sont les seuls qu'admet l'esprit géométrique ; c'est cependant de là que partent ces fréquens & pompeux programmes, qui annoncent au public cette découverte brillante & inespérée, qui félicitent leur



*P R E F A Ç E.* v

siècle de voir enfin éclore ce chef-d'œuvre de l'intelligence humaine. La classe la plus élémentaire de la Géométrie est depuis long-tems tellement en possession de fournir seule ces heureux **Œdipes**, que s'annoncer aujourd'hui comme étant en possession, ou occupé à la recherche de ce problème, c'est élever contre soi le préjugé le plus légitime d'ignorance ou de foiblesse d'esprit.

Malgré l'étendue que semblent acquérir de plus en plus les connoissances mathématiques, il est si peu de personnes, hors les Mathématiciens de profession, qui conçoivent avec netteté ce dont il s'agit dans la Quadrature du cercle, que nous avons jugé à propos de l'expliquer avant que d'aller plus loin. Nous avons eu aussi en vûe cette classe de Lecteurs, à qui la multitude des livres, ou le tems que leur enlèvent

leurs occupations, ne permet gueres d'aller au-delà d'une préface, & qui desirent néanmoins d'acquérir quelque connoissance en tout genre. On a tâché de rendre celle-ci instructive pour eux ; ce qu'on va dire servira à leur faire concevoir distinctement la nature du problème, & à les mettre en état d'apprécier avec justesse de raisons ceux qui en annoncent la solution.

L'objet principal & primitif de la Géométrie, est de mesurer les différentes especes d'étendues que l'esprit considère ; mais mesurer n'est autre chose que comparer une certaine étendue à une autre plus simple, & dont on a une idée plus claire & plus distincte. Partant de ce principe, les Géometres ont pris la ligne droite pour la mesure à laquelle ils rapporteroient toutes les longueurs ; le quarré pour celle à laquelle ils

*P R E F A C E.* vij

rappelleroient les surfaces quelconques ; le cube enfin pour celle des solides. Ainsi rectifier une courbe , quarrer une surface , cuber un solide , ne sont autre chose que déterminer leur grandeur , les mesurer. Quarrer un cercle , n'est donc pas , comme l'imagine un vulgaire ignorant , faire un cercle quarré , ce qui est absurde ; ou comme semblent le croire certaines gens , faire un quarré d'un cercle ; mais mesurer le cercle , le comparer à une figure rectiligne , comme au quarré de son diametre , & connoître son rapport précis avec ce quarré ; ou enfin , parce que l'un dépend de l'autre , déterminer le rapport de la circonférence avec le diametre. Lorsqu'on dit un rapport précis , on entend parler de cette exactitude qui est la vérité même , de cette exactitude avec laquelle le triangle est la moitié d'un parallelogramme de même

base & même hauteur, & une parabole les deux tiers. Quant aux mesures qui ne s'écartent que de très-peu de la vérité, quelque insensible que soit cet écart, elles satisfont, il est vrai, à la pratique, parce que celle-ci ne peut jamais donner que des à-peu-près; mais l'esprit géométrique ressent toujours une sorte de peine d'y être réduit, & il s'efforce de la secouer jusqu'à ce qu'il y soit parvenu, ou qu'il ait démontré l'impossibilité de le faire. On chercha sans doute long-tems le rapport numérique de la diagonale du carré avec son côté, & quelques ignorans le cherchent encore, ou poussent l'imbécillité jusqu'à l'assigner. Les vrais Géomètres ont cessé leurs poursuites depuis qu'ils sont en état de démontrer que cela est impossible. Il est fort probable que la Quadrature du cercle doit être mise dans une classe semblable;

P R E F A C E. ix

il y a déjà plusieurs siècles que les habiles Géomètres l'ont abandonnée , comme un sujet qui n'est propre qu'à les épuiser en efforts inutiles ; ils se sont bornés à perfectionner de plus en plus les moyens d'en approcher. En effet , au défaut d'une exactitude parfaite , ce qu'ils pouvoient lui substituer de mieux , étoit un à-peu-près indéfiniment voisin. A cet égard , la Géométrie semble n'avoir rien à desirer. *Archimede* démonstroît autrefois que la circonférence étoit plus grande que le triple & les  $\frac{10}{71}$  du diamètre , & moindre que le triple & les  $\frac{10}{70}$  ou la septième du même diamètre. La différence de ces deux termes n'est qu'une 497<sup>e</sup> : ainsi il est évident qu'elle n'est qu'environ la 1500<sup>e</sup> de la circonférence , & qu'en supposant , ce qui approche de la vérité , que cette circonférence est voisine du milieu , entre les deux polygones ,

x      *P R E F A C E.*

l'erreur sera à peine d'une 3000<sup>e</sup>.

Mais les Modernes, peu satisfaits de cette approximation, quoique commode dans la pratique & dans certains cas, l'ont considérablement perfectionnée. On sçait aujourd'hui que le diamètre étant 1. 00000, la circonférence est plus grande que 3. 14159, & moindre que 3. 14160. Desire-t-on une exactitude plus grande ? on fait voir, que supposant ce diamètre de 1. 00000, 00000, la circonférence surpasse 3. 14159, 26535, & qu'elle est surpassée par 3. 14159, 26536. L'erreur est déjà ici moindre qu'une 1. 00000, 00000<sup>e</sup>. du diamètre; elle est cependant encore énorme & grossière, en comparaison de celle que le Géometre peut prévenir; l'imagination se refuse à en concevoir la petitesse, je dirois presque infinie. Si l'on employe le rapport donné par M. de *Lagni*, cette



P R E F A C E. xj

erreur sera une moindre partie du diamètre, que l'unité d'un nombre composé de cent-vingt-six chiffres. En supposant les étoiles fixes si éloignées du soleil que la parallaxe de l'orbite terrestre ne soit que d'une seconde, c'est-à-dire supposant un cercle dont le rayon fût au moins de 425000000 diamètres de la terre, on ne se tromperoit pas de l'épaisseur d'un cheveu, sur cette immense circonférence. Mais que dis-je ? Le rapport donné par *Ludolph Van Ceulen*, rapport composé seulement de 35 chiffres, est déjà plus que suffisant pour prévenir cette erreur : néanmoins quelle disproportion de l'exactitude de l'un avec celle de l'autre ! les plus communes notions de l'arithmétique suffisent pour en donner une idée.

Si l'histoire des efforts que le problème de la Quadrature du cercle a occasionnés, n'étoit que

celle des pygmées en Géométrie, qui l'ont entrepris, elle mériteroit bien peu la curiosité des Lecteurs. Mais les tentatives des Géometres anciens & modernes, pour qui cette recherche a été quelquefois le motif d'autres découvertes très-intéressantes, ou qui désespérant d'atteindre précisément au but, se sont bornés à en approcher de plus en plus, à l'aide de certaines méthodes fort ingénieuses; ces tentatives, dis-je, nous présentent des traits dignes d'attention: ce sont proprement les seuls dont il sera question ici. Le tems m'est trop précieux pour avoir donné un seul instant à déterrer quelque ridicule auteur de Quadrature: si j'ai parlé de quelques-uns d'eux dans un chapitre à part, c'est uniquement de ceux qui se sont présentés à moi dans le cours d'autres recherches.

Quelque peu dignes que soient

*P R E F A C E.*    xiiij

ces hommes singuliers d'occuper le loisir d'un Ecrivain judicieux, je ne puis résister à l'envie d'en tracer un portrait, qui sera avoué de tous ceux qui ont eu occasion de traiter avec eux.

Trois sortes de personnes travaillent à quarrer le cercle avec une pleine confiance en leurs succès. Je comprends dans la première classe, ces gens qui sans avoir la moindre connoissance de la Géométrie, ni des moyens qu'elle employe dans ses recherches, s'engagent dans celle de la Quadrature, sans sçavoir presque en quoi consiste l'état de la question. On les voit proposer avec une assurance qui excite la pitié, de grossiers mécanismes, incapables même, quand on les admettroit, de conduire à des à-peu-près de quelque exactitude. Celui-ci entoure le cercle d'un fil délié, & pense avoir par ce moyen la cir-

xiv *P R E F A C E.*

conférence avec la dernière précision. Il y en a qui après cette belle opération, partagent ce fil en quatre parties égales, pour faire d'une d'elles le côté d'un carré qu'ils prétendent égal au cercle. Ils ignorent cette vérité, que la Géométrie démontroit presque encore au berceau ; sçavoir, que de toutes les figures d'égal contour, le cercle est celle qui renferme le plus d'étendue. On en trouvera qui proposeront de faire rouler un cercle sur un plan bien uni, ou d'en peser un, formé d'une matière bien égale & uniformément épaisse, contre un carré de même matière ; & j'ai vû souvent de ces gens, dont toute la Géométrie consistoit à mener mécaniquement une perpendiculaire ou une parallèle, faire après bien des mystères, l'ouverture de quelqu'un de ces ridicules moyens de carrer le cercle, & insulter ensuite par

*P R E F A C E.* xv

un souris moqueur , aux Géometres qui n'avoient pas sçu les imaginer.

Il y a d'autres chercheurs de Quadrature qui , un peu plus instruits dans la Géométrie , semblent ne s'en servir que pour s'égarer dans un labyrinthe de paralogismes. Les premiers dont j'ai parlé , gens du moins peu incommodés , se contentent avec une espece de satisfaction philosophique , d'être en possession du secret ; mais ceux de la seconde classe ne manquent gueres de fatiguer les Géometres , & sur-tout les Académies , par leur importunité à solliciter l'examen & le jugement de leur prétendue découverte ; ils la portent de tribunal en tribunal , c'est-à-dire d'Académie en Académie ; de celles de la province , car elles ont souvent des quadratures à examiner en premier ressort , à celle de la

xvj *P R E F A C E.*

capitale. Ils se plaignent avec amertume, d'une espece de déni de justice quand on refuse de les écouter, & ils manquent rarement de récuser leurs juges, ou de les prendre à partie s'ils en sont condamnés. Vainement viendra-t-on quelquefois à bout de leur montrer la foiblesse de leurs raisonnemens, bientôt l'édifice est réparé; bientôt engagé dans un dédale aussi tortueux que le premier, notre pauvre Quadrateur vient de nouveau harceler son juge: heureux celui-ci, quand il peut promptement l'obliger à le récuser & à le citer devant le public, en lui dévoilant sa découverte. Une espece de fatalité semble avoir ordonné que tous ceux qui se persuadent une fois d'être en possession de la Quadrature du cercle, vivront & mourront dans cette persuasion intime. C'est une manie qui, pire que celle du Héros



*P R E F A C E.* xvij

dé la Manche, ne les quitte pas même dans leurs derniers momens; il n'en est aucun qui manque d'en appeler au jugement d'une postérité plus équitable, à moins que de mauvaise humeur contre leur siècle, ils n'aiment mieux s'en venger en cachant leur secret. » Ingrats contemporains, siècle barbare, s'écrioit un d'eux dans ces derniers instans, je voulois vous enseigner la plus belle découverte qui ait jamais été faite, je voulois vous desabuser des erreurs grossieres dont vous portez le joug; vous m'avez rebuté, hé bien, je sortirai de ce monde sans l'éclairer ». Effectivement il mourut sans faire part de son précieux secret, & les Géometres n'ont pas eu la complaisance de le regretter.

Il y a une troisième espece de Quadrateurs, plus singuliers encore, mais moins incommodes,

xviiij *P R E F A C E.*

en ce que leur maniere de penser a bientôt terminé l'examen de leur découverte. Ce sont ces esprits d'une trempe, ce me semble, inconnue aux siècles passés, qui savent se jouer des principes les plus évidens de la Géométrie, qui ont le courage de heurter de front les axiomes du sens commun. *M. Liger*, je ne le nomme que parce qu'il s'est nommé si souvent dans les *Mercures* & ailleurs, *M. Liger* vous dira avec une grande assurance, que le tout n'est pas plus grand que la partie, que la racine quarrée de 288 est exactement la même que celle de 289, que 50 a la même racine que 49, &c. Il fera plus, il entreprendra de vous le prouver par un mécanisme à-peine capable d'en imposer à l'artisan grossier qui le pratique. Il établit enfin une Géométrie toute nouvelle sur les débris de l'ancienne. Prétendre dé-

fabuſer des eſprits de cette eſpece , c'eſt vouloir perdre ſon tems ; quand on eſt venu à un pareil excès de rêverie , on a perdu le droit d'être frappé de l'évidence.

J'ai ſouvent remarqué avec ſurpriſe , combien peu ceux qui ſe livrent à rechercher la Quadrature du cercle , ou qui croient la poſſeder , ſont inſtruits de ce que les Géometres ont trouvé ſur ce ſujet ; à peine connoiſſent-ils les plus ſimples approximations ; & à coup ſur , la maniere dont on y eſt parvenu leur eſt abſolument inconnue ; car il eſt métaphyſiquement impoſſible que les connoiſſant on ſe faſſe illuſion : auffi leur ignorance à cet égard eſt extrême ; j'en appelle au témoignage intérieur des Quadrateurs , ſans doute en grand nombre , qui liront ceci.

Cette remarque m'a porté à croire , qu'un moyen peut être

xx P R E F A C E.

efficace de diminuer le nombre de ceux qui s'adonnent à cette recherche, étoit de rassembler sous un même point de vûe les découvertes réelles de la Géométrie sur ce problême fameux. Il est en effet à présumer que si les vérités qu'on a exposées plus haut, & plusieurs autres qu'on développe dans le cours de cet Ouvrage, étoient plus universellement connues, on verroit moins de ces malheureuses victimes d'une entreprise mal réfléchie. A la vérité j'espere peu de ceux qui ont déjà résolu le problême ; la plupart sont dans la disposition prochaine de nier les vérités les mieux établies, dès que la contradiction les y conduira. Le coup est porté, & l'on peut leur appliquer ce vers d'*Horace*,

*Et tribus Anticiris caput insanabile . . .*

Mais je ne doute point que cette histoire ne soit propre à préserver

*P R E F A C E.* xxj

du même travers ceux qui n'ont point encore l'esprit préoccupé. Elle pourra aussi servir à rendre le repos à quelques personnes de bonne foi, qui privées des moyens de s'informer de ce qu'on a déjà fait, s'épuisent en efforts inutiles. Les gens sensés à qui la Géométrie est peu connue, pourront prendre ici une connoissance exacte de la question, & porter un jugement sain & équitable sur les prétentions de ceux dont la vaine confiance pourroit peut-être leur en imposer. Pour écarter enfin cette foule de Quadrateurs qui obsèdent les Académies, ne pourroit-on pas les obliger à s'instruire ici, comme par un préliminaire, des vérités reçues de l'aveu unanime des Géomètres, sur la grandeur du cercle? Les réduisant par ce moyen, ou à les contester ou à les admettre, ils seront dans le premier cas indignes d'être écoutés,

& dans le second , la conviction intime de leur erreur sera peut-être bien prochaine : je dis peut-être , car je n'oserois l'affurer ; l'ignorant , de même que l'homme de mauvaise foi , sçait se ménager mille ressources que tout autre n'auroit jamais imaginées.

J'ai enfin pensé que cette suite de découvertes sur la mesure du cercle , rassemblées sous le même point de vûe , pouvoit former un spectacle propre à flatter la curiosité des Géometres. Plusieurs d'entr'elles méritent l'attention des plus habiles , comme tenant de près au développement & à la perfection que la Géométrie a reçue dans le dernier siècle. C'est ce que l'on verra clairement dans le chapitre quatrième , où j'expose les inventions successives de *Wallis* , *Brouncker* , *Newton* ; inventions toutes liées ensemble , & aboutissantes au calcul intégral & à



**P R E F A C E.** xxiiij

plusieurs autres méthodes analytiques de grande importance.

L'utilité qui paroît devoir résulter d'un ouvrage de cette nature, & l'agrément qu'il présente pour ceux qui sont un peu curieux de connoître les pas de l'esprit humain, avoient ce semble frappé avant moi un Analyste habile ( *M. de Lagni* ); le *commercium philosoph.* ( *a* ) entre *Leibnitz & Bernoulli*, nous apprend qu'il l'avoit projeté. Ce Géometre, le fleau des Quadrateurs de son tems, étoit en état de remplir parfaitement cet objet, & j'ai été surpris de voir que *M. Leibnitz*, dans le même recueil de Lettres, semble se défier de sa capacité, & craindre qu'il ne donnât qu'un ouvrage imparfait, à moins qu'il ne le lui communiquât ou à *M. Bernoulli*. J'ai recherché quelle pouvoit être la cause d'une défiance si mal

( *a* ) P. 300, 302. II. vol.

fondée, & je pense l'avoir trouvée. *Leibnitz* craignoit apparemment que *M. de Lagni* n'ajoutât trop de foi à ce qu'il appelloit les calomnies des Anglois, au sujet de ses découvertes dans les nouveaux calculs, dont l'une est la Quadrature du cercle, exprimée par une suite infinie de nombres; découverte dont il fut pendant long-tems fort jaloux, & que les Anglois l'ont accusé d'avoir empruntée de *Gregori*. D'un autre côté, *M. de Lagni* quoique connoissant les calculs de l'infini, fut toujours un de ceux qui négligerent avec affectation d'en faire usage; & peut-être à cet égard étoit-il à craindre en effet qu'il ne leur rendît pas toute la justice qui leur étoit due. Je saisis cette occasion de justifier un autre Académicien encore vivant, qu'on voit traité dans le même endroit avec autant d'injustice. Celui-ci méritoit

P R E F A C E. xxv

méritoit encore moins d'être enveloppé dans ce jugement précipité; il n'avoit aucun fondement, si ce n'est que l'un & l'autre de ces Académiciens n'étoient point connus de *Leibnitz*. Mais comment le dernier l'auroit-il été, puisqu'il ne faisoit alors que d'entrer dans la carrière de la Géométrie? Les sçavans Mémoires qu'il a donnés bientôt après dans les recueils de l'Académie, & qui prouvent qu'il étoit dès lors également versé dans l'une & l'autre analyse, auroient non seulement calmé les craintes de *Leibnitz*, mais lui auroient attiré son estime.

Je n'ai rien dit dans le cours de cet Ouvrage, de l'Auteur de l'étrange *Prospectus* & de quelques autres piéces de la même nature, qui nous annonçerent l'été passé la Quadrature du cercle. Par égard pour son nom & ses autres qualités qui le rendent estimable à ceux

xxviiij *P R E F A C E.*

quand la terre seroit de forme cubique ou pyramidale. Je me couvrirois de ridicule auprès des Lecteurs sensés , si j'entreprendois d'opposer les moindres raisonnemens à ces prétentions. Il n'est personne , faisant usage de sa raison , qui ne soit persuadé que les vérités métaphysiques contestées par *M. de C.* sont plus certaines qu'il ne l'est que jamais son *Prospectus* singulier ait vû le jour , qu'il y ait eu des souscriptions ouvertes pour parier contre lui , & qu'il ait publié sa Quadrature. Pour tout autre enfin que lui-même , elles sont plus incontestables que son existence propre.

Au reste il est bien facile de reconnoître la cause de l'erreur de *M. de C.* elle a sa source dans la méprise où il donne sur la simple définition de l'angle & sur ce qui le constitue. La surface renfermée entre ses côtés , la longueur de

**P R E F A C E. xxix**

ces côtés n'entrent pour rien dans la grandeur d'un angle , & cette grandeur ne sert à rien pour déterminer la surface qu'il renferme avec une troisième ligne qui le borne. *M. de C.* suppose néanmoins le contraire , & en fait le fondement de sa Quadrature. C'est en sçavoir encore trop peu en Géométrie , pour prétendre redresser les idées des Géometres.



---

---

## AVIS AU LECTEUR.

**Q**UELQUES affaires pressantes & qui obligeoient l'Auteur à des absences fréquentes de la Ville, ne lui ayant permis que de jeter un coup d'œil sur les premières feuilles à mesure qu'elles s'imprimoient, afin de ne point faire languir l'impression, on prie le Lecteur de corriger d'après l'errata les fautes qu'on y releve, & de suppléer à celles qui auroient échappé à la révision qu'on a faite de l'ouvrage entier. On se flate qu'il n'en est aucune qui concerne le fond du sujet.



# T A B L E

## DES MATIERES.

---

### SOMMAIRE DES CHAPITRES.

#### CHAPITRE PREMIER.

I. *C*E qu'on entend par quarrer une figuré. II. Ce que c'est que la Quadrature du cercle, & quels sont les moyens que la Géométrie permet d'employer pour y parvenir. III. Ce qu'on appelle quadrature absolue. IV. Raisons pour lesquelles le cercle, malgré sa simplicité apparente, peut n'être pas quarrable; quoique d'autres courbes le soient. V. Ce que c'est qu'approximation ou quadrature approchée. VI. A quoi tient la Quadrature du cercle. VII. Questions qui la donneroient si on pouvoit les résoudre sans la supposer elle-même.

VIII. Distinction de deux especes de quadratures, l'une définie, l'autre indéfinie. Leur explication & leur degré de difficulté. IX. Quelle est l'utilité de la Quadrature du cercle. X. Si le problème des longitudes en dépend. S'il y a quelque récompense promise à ceux qui la trouveront. S'il est vrai qu'elle a toujours été l'objet des vœux & des travaux des Géometres. Réponse à ces questions. XI. Nécessité des approximations de la grandeur du cercle.

## C H A P I T R E II.

I. Antiquité des recherches des Géometres sur la Quadrature du cercle. II. Anaxagore y travaille dans sa prison. III. Trait d'Aristophane sur la Quadrature du cercle & l'Astronome Meton. IV. Hippocrate de Chio tente le problème & trouve sa lunule absolument quarrable. Additions diverses que les Géometres ont fait à sa découverte, en note. V. Fausse



## DES SOMMAIRES. xxxiij

*quadrature qu'on lui attribue & son apologie. VI. Sur les Géometres Bryson & Antiphon. Erreur grossiere du premier. Justification du dernier. VII. Mesure approchée du cercle, donnée par Archimede. VIII. Exposition de ses principes. IX. Réponse à une objection faite contre son calcul. Adresse d'Archimede pour la prévenir. Nouvelle finesse de ce Géometre dans le choix de ses nombres. X. Autres approximateurs anciens. XI. Réflexion sur la propriété de la tangente de la spirale. XII. Raisonnement qui fait voir qu'on ne doit rien en attendre non plus que des diverses courbes de la même nature.*

## CHAPITRE III.

*I. Regiomontanus réfute les Quadratures prétendues du Cardinal de Cusa, & trouve une mesure du cercle un peu plus rapprochée que celle d'Archimede. II. Pierre Metius donne son approximation célèbre. Son avantage. III. M. Viete*

*exprime le cercle par une suite infinie de termes, & calcule une approximation en onze décimales. IV. Adrianus Romanus la pousse à dix-sept, & Ludolph à trente-cinq. V. Idée du travail immense de Lud. VI. Snellius trouve des moyens pour approcher à moins de frais de la mesure du cercle. Ses propositions fondamentales. Facilité qui en résulte pour déterminer des limites très-rapprochées du cercle. Il vérifie la proportion de Ludolph. Expression qu'il donne pour les cordes des arcs continuellement fondoubles. Grandeurs des polygones inscrits & circonscrits qu'il en tire. Leur usage pour vérifier les quadratures prétendues. VII. Addition que fait M. Huygens aux découvertes de Snellius. Diverses opérations géométriques qu'il propose pour trouver la grandeur approchée des arcs ou des espaces circulaires. Note qui en contient quelques autres. VIII. Idée d'un ouvrage particulier de M. Huygens, qui a quelque trait à la Quadrature du cercle. IX. Histoire des*

## DES SOMMAIRES. xxxv

*efforts de Gregoire de S. Vincent pour y parvenir. Exposition de sa Quadrature. Contestation qu'elle occasionne. Elle est réfutée par Descartes, Huygens & le Pere Leotaud. X. Autre querelle élevée entre Gregori & M. Huygens, sur une démonstration que donnoit le premier, de l'impossibilité de la Quadrature du cercle. Raison de Gregori. Ses propositions sur les limites des secteurs circulaires, elliptiques & hyperboliques. XI. Raisons de pencher pour l'impossibilité de la Quadrature définie du cercle. Démonstration de celle de l'indéfinie. Addition faite à ce chapitre, où l'on se détermine à regarder la Quadrature, même définie, comme impossible. Voyez à la fin de l'ouvrage.*

## CHAPITRE IV.

*I. Idée générale de ce chapitre. II. Objets de l'arithmétique de l'infini. Découvertes de Wallis & jusques où il les pousse. III. Il est arrêté à la mesure du cercle & imagine*

*ses interpolations. Idée & exemple de cette méthode. IV. Il exprime la grandeur du cercle par une suite infinie de nombres. V. Il regarde la Quadrature définie comme impossible, & sur quel fondement. Nouveaux motifs de se le persuader. VI. Autre expression de la grandeur du cercle, donnée par Mylord Brounker, en fraction d'une forme particulière. VII. Usage qu'a fait dans la suite M. Euler des fractions de cette espèce. VIII. Développement de la manière dont Newton, travaillant d'après les idées de Wallis, trouve la première suite générale pour le cercle. IX. Autres moyens qui se présentent ensuite à lui. X. Il les communique à Barrow, Collins, de même que presque tout le calcul moderne, les quadratures & rectifications des courbes, la méthode des suites, &c. Diverses expressions qu'il donne des arcs & des segmens circulaires. XI. M. Jacques Gregori devine le principe de Newton, & ajoute à ses découvertes. Suite qu'il avoit trouvée précédem-*

## DES SOMMAIRES. xxxvij

ment pour le cercle. Il donne celle de l'arc par la tangente & plusieurs autres. Eloge de ce Géometre. Justice que lui rend Newton. XII. M. Leibnitz trouve de son côté la même suite. On le défend contre l'accusation de plagiat que lui ont intenté quelques Anglois. XIII. La même suite trouvée par M. de Lagni. Autre motif d'apologie pour M. Leibnitz. XIV. Diverses expressions particulieres de la grandeur du cercle ou de ses parties. XV. Utilité évidente de ces suites quand elles convergent sensiblement. XVI. Maniere de tes employer commodément pour en tirer des approximations en grands nombres. Exemple de cette méthode. XVII. Avantages de la suite par la tangente, & la maniere de s'en servir. XVIII. Emploi qu'en ont fait quelques Géometres modernes, comme MM. Sharp, Machin, de Lagni. Approximation en soixante-quinze chiffres donnée par le premier, poussée à cent par le second, & à cent vingt-sept par le dernier. XIX. Défauts qu'ont les suites assez

XXXVIII T A B L E

souvent, & en particulier celle de l'arc  
 par la tangente. XX. Moyen par lequel  
 M. Euler remédie à celui de l'irrationa-  
 lité. XXI. Maniere dont il obvie au peu  
 de convergence de la suite qui exprime  
 l'arc de  $45^\circ$ . par la tangente avec un  
 exemple. Celle de M. Simpson aussi  
 éclaircie par un exemple. XXII. Utilité  
 des suites pour en tirer dans la pratique  
 des expressions d'un calcul simple & cepen-  
 dant assez exact. Exemples qu'on en donne  
 d'après Newton, Leibnitz, &c. Moyens  
 de l'auteur pour trouver par approxima-  
 tion la somme d'une suite. XXIII. Expositi-  
 on de la méthode de quarrer les cour-  
 bes par la connoissance d'un petit nombre  
 d'ordonnées équidistantes, & son appli-  
 cation au cercle. Essai de commentaire sur  
 la méthode différentielle de Newton.  
 XXIV. Autre méthode donnée par M.  
 Simpson, appliquée au cercle. XXV. Pré-  
 cis d'un écrit de M. Jean Bernoulli sur  
 la mesure du cercle.

## CHAPITRE V.

I. *Motifs qui nous ont déterminé à parler de quelques-uns de ceux qui se sont singularisés par leurs erreurs sur la Quadrature du cercle.* II. *Histoire de quelques Quadrateurs anciens.* III. *Les siècles d'ignorance fournissent grand nombre de Géomètres de cette espèce, qu'on ne s'est pas mis en peine de tirer de l'obscurité.* IV. *Le Cardinal de Cusa réfuté par Regiomontanus.* V. *Simon Duchesne donne occasion à Metius de trouver son rapport célèbre.* VI. *Oronce Finée annonce la Quadrature du cercle, la duplication du cube, la trisection de l'angle, &c. Il est réfuté par Buteon, Nonius. En quoi consistoit son erreur.* VII. *Joseph Scaliger se met sur les rangs, & traite Archimede & les Géomètres avec hauteur. Viète, Adrianus Romanus & Clavius le réfutent; ce dernier sur-tout le tourne en ridicule, & s'en attire de grosses injures.* VIII. *Quelques Quadrateurs des plus célèbres, tirés*

*de la foule nombreuse qu'ils composent.*  
 Longomontanus , Jean-Baptiste Porta ,  
 Hobbes , Delaleu , Olivier de Serres ,  
 Mallemant de Messange, *le sieur* Mathu-  
 lon , *sa punition.* *Le sieur* Basselin.  
 IX. *Précis des découvertes singulieres de*  
*quelques Quadrateurs vivans.* *Le sieur*  
 Clerget , *le sieur* Liger. *Principes ad-*  
*mirables de ce dernier.*

## C H A P I T R E V I.

I. *Raisons qui nous ont engagé à joindre*  
*ici l'histoire des problèmes des deux moyennes*  
*proportionnelles continues , ou de la du-*  
*plication du cube & de la trisection de*  
*l'angte.* II. *En quoi consiste le premier de*  
*ces problèmes , & d'où il dépend.* III. *His-*  
*toire qu'en font quelques Ecrivains anciens.*  
*Autre histoire rapportée par Eratostenes.*  
 IV. *Solution mécanique proposée par*  
 Platon. V. *Autre donnée par Architas.*  
 VI. *Menechme résout le problème de deux*  
*manieres différentes par les sections coni-*



## DES SOMMAIRES. xlj

*ques. Expositions de ses solutions & remarque à leur sujet. VI. Eudoxe le résout par des courbes particulieres qu'il imagine à ce sujet, mais qui ne nous sont pas parvenues. VII. Idée de la solution d'Eratostenes. VIII. Solutions d'Appollonius, Philon & Heron. IX. Celle de Nicomede par la conchoïde, approuvée par Newton, & regardée comme préférable à celles qui employent les sections coniques. X. Maniere dont Pappus résout le problème; ce qui donne lieu à l'invention de la cysoïde de Diocles. Celle de Sporus peu différente de celle de Pappus & Diocles. XI. Sur la trisection de l'angle; problèmes auxquels on voit d'abord qu'elle se réduit. Premières manieres dont les Anciens le résolurent par l'hyperbole & la conchoïde. XII. Autre maniere dont les Anciens appliquerent l'hyperbole à cette question. XIII. Sur la quadratrice, la spirale & autres courbes semblables. XIV. Indication générale de diverses solutions que les Géometres moder-*

**xlij. TABLE DES SOMMAIRES.**

*nes ont donné à ces deux problèmes. XV. Démonstration de l'impossibilité de les résoudre par la Géométrie plane. XVI. Solutions que Descartes en a donnée par la parabole, perfectionnées & généralisées par M. de Sluse. XVII. Constructions très-simples qu'en donne M. Newton. XVIII. Article abrégé concernant les solutions prétendues de ce problème par la Géométrie ordinaire.*

**Fin de la Table des Sommaires.**



**APPROBATION,**  
*du Censeur Royal.*

**J**AI lû par ordre de Monseigneur le Chancelier , un Manuscrit qui a pour titre , *Histoire de la Quadrature du cercle.* Cet ouvrage annonce dans son Auteur une vaste érudition & de profondes connoissances en Géométrie. Il m'a donc paru qu'il étoit tout-à-fait digne de l'estime des connoisseurs en ces matieres. A Paris , ce premier Mai 1754.

**LA CHAPELLE,** *Membre de l'Académie des Sciences de Lyon , & de la Société royale de Londres.*

---

## PRIVILEGE DU ROI.

**L**OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartient, S A L U T. Notre amé CHARLES-ANTOINE JOMBERT, Imprimeur-Libraire à Paris, Adjoint de la Communauté, nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au public des Ouvrages qui ont pour titre : *Histoire des recherches sur la Quadrature du cercle*, par M. de M. *Histoire des Mathématiques*, par le même ; *l'Art de la Guerre pratique*, par M. de Saint-Geniés ; *Histoire de l'Astronomie*, par M. Esteve ; *Petit Dictionnaire portatif de l'Ingénieur*, par M. Belidor ; *Elémens d'analyse pratique*, traduits de l'Anglois de M. Simpson ; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer lesdits Ouvrages autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de *neuf années* consécutives, à compter du jour de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu

de notre obéissance ; comme aussi à tous Libraires , Imprimeurs & autres d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages , ni d'en faire aucuns extraits , sous quelque prétexte que ce soit , d'augmentation , correction , changemens ou autres , sans la permission expresse & par écrit dudit exposant ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits , de six mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , l'autre tiers audit exposant , & de tous dépens , dommages & intérêts : à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux caractères , suivant la feuille imprimée & attachée pour modèle sous le contrescel des présentes ; que l'impétrant se conformera en tout aux réglemens de la Librairie , & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu'avant de les exposer en vente les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages , seront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée , es mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France , le Sieur de Lamignon , & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France , le

Sieur de Lamoignon , & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit exposant ou des ayans cause , pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites présentes , qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages , soit tenue pour dûment signifiée , & qu'aux copies , collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant clameur de haro , Charte normande & Lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau le vingt-huitième jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cens cinquante quatre , & de notre regne le quarantième. Par le Roi en son Conseil.

PERRIN.

*Registré sur le Registre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N<sup>o</sup>. 429. fol. 334. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par l'Edit du 28 Février 1723. A Paris le 5 Novembre 1754.*

D I D O T , Syndic.

## ERRATA.

**P**age 20, ligne 19, fig. 1. lisez fig. 2.  
Pag. 23, lig. 7, fig. 2, lisez fig. 3. Pag. 32,  
lig. 14, ils, lisez elles. Pag. 34, lig. 21, ap-  
perçu, lisez apperçue. Pag. 39, lig. 23, jamais,  
lisez jamais rien. Pag. 45, lig. 21, fut, lisez  
fut bientôt. Pag. 46, lig. 17, ajoutez V. Pag.  
59, lig. 8, encore davantage, lisez beaucoup  
plus. Pag. 60, lig. 18, ils, lisez elles. Pag.  
66, lig. 15, VIII. lisez IX. Pag. 77, lig. 10,  
proportion, lisez proposition. Pag. 78, lig. 14,  
solidité, lisez justesse. Ibid. lig. 16, cyclometris,  
lisez cyclometria. Pag. 83, lig. 4, rejetté, lisez  
rejetée. Pag. 86, lig. 19, VII, lisez X. Pag.  
92, lig. 5, appliqué, lisez appliquée. Pag.  
100, lig. 7, X, lisez XI. Pag. 101, lig. 18,  
n'étoit, lisez n'est. Pag. 108, lig. 15, étant  
a, on, lisez étant a. On. Pag. 109, lig. 22,  
soient donc, lisez soient. Pag. 113, lig. 14,  
serrés, lisez serrées. Pag. 116, lig. 2, desi-  
gné, lisez désignée. Ibid., lig. 8, déterminoit,  
lisez déterminoient. Pag. 121, lig. 10, trouve,  
lisez trouvera. Pag. 125, lig. 5, on a donc, lisez  
elles sont. Pag. 126, lig. 9, plus, lisez plus à  
déterminer. Pag. 139, lig. 15, des, lisez les.  
Pag. 144, lig. 7, fort probable, lisez vraisem-  
blable. Ibid. lig. 22, n'avoit, lisez n'a. Pag.  
186, lig. 2, DE, ajoutez (fig. 22.) Pag.  
198, lig. 22, AE ea, ajoutez (fig. 24.) Pag.  
235, lig. 16, ce qui est impossible, lisez qu'on  
ne sauroit trouver. Pag. 246, lig. 20, ajoutez  
fig. 27.

**HISTOIRE**





# HISTOIRE

DE

## LA QUADRATURE DU CERCLE.

---

### CHAPITRE I.

*En quoi consiste la quadrature du Cercle : diverses manieres de la considérer : quel degré d'utilité on doit lui assigner.*

I. **Q**UARRER le Cercle , ou , pour s'énoncer plus généralement , une figure quelconque , c'est assigner l'étendue précise qu'elle renferme : une raison fort naturelle a donné lieu à cette maniere de parler. Le quarré est , de tou-

res les figures, la plus simple, la plus aisée à mesurer, une seule de ses dimensions étant connue. Cela fit penser aux Géomètres qu'ils ne pouvoient donner une idée plus distincte de la grandeur d'une surface quelconque, qu'en déterminant le carré qui l'égaleroit; de là mesurer une figure, quarrer une figure, devinrent & sont encore des termes synonymes en Géométrie.

II. Il s'agit donc dans la quadrature du Cercle, de trouver l'étendue du cercle, comme dans la Géométrie élémentaire on trouve celle d'un triangle ou d'une figure rectiligne; je veux dire avec cette exactitude & cette précision qui sont la vérité même. Cette comparaison me servira encore à faire sentir quelle est la nature des voies que la Géométrie admet seules pour y parvenir. Il seroit ridicule de mesurer, le dirai-je, avec un compas, ou un fil, ou telle autre manière mécanique qu'on voudra, la hauteur d'un triangle, lorsque ses côtés

donnés, ou telles autres conditions du problème, suffisent pour déterminer cette hauteur; c'est au raisonnement seul à le faire. Il en doit être de même dans la question présente: il y a un rapport entre l'étendue du cercle & celle du quarré de son diametre, entre la longueur de ce diametre & la circonférence, il y a, dis-je, un rapport déterminé & lié avec les propriétés du cercle; on ne doit donc employer pour parvenir à la connoissance, que le raisonnement & le calcul fondés sur ces propriétés. Toute voie mécanique est interdite; l'esprit géométrique s'en indigne & le rejette, non par une fausse délicatesse, mais parce que quelque perfection qu'on lui supposât, aucune d'elles n'est capable de conduire à la même exactitude que le raisonnement. Je demande pardon aux Géometres d'entrer dans ce détail, mais je les prie en même tems de faire attention que quelque élémentaire qu'il soit, il n'est

## 6 QUADRATURE

conférence. Du reste, cette égalité n'influe en rien sur les rapports de ses ordonnées aux abscisses, sur celui des polygones inscrits & circonscrits qui le limitent. Les courbes où ces rapports sont plus simples, comme la parabole, quoique moins régulière à nos yeux, sont absolument quarrables: le cercle où il est plus compliqué, sera probablement toujours rebelle à la Géométrie.

V. Lorsque les courbes ne sont pas susceptibles de quadrature absolue, les Géomètres se bornent à substituer à la vérité un à peu près qui n'en diffère qu'insensiblement. C'est là ce qu'on appelle quadrature approchée; expédient, il est vrai, toujours employé avec regret, mais néanmoins fort souvent nécessaire; il a fallu y recourir pour le cercle, & peut-être la Géométrie y a plus gagné que si l'on eût bientôt trouvé sa quadrature absolue. L'impossibilité d'y parvenir a d'autant mieux fait éclater la sagacité & l'esprit de ressource des habiles Géo-

metres ; elle a été le motif d'une foule d'inventions qu'ils ont imaginées pour atteindre ou pour approcher du but. On en trouvera des exemples remarquables dans la suite de cette Histoire.

VI. La nature du cercle établit une telle liaison entre la mesure de son aire & la longueur de sa circonférence , que l'une étant connue , l'autre l'est aussi nécessairement. On aura donc également la solution du problème , soit qu'on détermine immédiatement quelque espace rectiligne égal au cercle , soit qu'on trouve une ligne égale à sa circonférence. Avant *Archimède* , inventeur de ce rapport , on tentoit le premier moyen ; depuis lui jusqu'à la nouvelle Géométrie , les efforts des Géomètres s'étoient principalement tournés vers la dimension de la circonférence : il est aujourd'hui libre de choisir l'une ou l'autre de ces deux voies ; les nouveaux calculs s'y prêtent également. Mais , il faut bien le remarquer , ces

avantage est particulier au cercle ; c'est peut-être la seule figure courbe dont la rectification & la quadrature tiennent de si près l'une à l'autre.

VII. On sçait encore que la détermination du centre de gravité d'un arc ou d'une portion quelconque de cercle, la tangente de la spirale & de plusieurs autres courbes, la terminaison de la quadratrice, donneroient la quadrature du cercle ; mais tous ces problèmes en dépendent eux-mêmes , comme je le fais voir ailleurs , si intimement , que de quelque manière qu'on les envisage, c'est toujours elle qui se présente la première. Ils ne sçauroient jamais servir de moyens pour y parvenir.

VIII. Les Géometres distinguent deux manieres de quarrer les courbes , bien inégales en perfection ; ils nomment l'une définie , & l'autre indéfinie. En appliquant ceci à l'objet présent , la quadrature définie du cercle seroit la mesure de son aire , ou entière , ou seu-

lement de quelque segment déterminé ; comme  $CDBP$ , ou  $APB$  (*fig. 1.*) , les lignes  $CP$ , ou  $PA$ , ou  $AE$  ayant au rayon une certaine raison déterminée. Si quelque méthode donnoit en général la quadrature d'un segment quelconque , quelque fût le rapport de  $CP$  ; ou  $PA$ , ou  $AE$ , avec le rayon , on auroit la quadrature indéfinie du cercle. Ce seroit peu faire , on ose le dire , pour la Géométrie que de trouver la première : pour résoudre le problème dans toute son étendue , il faudroit assigner la dernière , & il y a encore loin de l'une à l'autre. Car pour passer de la quadrature définie du cercle à celle de ses parties quelconques , il resteroit à résoudre ce problème , plus difficile que le premier , *trouver la raison de deux arcs dont on connoitroit les sinus ou les tangentes , &c.* Pour le dire , en un mot , la quadrature indéfinie du cercle & de ses parties , est autant au-dessus de celle qui occupe infructueusement les vulgaires

quadratureurs, que celle-ci est au-dessus de la mesure des surfaces rectilignes.

IX. Il est à propos de discuter, avant d'aller plus loin, quel est le degré d'utilité de la quadrature du cercle, soit absolue, soit approchée. Quant à la première, nous pensons, avec M. de *Maupeiruis* \*, que la Géométrie présente aujourd'hui quantité de recherches plus intéressantes. La quadrature définie du cercle ne seroit presque d'aucune utilité : les travaux des habiles Géometres, dont j'exposerai bientôt les découvertes, ont fait connoître son rapport avec les figures rectilignes assez exactement pour n'avoir presque rien à desirer ; & j'ai rendu sensible, par un exemple frappant, la prodigieuse exactitude à laquelle il est aisé d'atteindre. Il y auroit quelque avantage, j'en conviens, dans la quadrature indéfinie, ou autrement l'intégration absolue de quelques-unes de ces formules ;  $dx \sqrt{aa - xx}$ ,

\* Lettre sur le progrès des Sciences.



ou  $dx \sqrt{2ax - xx}$ , ou  $\frac{adx}{\sqrt{aa - xx}}$ ,

ou, &c. Mais, je le remarque encore, c'est moins à cause du cercle que les analystes le désireroient, que parce qu'on auroit par là la mesure absolue d'une infinité d'autres courbes qui dépendent d'expressions de cette forme. Comme il est non seulement probable, mais bien démontré (*voyez la fin du chap. 3*), qu'on n'y parviendra jamais, on regarde comme résolu tout problème qui conduit légitimement à la quadrature du cercle ou de l'hyperbole; & il l'est en effet, même dans la pratique, puisque l'on a des méthodes assez simples pour trouver, avec une exactitude presque indéfinie, la grandeur d'un arc ou d'un segment circulaire quelconque. Que manque-t-il donc aux Arts, à la Géométrie même; dans l'absence de la quadrature absolue du cercle? rien du tout. Une détermination probablement enveloppée dans des rapports très-com-

pliqués, seroit une stérile connoissance pour l'esprit humain. On auroit plus d'obligation, je le dis avec confiance, à celui qui réduiroit la rectification de l'ellipse & de l'hyperbole, aux quadratures de ces deux courbes.

X. Je ne remarque presque qu'à regret, & comme un trait de simplicité, la croyance où sont la plûpart des chercheurs de la quadrature du cercle, que les Souverains s'intéressant aux travaux des Géomètres, ont promis une récompense considérable à celui qui y réussiroit. D'autres aussi simples, ou même plus simples encore, se sont imaginé que le problème des longitudes en dépendoit: ajoutons à ces prétentions celle que les plus grands Géomètres ont recherché ou recherchent la quadrature du cercle, comme si ce problème étoit l'objet unique & le but de toute la Géométrie. Ce sont là trois points sur lesquels ces bonnes gens\* ne manquent guere d'in-

\* Voyez le Sieur Basselin, dans sa quadrat.

fister beaucoup : il faut les en désabuser. Il n'y a aucune récompense promise ou à espérer pour celui qui quarrera le cercle. Il est ridicule de prétendre que les longitudes en dépendent. La raison de la circonférence au diamètre n'entre pour rien dans aucun problème de navigation ; & si quelqu'un la supposoit, comme c'est un problème de pure pratique, il seroit plus que suffisamment résolu par quelque'une des plus simples approximations du cercle : celle de *Meius*, par exemple, qui differe de la vérité de moins d'une 1, 000, 000<sup>e</sup>, & dont l'erreur sur toute la circonférence de la terre ne va pas à 25 toises. Il y a aussi peu de réalité dans les prétendues recherches des grands Géometres sur la quadrature du cercle : nous en avons assez dit dans l'article précédent, pour faire connoître qu'ils ont eu des vûes plus générales en la recherchant. C'est en avoir d'excessivement bornées en Géométrie, que de n'y voir rien de plus inté-

ressant que cette question. Je reviens à mon sujet.

XI. Quant à la quadrature approchée du cercle & des figures courbes, il est évident à qui connoît l'objet de la Géométrie, qu'elle devient nécessaire dès qu'on suppose la mesure absolue impossible, ou encore inconnue. Mille problêmes, soit dans les mathématiques pures, soit dans les sciences physico-mathématiques, ramènent sans cesse à cette mesure. Il n'en faut pas davantage pour justifier les Géomètres de leurs peines à se procurer des approximations si peu différentes de la vérité, qu'elles puissent en tenir lieu dans tous les cas. S'ils ont quelquefois passé les bornes de cette nécessité, on le leur pardonnera quand on aura fait attention que c'est à cette curiosité, en apparence inutile, quoique souvent justifiée par les plus heureuses découvertes, que toutes les sciences doivent leur avancement.

## CHAPITRE II.

*Tentatives & travaux des Anciens  
pour la mesure du Cercle.*

I. **I**L est dans l'ordre des progrès de l'esprit humain que la mesure du cercle se soit fait désirer bientôt après qu'on eut trouvé celle des figures rectilignes. Ces objets de la Géométrie naissante arrêterent peu les premiers qui la cultiverent, & à en juger par d'autres découvertes faites dès le tems de *Thalès* & de *Pythagore*, ou peu après eux, ils furent bientôt au-dessus de ces foibles objets de spéculation. On peut donc conjecturer que les premiers efforts pour mesurer le cercle ont une date presque aussi ancienne que la naissance de la Géométrie chez les Grecs.

II. On ne peut douter du moins que près d'un siècle & demi après cette époque, le problème ne commençât à

occuper les Géometres. *Plutarque* (a) nous en fournit une preuve, en nous apprenant que le Philosophe *Anaxagore* (b) s'en occupa dans sa prison, qu'il y composa même un ouvrage à son sujet. Nous ignorons au reste entièrement quelles furent ses prétentions, s'il crut avoir réussi, ou s'il informoit seulement les Géometres des difficultés qui s'étoient présentées à lui dans sa recherche. Cette dernière opinion est plus probable, si nous faisons attention aux éloges que lui donnoit *Platon* (c), sur sa grande habileté en Géométrie.

III. Quoiqu'il en soit, bientôt après cette tentative le problème de la quadrature du cercle devint très-célèbre. Il étoit dès le tems de *Socrate*, & sortant des écoles des Philosophes, il avoit déjà

(a) *Traité de exilio.*

(b) *Anaxagore de Clazomène*, le 4<sup>e</sup> chef de la secte Ionienne, vivoit vers l'an 480 avant J. C. Il fut contemporain de *Périclès*, qui lui sauva la vie, ayant été accusé d'impiété, pour avoir pensé que les astres étoient matériels.

(c) *Proclus. Com. in Encl. p. 38.*

excité la curiosité du vulgaire. *Aristophane* en faisoit l'occasion pour plaisanter dans sa Comédie des *Oiseaux* : *Je vais*, fait-il dire à un Géometre qu'il introduit sur la scène, *la regle & l'équerre en main, vous quarrer le cercle*. Le peuple d'Athènes avoit probablement le même penchant que le vulgaire d'aujourd'hui à donner à ces paroles un sens absurde, & le Poëte s'en prévaloit pour l'exciter à rire. La note d'un Scholiaste Grec, qui sur cet endroit remarque sçavamment qu'il est impossible qu'un cercle soit quarré, confirme le sens que je donne à ces paroles. Il est bien plus naturel que de penser qu'*Aristophane* eût en vûe les fausses solutions des mauvais Géometres, & leurs erreurs déjà multipliées sur ce sujet ; cela ne seroit bon qu'auprès d'un peuple de Mathématiciens.

Au reste, je remarque sur cet endroit d'*Aristophane*, une particularité qui me paroît peu connue, quoiqu'elle

n'ait pas échappé à ses Commentateurs ; c'est que ce Comique jouoit dans cette scene le fameux *Méton*, auteur \* du *Cycle lunaire*. Le nom qu'il donne à ce personnage, & les discours qu'il lui fait tenir, ne laissent aucun lieu d'en douter ; car l'autre Interlocuteur lui demandant *qui il est*, le Géometre lui répond : *Je suis Méton, cet homme bien connu des gens de la Campagne & de toute la Grece*. Ces particularités conviennent parfaitement à *Méton* l'Astronome, à cause de son invention reçue avec tant d'applaudissemens, & des sortes de *Calendriers* que les Astronomes publioient déjà, & qui étoient principalement à l'usage des Navigateurs & de ceux qui cultivoient la terre. Plusieurs autres discours ridicules concernant l'Astronomie, que tient *Méton* dans cette scene, donnent un nouveau poids à ce qu'on vient de dire. Cet endroit d'*Aristophane* peut encore avoir trait à une circon-

\* Environ 430 ans avant J. C.



tance de la vie de *Médon*, sçavoir, à la folie simulée par laquelle il sçut habilement s'exempter d'aller à l'expédition de Sicile, si funeste pour tous ceux qui y eurent part. *Médon*, ou manquant de courage, ou prévoyant la mauvaise issue qu'elle auroit, contrefit l'insensé, comme autrefois *Ulysse* pour ne point aller à la guerre de Troye, & probablement il dut la vie à cette adresse.

IV. Ces plaisanteries d'un Comique qui n'épargnoit pas les hommes même les plus respectables, témoin le sage *Socrate*, n'empêcherent pas *Hippocrate de Chio*, Géomètre célèbre & environ du même tems, de tenter le problème. La Géométrie y gagna une découverte remarquable, du moins pour ce tems-là. Quoique personne n'ait encore pû réussir à quarrer le cercle entier, *Hippocrate* trouva la quadrature d'une de ses parties; c'est ce que nous appelons aujourd'hui la lunulle ou les lunulles d'*Hippocrate*, à cause de leur figure semblable

à celle d'un croissant. Cette découverte est aujourd'hui si connue, même à ceux qui ne se sont jamais élevés au-dessus de la Géométrie élémentaire, que je puis me dispenser de l'expliquer; je le fais d'autant plus volontiers, que je me ménage par là un peu plus d'étendue pour des choses plus intéressantes.

V. Rien n'étoit plus propre à entretenir une espérance flatteuse de la quadrature du cercle que cette découverte; *Hippocrate* s'y livra en effet, & elle le conduisit à un malheureux naufrage, si nous prenons à la rigueur ce que disent *Aristote*, & *Eudemus* l'historien de la Géométrie ancienne, cité par *Simplicius*. Tel étoit le raisonnement d'*Hippocrate*, suivant ces Auteurs. Il inscrivait à un demi-cercle *A* (*fig. 2.*) un demi-exagone, & sur chacun des côtés il décrivoit les demi-cercles *B. C. D.* puis un quatrième *E* à part. Après quoi il raisonnoit ainsi: ces quatre demi-cercles, disoit-il, sont égaux au

plus grand *A* ; ôtant donc ce qu'ils ont de commun , sçavoir les trois segments *b. c. d* , on aura les trois lunulles *B. C. D.* & le demi-cercle *E* égaux à l'exagone *A*. Qu'on ôte donc , continuoit-il , de cet espace rectiligne la valeur de ces trois lunulles , le restant sera égal au demi-cercle *E*.

Le foible de ce raisonnement est si aisé à sentir , que malgré l'autorité des Historiens que j'ai cités , je ne puis me persuader qu'*Hippocrate* en ait été séduit ; en effet , il est visible que ces lunulles ne sont point celles dont il avoit précédemment donné la quadrature. Comment accorder une inattention si grossière avec la sagacité que d'autres découvertes lui supposent ? Toujours porté à juger favorablement de ceux qui ont bien mérité des sciences , je crois qu'il faut donner quelque autre sens à cela. *Hippocrate* ne vouloit-il point proposer un moyen qu'il jugeoit propre à conduire quelque jour à la quadrature

du cercle ? il avoit quarré une espece de lunulle, il pouvoit espérer que quelqu'autre plus heureux quarreroit un jour une de celles qui entroient dans son raisonnement; dans ce cas voilà, disoit-il, la quadrature du cercle trouvée. C'est ainsi qu'il transformoit le problème de la duplication du cube en un autre, sçavoir en celui de l'invention des deux moyennes proportionnelles. Au reste, j'abandonne ce Géometre à son mauvais sort, dans l'esprit de ceux qui croiront devoir déférer davantage aux témoignages d'*Aristote*, d'*Endemus* & d'*Eutocius*, qu'à mes réflexions. Je remarque seulement que les services réels qu'il rendit à la Géométrie de son tems, doivent effacer de son nom la tache que cette erreur y laisseroit imprimée, s'il n'étoit connu que par elle.\*

\* Quoique la découverte de la lunulle d'*Hippocrate* soit des plus élémentaires, plusieurs Géometres modernes de la premiere classe semblent s'être plus à l'illustrer par diverses additions

VI. Nous devons à *Aristote* la mémoire de deux Géometres qui prétendirent contribuer de leurs lumières à la

ingénieuses. M. de *Tchirnausen* a annoncé (*Actes de Leipsik* 1687), que tirant une ligne quelconque du centre *C* (*fig. 2.*), l'espace courbe *AID* étoit encore absolument quarrable, & qu'il étoit égal au triangle rectiligne *ACH*, déterminé par la perpendiculaire *DH* à *AB*. La même chose à peu près a été rencontrée par M. *Jean Percks*, qui égale à cet espace le triangle *ADF*, ce qui est plus aisé à appercevoir (*Transf. Phil.* 1699. & *Act. de Leip.* 1700). Voici la démonstration de l'une & de l'autre. L'arc *AI* qui mesure l'angle *ACI* qui est à son centre, est semblable à la moitié de l'arc *AD* qui mesure le même angle, parce qu'il est à la circonférence du cercle dont *BDA* est portion. Donc le segment entier dont *AFI* est la moitié, est semblable au segment *AD*, & par conséquent ils sont entr'eux comme les quarrés des rayons de leur cercle, c'est-à-dire comme 2 à 1. Le demi-segment *AFI* est donc égal à *AD*, & le triangle *ADF* rectiligne égal à l'espace curviligne triangulaire *ADI*. A présent le triangle *ACH* est à *ACB*, comme *AH* à *AB*,

découverte de la quadrature du cercle : mais quoique ce Philosophe les désapprouve également, ce seroit faire tort à

ou le quarré de  $AD$  au quarré de  $AB$ , mais c'est encore là la raison du triangle  $ADF$  à  $ACB$ , à cause qu'ils sont semblables ; l'angle  $ADF$  étant toujours demi-droit, puisqu'il est appuyé sur le quart de cercle  $AC$ , qui se formeroit de la continuation du demi-cercle  $BEA$ . Le triangle  $ADF$  est donc égal à  $ACH$ , & par conséquent l'espace curviligne  $ADI$  est égal à l'un ou à l'autre. M. M. *Gregori*, *Wallis* & *Caswal* (*Act. de Leip. lieux cités*) ont trouvé divers autres espaces absolument quarrables dans la lunulle conjugée, c'est-à-dire celle qui se formeroit par les mêmes circonférences continuées. M. de l'Hôpital a donné, (*Mém. de l'Ac. 1701*), une méthode pour retrancher tant qu'on voudra d'espaces absolument quarrables compris entre deux paralleles, comme  $GK$ , soit dans l'ancienne lunulle d'*Hippocrate*, soit dans celle qui se fait du demi-cercle  $AEB$ , & des deux quarts de cercle rentrants, comme  $Blic$ , *Afc*.

Avant tous ces Géometres, M. *Viète* avoit imaginé une maniere beaucoup plus générale  
l'un

l'un d'eux que de les ranger dans la même classe : *Bryson* raisonnoit bien mal pour un Géometre , si c'en étoit

de trouver des lunulles absolument quarrables, dont celle d'*Hippocrate* n'est qu'un cas particulier ; car si l'on a un arc de cercle comme *ABCDE* (*fig. 4.*), tel qu'étant divisé en un certain nombre de parties, comme ici en 4 (ou plus généralement *m*), le quarré de *AE* soit à celui de la corde d'une des portions dans la raison de 4 à 1, (ou de *m* à 1), il est visible que faisant l'arc sur *AE* semblable à ceux des segmens *AB, BC, &c.* l'espace circulaire courbe *ABCDD EFA*, sera égal au polygone rectiligne *ABCDEA*, ce qui est assez évident pour m'éviter la peine de le démontrer. Or toutes les fois que *m* ne surpassera pas 3, on pourra trouver un pareil arc par la Géométrie plane ; mais le problème sera solide ou plus que solide quand *m* sera un nombre plus grand. Tout cela dépend & se démontre aisément à l'aide de la théorie des sections angulaires, ou des rapports des cordes des arcs multiples ou sous-multiples.

On trouve dans les *Mém. de l'Acad. de Berlin 1747*, un Mémoire de *M. Cramer*, où après avoir réfuté l'opinion de *M. Heinius*,

un, lorsqu'il prétendoit que le cercle étoit moyen proportionnel entre le quarré inscrit & le circonscrit. Il étoit

qui avoit prétendu qu'*Hippocrate de Chio* étoit le même qu'*Ænopide de Chio*, autre Géometre & Astronome Pythagoricien, il ajoute quelques découvertes nouvelles sur cette fameuse lunulle. Mais il seroit long de les expliquer ici, & cette note, où j'ai encore bien des choses à dire, en deviendroit d'une prolixité excessive.

L'invention d'*Hippocrate de Chio* n'est qu'un exemple particulier d'un espace circulaire absolument quarrable; on peut en trouver une infinité d'autres, & divers Géometres en ont donné des exemples. On a un ouvrage de M. *Artus de Lionne*, Evêque de Gap, intitulé *Curvilinearum amantior contemplatio*, où ce Prélat Géometre a donné un grand nombre de pareils espaces: ce que j'ai dit plus haut des additions de M. M. *Tchirnausen & Perks* à la lunulle d'*Hippocrate*, ne lui avoit pas échappé. M. *Varignon* en a donné un nouvel exemple dans les Mém. de l'Acad. de 1703; il y fait voir que si l'on a deux cercles concentriques & un secteur  $ACB$  (fig. 5), & qu'on prenne l'arc  $DF$  à  $DE$ , comme  $CA^2 - CD^2 : CD^2$ , l'espace  $EDFAB$  est



aisé de voir dès-lors que ce moyen proportionnel étoit seulement l'octogone; car en général deux polygones semblables étant inscrits & circonscrits au cercle, le moyen proportionnel entre

égal au triangle rectiligne  $CF A$ ; car le secteur  $CF D$  est au secteur  $CDE$ , comme  $FD : DE$ , conséquemment comme  $CA D - CD^2$  à  $CD^2$  par la construction; or cette dernière raison est encore celle de la portion circulaire  $EBAB$  au secteur  $DEC$ ; le secteur  $CF D$  est donc égal à  $EBAB$ , & ajoutant de part & d'autre  $FAD$ , on a  $FABEDF =$  au triangle  $ACF$ . Un jeune Géometre, le frere de M. *Clairault*, de l'Académie des Sciences, âgé de 14 ans, donna en 1730 un petit ouvrage très-ingénieux sur ces espaces circulaires absolument quarrables, dont il a trouvé un grand nombre au-delà de ceux qui étoient déjà connus. On a quelque chose de semblable de M. *Saumon* (*Mém. de l'Acad.* 1712). Mais je ne m'arrête pas davantage à ces curiosités géométriques afin d'abrèger; ceux qui en seroient plus amateurs qu'elles ne méritent ordinairement, peuvent consulter les livres & les endroits cités.

eux deux est l'inscrit qui a le double de côtés.

Il y a plus de justesse dans la prétention du Géomètre *Antiphon*; celui-ci regardoit le cercle comme un polygone d'une infinité de côtés; c'est du moins ce qu'il est naturel de conjecturer d'après ce qu'il disoit que l'arc diminuant de plus en plus, se confondoit enfin avec sa corde. Mais cette idée fut mal accueillie des Anciens; le tems n'étoit pas encore venu où l'on oseroit, qu'on me permette ce terme, envisager de face l'infini. Au surplus c'étoit une idée stérile dans ce tems-là. Comment déterminer la raison d'un polygone inscrit au dernier de cette suite infinie, qui se confond enfin avec le cercle? *Viète* l'a fait, à la vérité, parmi nous, par le moyen d'une suite infinie de termes, mais sans beaucoup d'avantage pour la mesure du cercle. On en parlera quand il en sera tems.

VII. On aura quelque lieu de

s'étonner que malgré les recherches de tant de Géometres pour quarrer le cercle, on ait été jusqu'au tems d'*Archimede* \* sans en connoître, du moins à peu près, la grandeur; j'entends dire avec quelque exactitude suffisante pour la pratique. Le Géometre de Syracuse, quoiqu'entièrement livré à la théorie la plus sublime, sentit, ce semble, le premier l'utilité de cette connoissance; ses découvertes sur un grand nombre de corps & de surfaces, qui le ramenoient continuellement à la mesure du cercle, tournerent nécessairement ses vûes de ce côté: laissant donc la recherche de la quadrature absolue, qu'il jugea très-difficile, peut-être impossible, il se borna à en approcher d'assez près, & il rendit par là un service considérable aux Arts. Nous devons à ces sages vûes

\* *Archimede* fleurissoit vers le milieu du troisieme siècle avant J. C. & fut tué fort âgé à la prise de Syracuse, l'an 212 avant l'ere chrétienne.

le livre de *dimensione circuli*, livre où il démontre ces deux vérités d'un usage si journalier ; l'une que le cercle & tout secteur de cercle est égal au triangle rectangle formé de sa circonférence pour base, & du rayon pour hauteur ; l'autre que la circonférence du cercle est moindre que 3 fois & les  $\frac{10}{70}$  du diamètre, mais qu'elle est plus grande que trois fois & les  $\frac{10}{71}$  de ce même diamètre : d'où il suit que la circonférence diffère peu de la première de ces limites, & qu'elle est, à peu de chose près, égale à trois fois &  $\frac{1}{7}$  du diamètre, ou qu'elle lui est très-près, comme 7 à 22 ; & le cercle au carré du diamètre comme 11 à 14. La pratique des Arts, que l'on servira toujours utilement quand à une exactitude médiocre on alliera une grande facilité, a adopté ce rapport, le plus exact de tous ceux qu'on puisse donner en aussi peu de chiffres. *Archimede*, comme nous en assure son commentateur *Eutocius* \*

\* *Comm. in librum de dim. circuli.*

se propofa ce feul objet ; fans cela il lui auroit été facile d'atteindre par fa méthode à une plus grande précision, Mais celle-ci eft fuffifante dans les cas les plus ordinaires , & il n'y a plus que les derniers des Artifans qui l'ignorent , ou qui négligent de s'en fervir.

VIII. Tout le monde , du moins le monde Géometre , fçait de quelle maniere *Archimede* parvint à cette approximation ; mais il ne fera peut-être pas inutile de l'expofer pour ceux qui , peu verfés dans la Géometrie , n'en auroient pas une idée diftincte. Il eft clair , par les plus communes notions , que la circonférence du cercle eft moindre que le polygone circonfcrit , & plus grande que l'infcrit. *Archimede* infcrivit donc & circonfcrivit au cercle deux polygones de 96 côtés chacun , & calcula , par les propriétés du cercle la longueur de leur contour : or ce calcul lui montra que le polygone infcrit étoit plus grand que  $3\frac{10}{71}$  du diametre , & que celui du cir-

polygone inscrit est plus grand que 6336; or comme cette raison est certainement plus grande que celle de  $3 \frac{10}{71}$  à 1, il est évident que la circonférence du cercle est au diamètre en une raison plus grande que celle de  $3 \frac{10}{71}$  à 1, ou qu'elle est plus grande que  $3 \frac{10}{71}$  du diamètre. Un artifice semblable fait conclure à *Archimède* que le contour du polygone circonscrit est moindre que 14688, le diamètre étant  $4673 \frac{1}{2}$ , d'où il conclut que la circonférence est moindre que les  $3 \frac{10}{71}$  du diamètre. On peut s'assurer de tout ceci dans le Commentaire d'*Eutocius*, qui sentant toute l'importance de ce procédé ingénieux, l'a développé avec soin. La conséquence d'*Archimède* est inébranlable.

M. de Lagni a remarqué dans le calcul d'*Archimède* une nouvelle finesse que personne n'y avoit apperçu avant lui. Le Géometre Grec suppose le rayon à la tangente de  $30^\circ$ , comme 265 à 153; ces deux lignes sont d'ailleurs

comme  $1 : \sqrt{3}$ , de sorte qu'il est évident qu'*Archimède* extrayant la racine de 3, l'a déterminé prochainement égale à  $\frac{261}{153}$ . Or cette valeur est précisément une de celles qu'une analyse assez fine fait rencontrer en cherchant les fractions rationnelles les plus simples en même temps, & les plus approchantes de la racine cherchée : car  $\frac{261}{153}$  équivalent en fractions décimales à  $1.732026$  — qui ne s'écartent de la vraie racine de 3, sçavoir  $1.732050$  — que de  $\frac{24}{4000000}$  ou moins d'une 40000<sup>e</sup>. Mais la valeur trouvée par *Archimède* a sans doute l'avantage d'être beaucoup plus simple. Comme une exactitude si recherchée ne peut point être un effet du hazard, ce nous est une nouvelle raison de remarquer le génie de ce grand homme dans le choix adroit qu'il a sçu faire des nombres les plus avantageux.

X. Ce ne sont pas seulement les Géomètres modernes, qui affectant une précision plus grande que celle d'*Archi-*

*mede*, ont cherché à approcher de plus près du cercle, l'antiquité eut aussi ses laborieux approximateurs; il est, à la vérité, fort probable que la grande difficulté des opérations de leur arithmétique ne leur permit pas d'aller bien loin. On sçait que cette difficulté étoit si grande qu'il leur étoit absolument impossible de manier des chiffres aussi considérables que les nôtres; ainsi ils durent rester beaucoup au-dessous des Modernes. *Appollonius* \*, le célèbre Géometre, est un de ces anciens approximateurs; il donna un rapport plus approchant de la vérité que celui d'*Archimede*, dans l'ouvrage intitulé *Οκτώτομος*, dont on ne sçait point la signification, & un de ceux de cet Auteur que nous n'avons plus. *Eutocius* nous apprend cela dans son Commentaire sur *Archimede*; il nous y cite aussi un autre

\* *Appollonius* de Perge fleurissoit environ 200 ans avant J. C.



Géometre nommé *Philon' de Gadare* \* (*Ἀπογασαῖων*), qui à l'exemple d'*Appollonius* avoit enchéri sur le Géometre de Syracuse, & probablement sur *Appollonius* même, auquel il est postérieur : l'un & l'autre, suivant le récit d'*Eutocius*, avoient poussé leurs approximations à de grands nombres. Ce Commentateur, en nous apprenant que dans le rapport qu'ils avoient donné il entroit des *myriades*, c'est-à-dire des dix millièmes, nous donne lieu de juger qu'ils avoient prévenu une pareille erreur au moins, & peut-être une plus considérable ; car comme on ne connoissoit point alors les fractions décimales, il est probable qu'ils avoient rencontré quelqu'une des fractions de la suite  $\frac{7}{22}$ ,  $\frac{106}{333}$ ,  $\frac{113}{355}$ ,  $\frac{33102}{103993}$ , dont la dernière équivaloit à une approximation en 10 décimales au moins.

\* Il est mal-à-propos nommé *Gaditanus* par la plupart de ceux qui l'ont connu ; la ville de *Gadare* étoit une ville d'Asie. On ignore le tems où il vivoit.

XI. La découverte d'*Archimede* sur les spirales, quoique peu utile à la mesure du cercle, comme je l'ai déjà annoncé (*Chap. I. §. 6.*), a cependant avec elle une sorte d'affinité qui ne me permet pas de la passer sous silence. Elle sert du moins à démontrer ce dont quelques Géometres ont sérieusement douté, s'il étoit possible qu'une ligne droite égalât une courbe. *Viete* le révoquoit en doute, se fondant sur le paradoxe de l'angle de contingence moindre que tout angle rectiligne, qu'on n'avoit pas encore développé, & *Descartes* donna presque dans le même sentiment, du moins il doutoit fort qu'on trouvât jamais la rectification d'aucune courbe; mais ces deux illustres Géometres ne faisoient pas attention dans ce moment à la vérité démontrée par *Archimede*, & *Viete* sur-tout étoit monté sur le ton de paradoxe, lorsqu'il avançoit cette opinion. Il est aujourd'hui connu, je dirais pres-

que trivial, que toute tangente à la spirale détermine une ligne droite égale à un arc de cercle aisément assignable. A quoi tient-il donc, dira quelqu'un, que l'on n'ait la quadrature du cercle ? J'en ai déjà donné la raison ; il faudroit pouvoir tirer cette tangente d'une manière qui ne dépendît pas de la rectification de cet arc, & c'est ce qui est impossible.

XII. Le même inconvénient, si cependant on peut donner ce nom à ce qui paroît devoir être ainsi dans la nature ; le même inconvénient, dis-je, se rencontre dans toutes les autres courbes décrites par une combinaison de mouvement rectiligne & circulaire. Dans toutes ces courbes la tangente détermine une ligne droite égale, ou en rapport donné avec un arc de cercle. Mais il est facile de se convaincre, à l'aide d'une certaine métaphysique de Géométrie, qu'on n'en doit jamais attendre pour la quadrature du cercle. En

effet si quelque construction géométrique, où il n'entreroit que des lignes droites, pouvoit déterminer la position de la tangente à une courbe de cette nature, ce seroit résoudre un problème sans avoir égard à ses conditions essentiellement déterminatrices; car il est aisé de sentir que la situation de la tangente dépendant nécessairement des propriétés de la formation de la courbe, si elle est décrite par une combinaison de mouvemens, il faut connoître leur rapport, & par conséquent dans les cas dont il s'agit ici, celui du mouvement circulaire avec le rectiligne, ce qui est précisément ce que l'on cherche. Le seul moyen de l'éviter seroit de trouver quelque autre construction qui n'employât qu'un mouvement rectiligne; mais il y auroit de l'absurdité à le tenter seulement, puisque ce seroit visiblement changer la nature de la courbe.

---

---

## CHAPITRE III.

*Progrès des recherches sur la quadrature du Cercle parmi les Géometres modernes jusqu'à l'invention des nouveaux calculs.*

I. **L**ES premières années qui suivent la renaissance des mathématiques en Europe, époque que je fixe au milieu du 15<sup>e</sup> siècle, où fleurirent *Purbach* & *Regiomontanus*, ne fournissent rien de remarquable à cette Histoire. Le dernier de ces Mathématiciens mérite, il est vrai, des éloges, pour le soin qu'il prit de combattre les prétendues quadratures du Cardinal *de Cusa*, homme célèbre de son tems, & qui en auroit imposé si l'on pouvoit en imposer aux Géometres. Cet examen lui fournit même une occasion de déterminer des limites de la grandeur du

cercle, quelque peu plus rapprochées que celles d'*Archimede*\* : je ne crois cependant pas devoir m'y arrêter, pour passer à des objets plus intéressans.

II. *Metius* est le premier des Modernes à qui l'on doit quelque invention remarquable sur la mesure du cercle. La proportion de 113 à 355, par laquelle il exprima celle du diamètre à la circonférence, a une célébrité justement méritée; elle a, en effet, un avantage bien digne de remarque. C'est qu'elle approche tellement de la vérité, qu'étant exprimée en fractions décimales, elle ne s'écarte que dans le 8<sup>e</sup> chiffre de la proportion si connue de 1.000000000, &c. à 3.1415926535, &c. Soit bonheur, soit adresse, *Metius* rencontra, de toutes les fractions possibles exprimées en 3 chiffres seulement, celle qui est la plus exacte. Au reste ce *Metius* n'est point *Adrianus Metius*,

\* *De quad. circuli adv. Nic. de Cusa.*

Mathématicien connu du commencement du 17<sup>e</sup> siècle, & frere de *Jacques Metius* réputé l'inventeur du télescope ; c'est *Pierre Metius*, le pere de l'un & de l'autre, Mathématicien des Etats de Hollande, & qui vivoit sur la fin du 16<sup>e</sup> siècle. Je ne fais cette observation que parce que j'ai remarqué qu'on se trompoit ordinairement en attribuant au fils cette invention, que lui-même revendique à son pere dans ses ouvrages.

III. Le célèbre *M. Viète*, dont les travaux ont tant aidé l'analyse, contribua aussi de quelque chose à la mesure du cercle. On trouve, ce qui mérite d'être observé, dans une expression qu'il donna pour le représenter \*, on y trouve, dis-je, la premiere idée d'une suite infinie de termes. Travaillant à tirer quelque parti de cette connoissance, déjà ancienne quoique peu goûtée, que

\* *Vieta opera, variorum de rebus math. resp. cap. 18.*

le cercle étoit le dernier des polygone inscrits ou circonscrits, il démontra que le rapport du carré inscrit à ce dernier polygone étoit celui de  $\sqrt{\frac{1}{2}}$  à 1 divisé par  $\sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}}}$ , &c. & ainsi à l'infini; de maniere que le diametre étant l'unité, le cercle est l'unité divisée par  $2 \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}}}$ , &c. Il seroit laborieux, j'en conviens, de tirer de là une valeur en termes rationaux; ainsi quoique cette découverte considérée dans la spéculation, ait sa beauté, je n'y insiste pas beaucoup. Viète rendit sans doute un plus grand service à la Géométrie, lorsqu'il établit ce rapport approché du diametre à la circonférence en 11 chiffres; sçavoir, comme 1, 00000, 00000, à 3, 14159, 26535 + : \* l'erreur est moindre que

\* *Ibid. cap. 15.* M. Viète fleurissoit vers la fin du 16<sup>e</sup> siècle, il mourut en 1603 âgé de



l'unité dans le dernier nombre, qui finissant par 6, excéderoit dès-lors la vérité; c'est ce que nous avons voulu désigner par le signe  $+$ , qui annonce que le chiffre 5 est moindre qu'il ne faut; 6  $-$  signifieroit que 6 est trop grand. Personne que je connoisse n'en avoit encore approché de si près, & cette approximation peut être regardée comme le premier exemple, le signal de celles que plusieurs Géometres donnerent dans la suite.

IV. Il semble en effet que les Géometres desespérant d'atteindre à la mesure précise du cercle, ont cherché à s'en dédommager par des approximations d'une exactitude fort supérieure à nos besoins. Celle de *Viete* fut effacée par celle d'*Adrianus Romanus*: ce Géometre des Pays - bas calcula laborieusement la grandeur du côté d'un

63 ans. M. de Thou en a fait un éloge étendu dans son Histoire universelle, liv. 129.

polygone de 1073741824 côtés, & déterminâ par ce moyen le rapport en 16 chiffres de 1, 00000, 00000, 00000, à 3, 14159, 26535, 89793 +; mais ce travail de *Romanus*, quelque grand qu'il soit, est cependant encore beaucoup inférieur à celui que *Ludolph Van Ceulen* \*, son contemporain, eut le courage d'entreprendre. On doit à celui-ci une proportion exprimée en 36 chiffres, le diamètre étant l'unité suivie de 35 zéros; la circonférence est entre ces deux nombres: 3, 14159, 26535, 89793, 23846, 26433, 83279, 50288, & le même augmenté d'une unité seule.

Quant au procédé de *Ludolph*, il est nécessaire de le rapporter ici, pour

\* *Ludolph* étoit de Cologne, d'où lui vient son nom de *Van Ceulen*, car Cologne se dit en en Hollandois *Ceulen*: il fut long-tems Professeur de Mathématiques en Hollande, à *Amsterdam* ou *Breda*. On ne sçait presque rien de lui, parce que *Valere André* ne l'a pas mis dans sa Bibliothèque Belgique.

donner une idée du travail immense qu'il surmonta. Il supposa d'abord le rayon égal à l'unité suivie de 75 zéros, & d'après cet immense rayon il calcula les cordes des arcs continuellement décroissans depuis le quart du cercle jusqu'à l'arc, qui n'est que la 36748890763739103232<sup>e</sup> de la circonférence; il calcula de même le côté du polygone circonscrit correspondant à cet arc, & ayant trouvé les longueurs de ces polygones, il les compara ensemble. Or il trouva qu'ils coincidoient dans leur 36 premiers chiffres; d'où il conclut que ces 36 premiers chiffres exprimoient, à moins d'une unité près, la grandeur de la circonférence; cela est aisé à sentir. La suite des opérations de *Ludolph* est exposée dans quelques-uns de ses ouvrages\*, où les Géomètres de son tems purent l'examiner. Le P. *Griemberger*, un de ceux qui

\* *Fund. Geom. lib. 6. de circulo & adscriptis. Zetematum Geom. epilogismus*, p. 92.

eurent le courage de le faire, assura le monde sçavant de leur justesse, & par conséquent de celle de l'approximation qu'il en tiroit. (a).

*Ludolph* avoit quelque raison de s'applaudir de son invention; à l'exemple d'*Archimede*, il voulut en transmettre la mémoire à la postérité par un monument qui y eût rapport; & il souhaita, pour cet effet, qu'on gravât ces deux nombres sur son tombeau (b): cette disposition a été exécutée, & ce monument géométrique subsiste encore aujourd'hui, à ce que j'ai lû quelque part.

VI. Cependant à apprécier au juste le travail immense de *Ludolph*, il est bien plus propre à lui procurer la réputation d'un infatigable calculateur que d'un homme de génie. On fait, & avec quelque raison, en Mathématique, peu de cas de ce qui n'est que le

(a) *Riccioli. Almag. novum.*

(b) *Snellii cyclom. pr. 31, p. 55.*

fruit de la patience. Sans rabaisser donc le mérite de *Ludoph*, que nous sçavons d'ailleurs avoir été un habile analyste, il me paroît que le Géomètre dont je vais parler mérite plus d'éloges pour les découvertes qu'il ajouta à la Cyclo-métrie.

*Willebrord Snellius*, c'est ce Géomètre, se proposa d'abrèger ces pénibles opérations, par le moyen de quelques propriétés du cercle qui donnaissent des limites plus rapprochées que les polygones inscrits & circonscrits traités à la manière d'*Archimède*, & il y réussit assez heureusement. Il sçut démêler deux théorèmes propres à son dessein, & qui lui feroient encore plus d'honneur s'il avoit pû parvenir à les démontrer parfaitement : en effet l'espèce de démonstration qu'il en donne n'est pas absolument convaincante. Il suffit ici qu'il ne se trompe pas ; car l'illustre *M. Huygens* les établit dans la suite avec toute la rigueur géométrique.

Voici ces théorèmes fondamentaux de Snellius\*.

1°. Si l'on prolonge le diamètre  $AB$  d'un cercle en  $D$  (fig. 7. n. 1), de manière que  $BD$  soit égale au rayon, la ligne  $DF$  retranche de la tangente  $AG$  un segment  $AF$  moindre & à très-peu de chose près égal à l'arc contigu  $AE$ .

2°. Mais que  $d$   $f$  (fig. 7. n. 2) soit tiré de manière que le segment  $d$   $l$  soit égal au rayon, dans ce cas le segment  $a$   $f$  de la tangente sera plus grand que l'arc  $a$   $e$ ; & comme alors la tangente  $a$   $f$  est égale à deux fois le sinus, plus une fois la tangente du tiers de l'arc, il suit que deux fois le sinus plus une fois la tangente d'un arc, forment une somme très-approchant de la grandeur du triple de cet arc.

Ces deux théorèmes réduisent à moins de la moitié le travail des approximations qui jusqu'alors avoient exigé de si laborieux calculs. Snell-

\* Voyez son livre intitulé *Cyclometricus*. Prop. 27. 29. -

*lius* \* en donne plusieurs exemples, qui mettent dans un grand jour l'avantage de sa méthode. *Archimede* avoit été obligé d'employer deux polygones, l'un inscrit, l'autre circonscrit, de 96 côtés chacun, pour en tirer son rapport de 7 : 22. Le Géometre moderne y parvient par la connoissance du seul côté de l'exagone, & le polygone de 96 côtés mis en œuvre par celui-ci, lui donne la prop. de 1. 0000000, à 3. 1415926 : il détermine enfin & vérifie celle de *Ludolph*, par un polygone qui n'auroit donné à ce Géometre que les 17 premiers chiffres de son rapport ; il est de la nature de l'opération de *Snellius* de donner toujours plus du double de chiffres vrais que la méthode ordinaire, sans y employer plus de travail. Il auroit pu, avec le côté du dernier polygone de *Ludolph*, s'il eût été parfaitement exact dans tous

\* *Ibid.* prop. 31.

ses chiffres, trouver une approximation en 75 chiffres; le manque de cette condition, car il est évident qu'un grand nombre des derniers chiffres étoient incertains, l'empêcha d'aller aussi loin.

Je dois faire honneur à *Snellius* d'une remarque utile qu'il fait, concernant le calcul des côtés des polygones qui naissent de la sous-division continuelle d'un arc. Si  $BD$  (*fig. 8.*), dit-il \*, est la corde d'un arc quelconque, & qu'on divise en deux son complément  $DA$ , la corde  $DF$  est moyenne proportionnelle entre le rayon & le diamètre augmenté de la corde précédente; mais la corde  $AF$  est moyenne proportionnelle entre le même rayon & le diamètre moins la même corde. Ces deux théorèmes, qu'il est facile de vérifier par l'analyse, lui fournissent une suite d'expressions commodes à trouver sans au-

\* *Cyclom. prop. 1. & 2.*



un calcul, pour les côtés des polygones quelconques formés par la bisection continuelle d'un arc comme  $DA$ , dont la corde  $DB$  est connue. Il trouve donc aisément, à l'aide de ces deux théorèmes, que le rayon étant l'unité, &  $BD$  le côté du triangle équilatéral égal à

$$\sqrt{3}, \text{ on a } BF = \sqrt{2 + \sqrt{3}} \text{ \& } BG = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}; \text{ de même } AF = \sqrt{2 - \sqrt{3}} \text{ \& } AG \text{ le côté du dodécagone } = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}.$$

La loi de la progression est aisée à voir. Où il y a trois divisions successives, il y a trois termes enveloppés continuellement par le signe radical, de manière que chacun embrasse tout le reste de l'expression. Tous les signes sont positifs pour les cordes  $BF$ ,  $BG$ , & pour les cordes  $AD$ ,  $AF$ ,  $AG$ , le premier seul est négatif. Tous les nombres sont 2, ou plus généralement le produit du

rayon par le diamètre, & le dernier la valeur de la première corde  $BD$ . Si l'on vouloit après cela trouver la corde du  $45^{\circ}$  polygone, à commencer du carré inscrit, c'est-à-dire la corde de la 70368744177664 de la circonférence, on auroit. (la corde du carré étant  $\sqrt{2}$  si le diamètre est 2.), on auroit, dis-je, tout d'un coup

$$\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}, \text{ \&c.}$$

continuée jusqu'à la  $45^{\circ}$   $\sqrt{2}$  inclusive-ment.

*Snellius* a plus fait, il a pris la peine de calculer jusqu'à 55 décimales la valeur de ces cordes  $BF$ ,  $BG$ , &c. d'où il est aisé de tirer la grandeur du côté qu'on voudra dans cette suite. Dans un autre endroit \* il prend pour premier polygone celui de 80 côtés, & il donne les limites qui résultent des polygones inscrits & circonscrits, dont le nom-

\* *Ibid.* prop. 11.

bre des côtés va de là continuellement en doublant jusqu'au polygone de 5242880 côtés, de manière qu'une fausse grandeur de la circonférence étant proposée, il est toujours facile, en la réduisant en fraction décimale, de trouver au-dessus de quel polygone circonscrit, ou au-dessous de quel inscrit elle se rencontre; ce qui en démontre fort aisément la fausseté. \*

Comme ces limites peuvent avoir une utilité réelle pour ceux qui voudroient, ou qui auroient besoin de faire ces comparaisons, je vais les rapporter ici.

\* Quelques autres Géometres, qui ignoient sans doute ce qu'avoit fait *Snellius*, ont donné des expressions semblables, propres à faciliter le calcul des polygones; on peut voir *Wallis* sur ce sujet dans son *Algebre*, chap. 86, & *M. Nicole*, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, 1747.

Nombre des côtés.	Polygone inscrit.	Polygone circonsc.
80	3.140	3.143
160	3.141	3.142
320	3.1414	3.1418
640	3.1415	3.1416
1280	3.14158	3.14160
2560	3.141591	3.141595
5120	3.1415924	3.1415932
10240	3.14159260	3.14159281
40960	3.14159265	3.14159266
81920	3.141592652	3.141592656
163840	3.1415926533	3.1415926539
327680	3.1415926535	3.1415926536
655360	3.14159265357	3.14159265362
1310720	3.141592653586	3.141592653596
2621440	3.141592653588	3.141592653589
5242880	3.1415926535890	3.1415926535896

VII. Le célèbre M. *Huygens* entra peu d'années après *Snellius*, dans la même carrière que celui-ci avoit ouverte. Les premiers coups d'essai de ce Mathématicien illustre furent d'enrichir la Cyclométrie de plusieurs vérités utiles; ce que *Snellius* avoit tenté & laissé à certains égards imparfaits, M.

*Huygens*, encore fort jeune, le perfectionna considérablement; car non seulement il démontra \* les théorèmes où son compatriote avoit hésité, mais il ajouta à sa théorie plusieurs autres propriétés remarquables du cercle, dont quelques-unes lui donnerent des limites encore plus resserrées que celles que *Snellius* avoit déterminées. On va les exposer avec la brièveté qu'exigent les limites étroites de cet ouvrage; elles sont d'ailleurs dignes d'être connues, & probablement les Géometres les verront avec plaisir.

1<sup>o</sup>. *Tout cercle est plus grand que le polygone inscrit plus le tiers de ce dont il surpasse le polygone inscrit, qui a la moitié moins de côtés; & cela doit s'entendre non seulement de l'aire du cercle comparée à celle de ces polygones, mais encore de sa circonférence comparée à la leur.* Il suit de là que *tout arc de cercle est*

\* *De Circulæ magnitudine inventa*, 1654.

plus grand que sa corde augmentée du tiers de sa différence avec son sinus. Nommant donc  $C$  la corde,  $S$  le sinus, l'arc  $A$  sera  $> \frac{4C - S}{3}$ .

2°. Tout cercle comparé de même au polygone inscrit, est moindre que les  $\frac{2}{3}$  de ce polygone plus le tiers du polygone circonscrit semblable. D'où l'on peut inférer que tout arc est moindre que  $\frac{2}{3}$  de son sinus augmenté du tiers de sa tangente, ou  $< \frac{2}{3} S + \frac{1}{3} T$ , nommant  $T$  la tangente.

Cette seconde proposition, en partie la même, mais plus générale que celle de *Snellius*, fournit la seconde limite de la circonférence & de l'aire du cercle; la première étoit par défaut, celle-ci est excédente; mais l'une & l'autre approchent considérablement de la vérité, & *M. Huygens* s'en sert avec succès pour le même objet que *Snellius*. Le travail des approximations en est diminué de plus de la moitié.

Cependant, on doit le remarquer, cette méthode ne l'emporte pas encore sur celle de *Snellius*, & même elle reste quelque peu au-dessous; aussi M. *Huygens* ne s'y arrête-t-il pas, & pour surpasser ce dernier Géometre, il propose bientôt deux autres théorèmes qui resserrent encore davantage les limites de la circonférence: il démontre pour cet effet \* que,

3°. *Tout arc de cercle est moindre que sa corde augmentée d'une ligne qui soit au tiers de sa différence avec son sinus, comme 4 fois cette corde plus le sinus, à 2 fois le sinus & 3 fois la corde.*

Ceci donne une limite par excès, mais très-rapprochée; elle l'est tellement que lorsque l'arc n'est que d'un petit nombre de degrés, elle coïncide avec la vraie valeur de cet arc jusqu'à la 10<sup>e</sup> décimale, ou même un terme plus éloigné. Il restoit à en trouver

\* Prop. 19.

une aussi exacte & qui fût par défaut, *Huygens* le fait par le procédé suivant, ayant trouvé la limite par défaut de l'article 1, & celle par excès de l'article précédent. Qu'on prenne les  $\frac{4}{3}$  de leur différence & qu'on l'ajoute au double de la corde, augmentée du triple du sinus; qu'on fasse enfin cette proportion, comme cette somme est à celle du sinus & de la corde, ainsi leur différence à un quatrième terme, ce terme ajouté au sinus donnera une ligne moindre que l'arc, mais aussi voisine de sa vraie valeur que la précédente. L'usage de ces nouvelles limites est merveilleux; par leur secours *M. Huygens* laisse bien loin derrière lui & les Anciens & *Snellius* lui-même. Un exemple fera sentir combien ils approchent de la vérité; en calculant simplement le côté d'un polygone inscrit de 60 côtés, & y appliquant cette méthode, on trouve les 10 premiers chiffres de la proportion de *Ludolph*. On peut juger par là combien



d'avantage on approcheroit de la vérité, en employant un polygone d'un plus grand nombre de côtés.

Le même traité de M. *Huygens* contient plusieurs approximations pratiques de la circonférence circulaire, que leur simplicité rend dignes de remarque, & propres à avoir place ici. 1°. 8 fois le côté du dodécagone moins le rayon, différent de la circonférence de moins d'un 4000°. 2°. Dans un cercle (*fig. 9*), dont la demi-circonférence *BAC* est divisée en 2 également, que l'autre demi-circonférence le soit en 3, en *E, F*, & qu'on tire *AE* & *AF*, les lignes *AG + GH* égalent le  $\frac{1}{4}$  de cercle, à moins d'une 5000° près. 3°. Qu'on ajoute à 3 diamètres,  $\frac{1}{3}$  du côté du carré inscrit, la somme égalera la vraie longueur de la circonférence à une 18000° près du diamètre. 4°. Je mets ici l'approximation suivante, qui donne indéfiniment la grandeur d'un arc quelconque, quoiqu'elle ait été proposée

par M. *Huygens* dans une autre occasion, sçavoir dans le cours de sa question avec M. *Gregori*. Que  $ABC$  (fig. 10) soit un arc de cercle qui ne passe pas la demi-circonférence; après l'avoir partagée en 2 également & sa corde par la ligne  $DB$ , que  $AE$  soit égale aux  $\frac{2}{3}$  de  $AB$ , &  $EF = \frac{1}{10} ED$ ; la ligne  $FB$  étant tirée, qu'on fasse l'angle  $FBG$  droit, la ligne  $AG$  sera *quasi* *proxi*mè égale à l'arc  $AB$ ; car sa différence avec cet arc en fera à peine une  $1400^{\circ}$  lors même qu'il sera égal au quart du cercle, d'une  $13000^{\circ}$  quand il en fera la  $6^{\circ}$ , d'une  $90000^{\circ}$  enfin quand il n'en fera que la  $8^{\circ}$ . Il est aisé de sentir combien petite sera cette erreur dans les cas où l'arc à mesurer sera au-dessous de ces portions de la circonférence; elle deviendra infiniment petite. \*

\* Voici quelques autres moyens d'approcher de très-près de la grandeur d'un arc ou d'un aire circulaire. 1<sup>o</sup>. M. *Viete* a remarqué que à

VIII. Nous devons encore à M. *Huygens* un autre ouvrage qui paroît se rapporter à l'objet présent ; il est intitulé *Theoremata de Circuli & hyp. quad.* 1651. M. *Huygens* y démontre quelques théorèmes qui durent paroître singuliers dans le tems, mais qui n'auroient pas aujourd'hui le même mérite.

On divise une ligne en moyenne & extrême raison, la ligne entière est les  $\frac{1}{2}$  bien près de la circonférence du cercle décrit sur le petit segment comme diamètre. La différence par excès est à peine une 25, 000<sup>e</sup> du diamètre.

2<sup>o</sup>. Si l'on fait cette proportion ; comme une ligne divisée en moyenne & extrême raison, augmentée du petit segment, est au double de la ligne entière, ainsi celle dont le carré égale les  $\frac{2}{3}$  de celui du diam. a une quatrième proportionnelle, cette dernière fera le côté d'un carré très-prochainement égal au cercle ; car il en différera de moins d'une 75, 000<sup>e</sup> par défaut (*Vieta opera*, p. 391, 2, 3). Ces approximations m'ont paru avoir une élégance qui méritoit qu'elles fussent connues. Cependant de toutes celles que j'ai rencon-

## 64 QUADRATURE

C'est que l'on peut déterminer un espace rectiligne qui suspendu d'une certaine manière, contrebalance, c'est-à-dire se tient en équilibre avec un segment de cercle, d'ellipse ou d'hyperbole. Soit, par exemple, le segment de cercle ou d'ellipse  $AGB$  (fig. 11.) dont l'axe soit  $GIH$ , que le triangle

trées, la suivante, dûe à un Géometre Polonois, le P. *Kolhanski*, me paroît la plus remarquable par sa simplicité & son exactitude.

3°. Que  $AC$  (fig. 6.) soit le diamètre d'un demi-cercle,  $AF$  la tangente de  $30^\circ$ ; & que sur la ligne  $EC$ , perpendiculaire à l'autre extrémité du diamètre, on prenne  $CE = 3$  fois le rayon; qu'on tire enfin la ligne  $FE$ , elle ne différera par défaut que de très-peu de chose de la grandeur de la demi-circonférence; car le rayon étant  $1,000000$ , la ligne  $FE$  se trouve de  $3,1415833 +$ , & la demi-circonférence est  $3,1415926 +$ ; ainsi la différence est seulement  $\frac{93}{1,0000000}$  ou moins d'une  $1,000,000$  du rayon. (*Act. de Leipzig*, 1685).

*ECF* ait sa base  $EF = AB$ , & sa hauteur  $CD$  sur l'axe commun, soit  $= \sqrt{GI \times IH}$ , le triangle sera en équilibre sur le point  $C$ , avec le segment  $AGB$ . La même chose arrivera si ce segment est portion d'une hyperbole, comme  $aGb$  dont  $C$  est le centre; ce qui se démontre aisément en faisant voir par les propriétés des sections coniques que les momens des lignes  $LK$   $MN$  ou  $mn$  sont égaux; une analyse très-simple suffit pour cela. La formule du centre de gravité que donne le calcul intégral, fournit le même résultat. La facilité avec laquelle on en tire tous ces théorèmes, qui coulerent tant aux *Guldin*, aux *La Faille*\*, &c. rendent

\* Le P. *Guldin*, Jésuite, est fort connu pour être l'inventeur de la belle propriété du centre de gravité pour mesurer les figures; & le Pere *La Faille*, de la même Société, publia en 1632 un ouvrage très-ingénieux, quoiqu'un peu prolix, où il faisoit voir comment le centre de gravité du cercle & sa quadrature viennent l'un à l'autre.

ces vérités peu remarquables aujourd'hui.

Si l'on demandoit ce qui s'oppose donc à la découverte de la quadrature du cercle, puisque voilà un segment de cercle en équilibre avec une figure rectiligne, à peu près comme *Archimede* quarroit jadis la parabole, je répondrai qu'il manque de connoître la position du centre de gravité de ce segment; si elle étoit connue on auroit la quadrature du cercle non seulement par cette voie, mais par une infinité d'autres.

VIII. On ne doit point ranger parmi les hommes ordinaires qui ont échoué à la quadrature du cercle un Géometre du milieu du siècle passé, qui prétendit à la solution complète de ce fameux problème. Il est aisé d'appercevoir, pour peu qu'on connoisse l'histoire de la Géométrie, que j'entens parler du célèbre *P. Grégoire de S. Vincent*. On ne peut lui refuser la

justice de remarquer que personne avant lui ne s'est porté dans cette recherche avec autant de génie, & même, si nous en exceptons son objet principal, avec autant de succès. La quadrature du cercle qu'il manqua fut pour lui l'occasion d'un grand nombre de découvertes dont quelques-unes n'étoient pas en apparence d'une difficulté fort inférieure à la quadrature elle-même; telles sont les quadratures absolues d'un grand nombre de figures, soit planes, soit de surface courbe. La propriété remarquable des espaces hyperboliques entre les asymptotes, qui sont les logarithmes des abscisses, est une de ces découvertes incidentes qui doit effacer le souvenir de l'erreur qui termine son ouvrage. Bien éloigné donc d'adopter en tout le jugement que *Descartes* porta de ce Géometre, je pense avec d'autres, dont le sentiment peut sans doute contrebalancer celui du Philosophe François, que ses travaux ont droit à notre

estime & même presque à notre admiration. *Huygens* & *Leibnitz* lui ont rendu cette justice, le dernier \* surtout, lorsque dans l'énumération de ceux qui ont le mieux mérité de la Géométrie, il lui donne parmi eux un rang distingué.

*Grégoire de S. Vincent* nous fait lui-même l'histoire de ses tentatives, dans la préface de son ouvrage. La spirale d'*Archimède* lui parut d'abord présenter quelques voies pour arriver à la solution qu'il cherchoit avec tant d'ardeur; dans cette espérance il en étudia les propriétés, & ce furent ses profondes recherches qui lui firent découvrir sa symbolisation avec la parabole. Ce chemin ne l'ayant pas conduit où il desiroit, il se tourna vers la quadratrice, qu'il abandonna par le même motif, mais non sans avoir composé sur son sujet un immense traité, qui

\* Actes de Leipzig, 1686.



péric dans l'incendie qui suivit la prise de *Prague* en 163 . . \*. Enfin il s'attacha à comparer divers corps, les uns cylindriques ou segmens de ceux-ci, avec d'autres formés de différentes manieres, à étudier profondément leurs rapports & les rapports même de leurs rapports, ce qui l'engagea à se former plusieurs nouvelles théories qui lui fournirent une foule de découvertes, ou du moins de vérités qui, quoique fort aisées à en juger par notre analyse, ne laissoient pas de fatiguer les Géometres de son tems. C'est le résultat de ces dernieres recherches, combinées & dirigées dans la vûe de la quadrature du cercle, qu'il publia dans son ouvrage intitulé *Quad. Circuli & hyperbola*, 1647.

La prétention de *Grégoire de S. Vincent* étoit d'une nature à ne pas échapper au severe examen des Géometres. Son ouvrage n'eut pas plûtôt paru qu'on

\* Voyez la préface de son livre intitulé *Quad. Circuli & hyp.*

s'emprefsa de toutes parts à approfondir ses raisonnemens & sa méthode : le nom de l'Auteur annonçoit des efforts dignes d'attention. En vulgaire Géometre il ne se bornoit pas à la quadrature définie du cercle, & du cercle seul, il embrassoit également dans ses vûes l'hyperbole & les segmens quelconques de ces figures; il donnoit enfin quatre méthodes différentes pour parvenir au même but. La célébrité de la discussion à laquelle cet ouvrage donna lieu, m'engage à la rapporter avec quelque étendue; on va donc expliquer la première & la principale de ces méthodes : quoiqu'elle aboutisse à une erreur, elle est fondée sur une si fine théorie de Géométrie, qu'on croit faire quelque plaisir aux Géometres en la leur présentant.

1°. Qu'on imagine, dit *Grégoire de S. Vincent*, sur un même axe  $AB$  (*fig. 12, 13.*) un demi-cercle  $AB$  & deux paraboles égales situées en sens con-

traire,  $ABL C$ ,  $BAP D$ , & dont les ordonnées  $AC$ ,  $BD$  sont égales entre elles; & à  $AB$  ou à leur parametre commun. Il démontreroit d'abord, & c'est une vérité avouée par la saine Géométrie, que si l'on imagine la parabole  $ACB$  dressée ou relevée perpendiculairement au plan de la figure, & qu'on conçoive un solide dont les coupes perpendiculaires à ce plan soient toujours les rectangles  $GL \times GP$ ; ce solide sera égal au cylindre sur la base circulaire  $ATB$ ; dont la hauteur est  $AB$ : & de plus chaque segment de ce solide parabolique, comme celui sur la base  $AGP$ , est égal au segment correspondant du cylindre, ou  $AGS \times AB$ . De-là il suit que si l'on a la mesure absolue de ces segments du premier solide, ou du solide entier, on aura la quadrature du cercle; car la grandeur du segment de cylindre donnera celle de sa base circulaire. On parviendra aussi à cette quadrature en connoissant simple-

ment le rapport de ces segmens; car dès-lors on auroit celui des segmens circulaires  $AGS$ ,  $ART$ : or il est reconnu qu'il ne faut rien de plus pour la quadrature du cercle, même indéfinie.

2°. *Grégoire de S. Vincent* chercha donc à mesurer ces solides, ou à assigner du moins leurs raisons; or il crut y parvenir de la maniere suivante. Imaginons, outre les deux paraboles  $ABC$ ,  $ABD$ , deux autres  $AIiD$ ,  $CHhB$ , qui touchent leur axe commun en  $A$ ,  $B$ ; qu'on tire ensuite les diagonales  $AD$ ,  $CB$ , il se formera du segment parabolique  $AGI$  par son correspondant  $AGHC$ , un solide fort irrégulier, mais dont la solidité absolue est assignable: on connoîtra donc la raison de ce solide  $AGI \times AGHC$  à celui de  $GiIR \times HRGh$ . Ces deux solides, que pour abrégér je nommerai respectivement  $A$ ,  $B$ , sont dans le cas particulier ou  $AG =$  au demi-rayon; ces solides, dis-je, sont comme 53 à 203.

Il se formera de même du triangle  $AOG \times AGKC$  un solide tout rectiligne dont on aura la grandeur absolue, de même que celle du solide de  $GOOR \times GKTR$ , & par conséquent leur rapport, qui dans le même cas de  $AG =$  au demi-rayon est  $5 : 11$ . Que ces deux solides soient nommés  $C, D$ , c'est de la connoissance de ces solides & de leurs raisons que *Grégoire de S. Vincent* déduisoit celle des deux premiers, dont on a vû que dépendoit la quadrature du cercle ; il le faisoit par le raisonnement qui suit :

Si l'on tire une perpendiculaire quelconque à  $AB$ , comme  $MN$ , on a, par les propriétés des coniques, les lignes  $GM, GL, GK$  continuellement proportionnelles, de même que  $GM, GK, GH$ , de manière qu'interposant une moyenne  $G\Delta$  entre  $GK$  &  $GH$ , on a les cinq lignes  $GM, GL, GK, G\Delta, GH$  en proportion continuë. Par la même raison les lignes  $GN, GP,$

$GO, G\delta, GI$  sont continuellement proportionnelles, & par conséquent les rectangles  $GM \times GN, GL \times GP, GK \times GO, G\Delta \times G\delta, GH \times GI$  le sont aussi; & la même chose arrive par tout ailleurs où l'on tirera une parallèle à  $MN$ , on y a les rectangles  $gm \times gn, gl \times gp, gk \times go, g\Delta' \times g\delta', gh \times gi$ , en raison continue. Par conséquent le rapport des rectangles  $GK \times GO$  à  $gk \times go$ , les troisièmes en ordre, sera doublé de celui des précédens  $GL \times GP, gl \times gp$ , & la raison des derniers  $GH \times GI, gh \times gi$ , sera quadruplée de celle de ceux que je viens de nommer. On le verra sans peine en considérant ces deux suites de quantités continuellement proportionnelles, 1, 2, 4, 8, 16, &c. & 1, 3, 9, 27, 81, où l'on voit que la raison de 9 à 4 est doublée de celle de 2 à 3, & celle de 16 à 81 quadruplée de cette même raison. Par conséquent la raison des rectangles de l'ordre de  $GH \times GI$ ,

$gh \times gi$ , sera doublée de celle de l'ordre des  $GK \times GO$ ,  $gk \times go$ . Il y aura donc entre les élémens semblables des solides  $AGI \times AGHC$ ,  $GIIR \times GRHH$ , c'est-à-dire  $A, B$ , une raison semblablement multipliée de la raison qui regne entre les élémens analogues des solides  $AGO \times AGKC$ ,  $GROO \times GRYK$ , c'est-à-dire  $C, D$ , comme celle-ci l'est de la raison des élémens des solides  $AGP \times AGKC$ ,  $GRPP \times GRLL$ , ou  $E \& F$ . *Grégoire de S. Vincent* concluoit enfin de tout ce raisonnement que la raison des premiers solides  $A, B$  contenoit celle des solides  $C, D$ , comme celle-ci contenoit la troisième, sçavoir celle des solides  $E, F$ ; or les deux premières raisons sont toujours données; la dernière le sera donc aussi; & on a fait voir que cette raison étant une fois connue, on étoit en possession de la quadrature du cercle: par conséquent cette quadrature, disoit-il, est trouvée.

Tel étoit le raisonnement de ce fameux Géometre , raisonnement qui se soutient conformément à la saine Géométrie , jusqu'à la dernière conclusion où se trouve l'erreur. J'en vais développer les preuves , en même tems que je rendrai compte des contradictions & des querelles qui s'éleverent à ce sujet.

*Descartes* fut un des premiers qui porta quelque jugement sur la prétendue quadrature & le livre du Géometre Flamand ; il leur fut très-peu favorable , la quadrature fut déclarée fausse , & le livre traité de médiocre & même d'embrouillé. On trouve les raisons de ce jugement dans une lettre écrite à *Schotten* \* , on n'en admettra cependant que la première partie ; car quant à la médiocrité , nous avons fait voir qu'*Huygens* & *Leibnitz* en pensoient bien autrement ; & quant à l'obscurité ,

\* Lettres de *Descartes* , in-4<sup>o</sup> , t. 3. Lettre



nous pouvons dire que *Descartes* n'y en trouva qu'à cause du dégoût violent qu'il avoit pris pour la méthode des Géometres anciens ; *Grégoire de S. Vincent* est un des plus intelligibles de ceux qui ont suivi cette route difficile. Je reviens à la Lettre de *Descartes* ; il y dit avoir suivi pied à pied *Grégoire de S. Vincent*, depuis la proportion où il conclut sa quadrature jusqu'à une autre qu'il appelle en preuve & qui est fausse ; elle l'est en effet visiblement suivant le sens que lui donne *Descartes*, mais il y a lieu à contestation si on l'entend dans celui que les défenseurs du *P. de S. Vincent* lui ont donné, suivant la doctrine & l'instruction de leur maître : ainsi la décision du Philosophe François ne tranche point la difficulté.

*Descartes* se contenta de communiquer ce qu'il pensoit sur *Grégoire de S. Vincent* à quelques-uns de ceux qui le consulterent ; mais plusieurs autres

Géometres écrivirent pour le réfuter : à la vérité tous ne le firent pas aussi heureusement. *Roberval* & quelques autres, pour renverser l'édifice élevé par le Géometre Flamand, l'attaquerent dans les endroits où il étoit le plus solide. Ils établirent un faux système de proportions, ce qui donna lieu à un défenseur de la quadrature proposée de les réfuter eux-mêmes avec succès & avec solidité. *M. Huygens* & le Pere *Lientaud*, Jésuite & Géometre habile, attaquèrent les prétentions de *Grégoire de S. Vincent* avec plus de solidité ; l'un dans un petit écrit intitulé *Exetasis, seu examen cyclometris Gregorii à Sancto Vincentio*, 1652, modele de netteté & de précision ; l'autre dans un ouvrage plus étendu & intitulé, *Examen novæ quadrature*, &c. 1664.

*Grégoire de S. Vincent* trouva de son côté de zélés défenseurs dans quelques-uns de ses disciples, deux sur-tout se distinguèrent dans cette lice, *Xavier*

*Ainscom & Alphonse de Sarassa.* Celui-ci y parut le premier, pour réfuter les prétentions de *Robertal* & de ses adhérens, & sur-tout le jugement que le P. *Mersenne* avoit imprimé dans ses *Reflexiones physico math.* Ce P. y avoit parlé de la maniere la plus méprisante du livre de *Grégoire de S. Vincent*; & quant à la quadrature en question, il la rejettoit, fondé sur cette seule raison que son auteur paroissoit la réduire à ce problème: étant données trois grandeurs & les logarithmes de deux, trouver celui de la troisième, problème qu'il regardoit comme aussi insoluble que celui de la quadrature du cercle. Le P. *Mersenne* avoit tort; mais supposant même qu'il eut eu raison, ç'auroit encore été une grande & belle découverte que de réduire ces deux problèmes très-isolés à n'être plus qu'une même & unique question. On regarderoit comme une des vérités les plus remarquables & les plus utiles de la Géométrie.

une liaison bien établie entre la quadrature du cercle & de l'hyperbole, liaison telle que l'une étant connue, l'autre le fût nécessairement. C'étoit cependant ce que le P. *Merfenne* reprochoit à *Grégoire de S. Vincent*, &, comme je l'ai déjà dit, il se trompoit même en cela; ainsi *Sarassa* n'eut pas de la peine à lui répondre avec avantage, & à détruire victorieusement ses objections,

Quant à M. *Huygens* & le P. *Lieuvaud*, ils portèrent des coups plus réels à la quadrature prétendue; ils la réduisirent à examiner de quel sens étoit susceptible cette conséquence de *Grégoire de S. Vincent*, que la raison des deux premiers solides contenoit celle des deux seconds, comme celle-ci contenoit la troisième; & ils faisoient voir que de quelque côté qu'on l'entendît il n'en résulroit rien qui approchât de la quadrature du cercle. En effet on ne peut donner à ces paroles que ces deux

sens; une raison est à une autre comme une troisième à une quatrième, quand étant réduites à un même conséquent, leurs antécédens sont proportionnels; ou bien lorsque la première raison est autant multipliée de la seconde que la troisième l'est de la quatrième: il ne résulte rien d'avantageux de ces deux sens pour la quadrature contestée. Il n'y en avoit plus qu'un troisième à discuter, & c'étoit le dernier retranchement où les défenseurs de la quadrature pussent se retirer; il leur restoit, dis-je, à maintenir que la première raison, sçavoir celle des solides  $A, B$ , étoit composée d'une suite de raisons partiales, semblablement multipliées de chacune des raisons partiales qui composent la raison totale de  $C, D$ ; que celle-ci étoient multipliées de celles qui composent la raison cherchée de  $E, F$ . Mais quel avantage peut-on tirer de là pour la détermination de cette raison, disoit le P. *Lientaud*? elle est encore

81            **QUADRATURE**

aussi inconnue qu'auparavant. Pourquoi, enfin, remarquoit-il avec M. *Huygens*, si cette dernière raison étoit donnée par les précédentes, pourquoi le P. *Grégoire de S. Vincent* avoit-il négligé de l'assigner? n'est-ce pas que réellement cette conséquence, la première raison contient la seconde comme celle-ci la troisième, n'est qu'une phrase vuide de sens, qui laisse encore la question indécise & à résoudre?

Ce fut pour répondre à ces adversaires qu'*Ainscom*, autre disciple du P. de *S. Vincent*, parut sur la lice. Il publia un livre intitulé, *Deductio quadraturarum à P. G. à S. Vincent. expositarum*, contre *Huygens* & *Lieutaud* principalement, & par occasion contre les autres contradicteurs de son maître. Le nœud de la principale difficulté à résoudre étoit dans quel sens on devoit entendre ce rapport de raisons, le fondement de la quadrature. *Ainscom* prétendit dans cette réponse que cette

troisième maniere qu'*Huygens* n'avoit pas même soupçonné, à cause de son éloignement du sens ordinaire; que *Lieutaud* avoit rejetté comme ne pouvant conduire à rien, & aussi difficile à déterminer que la quadrature elle-même, étoit cependant la véritable, la seule que *Grégoire de S. Vincent* eut entendue; que cette dernière raison enfin pouvoit se déterminer par des rapports d'espaces hyperboliques. Car, disoit-il, si l'on prend deux espaces hyperboliques entre les asymptotes, & que ces espaces soient tels que chaque partie de l'un soit semblablement multiple de chaque partie de l'autre que les premières raisons partiales sont multipliées des secondes, le premier de ces espaces sera autant multiple du second que la première raison totale contient la seconde. Le nombre qui exprimera le rapport de ces espaces hyperboliques sera donc l'exposant du rapport multiplié de la première à la

seconde, c'est-à-dire que si  $n$  est ce nombre & la première raison, sçavoir celle des solides  $A, B$  soit  $R$ , la seconde ou celle des solides  $C, D$  soit  $P$ ; la raison  $R$  sera multipliée suivant l'exposant  $n$  de la raison  $P$ , & par conséquent celle-ci le sera semblablement de la troisième cherchée; elle est par conséquent donnée & connue suivant lui. Au reste ce nouveau défenseur de *Grégoire de S. Vincent* tomboit encore, malgré les instances de *Huygens* & de *Lientaud*, dans le même défaut que son maître. Le moyen le plus aisé de confondre ses adversaires, qui prétendoient cette dernière raison inassignable, étoit sans doute de l'assigner; il ne le faisoit cependant point encore, ce qui prouve évidemment, comme le remarquoit *M. Huygens*, que lui & son maître ne cherchoient qu'à prolonger la querelle, sans se mettre en peine d'éclaircir la vérité, ou plutôt en craignant le succès: ils espéroient du moins



par là de laisser la question indécise aux yeux de la postérité & de leurs contemporains. Mais le P. *Lientaud* paroît l'avoir terminée dès-lors entièrement ; il n'attendoit que cette explication du sens des paroles de *Grégoire de S. Vincent* pour lui donner le dernier coup. En l'admettant de même que la manière dont ils prétendoient l'assigner, par le moyen de ces espaces hyperboliques dont j'ai parlé, il fit voir qu'il en resulroit précisément le second sens qu'eux-mêmes avoient rejeté. Son raisonnement est légitime en effet, le moyen indiqué par *Ainscom* donneroit deux espaces hyperboliques nécessairement doubles l'un de l'autre, & par conséquent la première raison sera doublée de la seconde, & celle-ci le sera par conséquent de la troisième. Or tout cela est faux, car on ne peut pas dire que la raison de 53 à 203 soit en aucune manière doublée de celle de 5 à 11. Il est bien clair par là que

*Grégoire de S. Vincent* se trompoit, & l'on n'en peut douter, quoiqu'en ait dit son panégyriste le P. C. dans sa préface au traité du calcul intégral de M. *Stone*.

Quant aux autres quadratures que proposoit *Grégoire de S. Vincent*, elles aboutissent toutes à un semblable raisonnement qui compare plusieurs raisons entr'elles; ainsi le défaut objecté à la première se trouve dans celles-ci. Un Géometre Allemand, nommé *Kinner*, dont j'ai l'ouvrage, entreprit cependant la défense de la seconde; mais cette défense, comme celles de *Sarassa* & *Ainscom*, solide dans les points non contestés, ne résoud pas plus qu'elles le nœud de la difficulté.

VII. La querelle entre *Grégoire de S. Vincent* ou ses disciples, & les contradicteurs de sa quadrature, étoit à peine finie, qu'un ouvrage publié par un Géometre Anglois occasionna une nouvelle discussion; la cause en étoit

d'une nature bien différente de celle qu'on vient de voir. M. *Jacques Gregori*, c'est ce Géometre, prétendit démontrer, dans un traité intitulé *Vera circuli & hyperbola quadratura*, que ces quadratures étoient impossibles. Le titre de ce livre, quoique contradictoire, ce semble, avec son objet, ne l'est cependant pas en Géométrie ; c'est résoudre un problème que d'en démontrer l'impossibilité : ainsi M. *Gregori* ayant, à son avis, démontré celle de la quadrature du cercle, pouvoit donner légitimement à son ouvrage le titre qu'il porte. Les quadratures approchées qu'il y donne sont les seules vraies, puisqu'elles sont les seules qui soient possibles.

M. *Gregori* établissoit cette impossibilité sur quelques propriétés des polygones inscrits & circonscrits, & sur la nature de certaines suites qu'il nomme convergentes. Elles diffèrent des suites ordinaires en ce que dans celles-ci ce

feroit la somme de tous les termes qui donneroit la vraie valeur cherchée, & qu'on en approche d'autant plus qu'on en prend un plus grand nombre : dans les suites de *Gregori* chaque terme exprime la valeur cherchée d'autant plus exactement qu'il est plus éloigné du premier.

Si  $CADB$  (*fig. 14, 15, 16*) représente un secteur circulaire, elliptique ou hyperbolique, après avoir tiré la corde  $AB$ , le diamètre  $GF$ , les tangentes  $AF, BF$ , puis encore les cordes  $AD, BD$  & la tangente  $GDE$ , on aura quatre secteurs de polygone, dont il y en aura deux inscrits & deux circonscrits. Or le rapport de ces figures est tel que le polygone  $CADB$  est moyen géométrique entre l'inscrit  $CAB$  & le circonscrit correspondant  $CAFB$  ; mais le polygone  $CAGDEB$  est moyen harmonique entre ce dernier  $CAFB$  &  $CADB$ . Et si l'on continue à l'infini une inscrip-

tion & une circonscription semblable, il se formera une suite infinie de polygones inscrits & circonscrits qui observeront toujours la loi précédente; ce qui fournit une méthode très-simple pour déterminer tous ces polygones, les deux premiers seuls étant donnés; car qu'ils soient  $A$  &  $B$ , le second inscrit  $C$  sera moyen entre  $A$  &  $B$ , & le second circonscrit  $D$  moyen harmonique entre  $C$ ,  $B$ ; de même le troisième inscrit  $E$  sera moyen entre  $C$ ,  $D$ , & le troisième circonscrit moyen harmonique entre  $E$  &  $D$ , & ainsi à l'infini. Cette suite enfin se terminera à deux termes égaux entr'eux & au secteur que je nomme  $S$ , & l'on auroit conséquemment la quadrature du cercle & de l'hyperbole si l'on pouvoit exprimer ce dernier terme.

Il n'est pas douteux que la loi d'une progression semblable ne puisse être telle qu'il soit possible dans certains cas de trouver cette terminaison; *M. Gregori* en donne

quelques exemples où il réussit heureusement ; mais dans celui dont il s'agit ici, non seulement il désespère d'y réussir, mais il entreprend même de prouver qu'il est impossible de le faire : son raisonnement approche beaucoup de la démonstration, & se réduit au suivant.

Il est de la nature d'une suite semblable à celle qu'on vient de décrire ; que chaque terme,  $C$ , par ex. (fig. 17) soit semblablement composé de  $A$ ,  $B$ , que  $E$  l'est de  $C$  &  $D$ , &c. & de même  $D$  est semblablement composé de  $A$ ,  $B$ , que  $F$  de  $C$ ,  $D$ , &c. C'est encore une conséquence de la génération de cette suite que chaque terme, le dixième, par exemple, après  $A$ ,  $B$ , soit semblablement composé de  $A$ ,  $B$  que le dixième après  $E$ ,  $F$  l'est de ces derniers. Par conséquent le terme infiniment éloigné, & qui l'est par là également de tous ceux de la suite, sera semblablement composé de chacun des paires

*A, B* ou *C, D* ou *E, F, &c.* & si malgré ce raisonnement on pouvoit encore douter de la certitude de cette conclusion, on la confirmeroit en remarquant que lorsque par sa nature le dernier terme est assignable, on le trouve par cette voie (*voy. prop. 7 & suiv.*), ce qui ne seroit point si cette propriété du dernier terme étoit fautive : on peut encore s'en assurer par d'autres raisonnemens.

Si l'on examine à présent la nature des premiers termes de cette suite, on s'apercevra que le dernier terme cherché est inassignable analytiquement & en termes finis. Car réduisant les termes *A, B* à ceux de cette forme ;  $a^3 + a^2 b$  &  $ab^2 + b^3$  ; afin d'éviter que les seconds deviennent irrationnels, on a pour ceux-ci  $aab + b^2 a$  &  $2bb.a$ . Cela étant, le dernier terme *S* de cette suite convergente, qui exprime le secteur circulaire ou hyperbolique, devroit être une quantité semblablement

composée des termes  $a^3 + a^2b$  &  $ab^2 + b^3$ , que de ceux-ci  $aab + bba$  &  $2bba$ ; c'est-à-dire que les mêmes opérations analytiques qui formeroient ce terme  $S$  des deux premiers, étant appliqués aux deux seconds, devroient produire la même quantité; or c'est ce qui ne se peut en aucune manière, car le terme  $a^3$ , puissance plus élevée qu'aucune autre de la même lettre dans les autres termes, donnera nécessairement dans les produits semblables une puissance plus élevée, & il en résultera aussi une expression plus composée de premiers termes, qui le font davantage que les seconds. Le dernier terme  $S$  ne peut donc s'exprimer analytiquement en termes finis, puisqu'il faudroit pour cela que cette expression analytique fût un même produit résultant de deux paires de grandeurs, qui, soumis aux mêmes opérations, doivent donner des produits différens & inégaux. On peut voir ce raisonnement plus développé



dans la prop. 11 du traité de M. *Gregori*. J'ajouterai à ces raisons que ce n'est que dans l'infini que peut disparaître cette inégalité ; ainsi l'expression du dernier terme *S* doit être d'une composition , d'un degré infini ; or c'est ce qui n'est susceptible d'aucune résolution analytique en termes finis.

Les démonstrations négatives semblent avoir ce défaut , de ne point porter la même lumière que les positives , & c'est peut-être par cette raison que celles qui ont eu pour objet de démontrer l'impossibilité de la quadrature du cercle n'ont jamais eu un grand succès. Celle-ci ne parut point concluante à M. *Huygens* ; prié d'en dire son avis , de même que du reste de l'ouvrage , il l'exposa par un écrit qui parut dans le Journal des Sçavans du deux Juillet 1668 : il y prétendit renverser entièrement les démonstrations de *Gregori*. Celui-ci répondit peu après dans les *Transactions* , n. 37 ; il y convint de quelques

94 QUADRATURE  
inadvertances qui avoient proci  
son adverfaire un léger avantage  
établiſſoit d'ailleurs aſſez ſolide  
d'autres points conteſtés par *Hu*  
pour que celui-ci ſ'y rendît ; ma  
perſiſta dans un nouvel écrit i  
dans le même Journal de la r.ſſ  
année, il perſiſta, dis-je, à préte  
que la démonſtration principale ne  
cluait pas tout ce que *Gregori* en  
féroit ; il paroifſoit ſe rendre,  
vérité, ſur l'impoſſibilité de la  
drature indéfinie, mais il nioit  
jours que l'on pût en conclurre  
même choſe à l'égard de celle du ce  
entier, ou de quelqu'un de ſes ſegn  
ou ſecteurs déterminés. *M. Gregori*  
pondit de nouveau à ces objec  
& fit un dernier effort pour y éta  
ſon ſentiment ; on trouve entr'aut  
dans la réplique, un raifonnement  
paroît conclurre qu'aſin que la raiſ  
d'un ſecteur à un des polygones infc  
fût exprimée analytiquement, il

it que cette expression fût d'un degré  
 niment élevé. Cette conséquence est  
 forme à ce qui est toujours arrivé  
 quelque méthode qu'on ait entre-  
 ce fameux problême ; l'analyse a  
 ours donné des expressions en ter-  
 ; infinis, qui ne sont que des équas-  
 is d'une dimension infinie. Il résulte  
 là une grande présomption en fa-  
 : du raisonnement de M. *Gregori*.

Géometres admettent aujourd'hui  
 ie commune voix que la quadra-  
 : indéfinie du cercle est impossible ;  
 is quant à la quadrature définie,  
 suspend encore son jugement.  
 impossibilité de la première espece  
 quadrature n'entraîne pas néces-  
 sement celle de la seconde, puis-

M. *Bernoulli* a démontré qu'il y  
 it des courbes qui quoique non  
 rables indéfiniment, ne laissent  
 d'admettre un ou plusieurs espaces  
 erminés absolument quarrables : on  
 point encore démontré que cela ne

puisse pas arriver dans le cercle.

Il y eut aussi quelques contestations entre ces deux Géomètres, sur le mérite des approximations qu'ils avoient données dans leurs ouvrages. *M. Huygens* non seulement mit celles de *Gregori* au-dessous des siennes, mais remarquoit que quelques-unes d'entre elles étoient les mêmes que celles qu'il avoit déjà publiées dans d'autres termes. La remarque étoit vraie ; cependant le travail de *Gregori* ne laisse pas d'avoir quelque avantage, & de l'emporter à certains égards sur celui de *M. Huygens*. En effet les approximations que celui-ci avoit bornées au cercle, & cela parce que sa méthode ne pouvoit le conduire plus loin, ces approximations, dis-je, conviennent également à l'hyperbole. La méthode du Géometre Anglois ne sépare point ces deux courbes, qui tiennent l'une à l'autre par tant de propriétés analogues. Cette raison me détermine à les remettre

remettre ici sous ce point de vûe plus général. Que  $A, C$  représentent deux polygones ou secteurs de polygones inscrits de suite, comme on l'a déjà expliqué, soit au cercle, soit à l'ellipse ou l'hyperbole, comme les polygones  $CAB, CADB$  (fig. 14, 15, 16); & que  $B, D$  soient les polygones circonscrits correspondans à  $A, C$ , tels que  $CAEB, CAGFB$ . Le secteur est plus grand que le polygone  $C$   $\pm$  le tiers de la différence entre  $A$  &  $C$ . Le signe plus est pour le cercle, & celui de moins pour l'hyperbole; mais le même secteur est moindre que la seconde des deux moyennes, soit arithmétiques, soit géométriques entre les polygones  $C, D$ . J'entens par la seconde la plus voisine du circonscrit, qui est la plus grande dans le cercle & l'ellipse, & la moindre dans l'hyperbole. Les deux limites sont par conséquent

$$\frac{4C - A}{3} \quad \& \quad \frac{C + 2D}{3}. \quad M. Huygens$$

revendiquoit ces deux déterminations ; mais on peut dire qu'indépendamment de la généralité que leur donnoit M. *Gregori*, la méthode qui l'y conduisoit les lui rendoit propres. M. *Gregori* ajoute qu'on en approchera de plus près en prenant entre les limites précédentes la plus grande des quatre moyennes arithmétiques, sçavoir  $\frac{3D + 8C - A}{15}$ , d'où il résulte le triple des chiffres exacts dans l'approximation qu'on en tire ; je veux dire que si les limites précédentes donnent une valeur de la courbe qui ne diffère de la véritable que d'une 100000<sup>e</sup>, la dernière en donnera une qui ne différera que d'une 1,00000,00000,00000<sup>e</sup> ; appliquons ces vérités, avec M. *Gregori*, plus particulièrement aux arcs de cercle.

Si *A* est la corde d'un arc & *B* les deux cordes prises ensemble des moitiés de cet arc, qu'on fasse 1°.  $A + B : B$

:: 2 B : C, on aura  $\frac{8C + 8B - A}{15}$

plus grande que l'arc ; la difference n'étant qu'environ  $\frac{1}{3000000}$  lorsque l'arc égale le quart du cercle, & beaucoup moindre quand il sera une moindre portion de la circonférence. 2°. Que

A : B :: B : D, alors  $\frac{12C + 4B - D}{15}$

sera moindre que l'arc & en différera à peine d'une 60000<sup>e</sup>, lors même qu'il égalera le quart du cercle. Qu'on prenne enfin entre ces limites la seconde des six moyennes arithmétiques (en commençant par la plus grande), elle sera moindre que l'arc, & l'erreur n'égalera pas  $\frac{1}{3000000}$  dans le cas où il seroit un quart de cercle. Ces dernières approximations de *Gregori* l'emportent incontestablement sur celles de son adversaire, elles ont même cet avantage, d'être sans comparaison plus aisées à calculer. On peut voir toutes les pièces de cette contestation litté-

raire dans le second tome des *Œuvres d'Huygens*, on y trouve même le traité de *Gregori* qui y a été inséré, sans doute pour épargner au Lecteur la peine de recourir ailleurs à un ouvrage devenu rare & difficile à se procurer.

X. Je dois remarquer ici que *M. Gregori* n'est pas le seul qui ait réputé la quadrature du cercle impossible; divers autres avant & après lui l'ont regardée comme telle, & il faut convenir que quoique leur sentiment ne soit pas appuyé sur une démonstration complète, il a néanmoins une probabilité qui approche beaucoup de la certitude; en effet, quel motif d'en juger ainsi ne fournissent pas tant d'efforts superflus qui ont eu ce fameux problème pour objet? Quand je parle d'efforts superflus, je suis bien éloigné de penser aux ridicules tentatives de ces hommes à qui l'on ne sçauroit accorder le titre de Géomettre sans l'avilir & le prostituer, mais un grand nombre de génies supérieurs,



les *Archimede*, les *Appollonius*, les *Huygens*, les *Gregori*, les *Wallis*, &c. sans parler de tant d'autres plus modernes, qui, après des peines inutiles, se sont vû réduits à perfectionner seulement la méthode d'approximation : tous ces génies, dis-je, semblent fournir une preuve de cette impossibilité qui approche beaucoup de la démonstration. Au reste ceci ne regarde que la quadrature définie du cercle ; c'est une vérité aujourd'hui reconnue, que l'indéfinie est impossible, comme l'illustre *M. Newton* l'a démontré dans ses principes ; il y fait voir que non-seulement le cercle, mais qu'aucune courbe rentrant en elle-même, comme le cercle, l'ellipse, &c. n'étoit susceptible de quadrature indéfinie générale, non plus que de rectification, car l'équation qui exprimeroit indéfiniment cette aire, devoit être d'un degré infini. La manière dont *Newton* établit cette vérité est particulière, j'en donnerai une autre plus bas.

Après *Newton* je trouve dans les *Mém.* de l'Acad. avant 1699, un écrit de *M. Rolle*, cité comme ayant démontré la même chose. *M. Saurin* l'a fait encore dans les *Mém.* de 1271, en voici une démonstration très-simple.

Que l'aire indéfinie du cercle ou le segment correspondant à une abcisse quelconque  $x$  ou  $CP$  (*fig.* 18) soit carré, & qu'il soit exprimé par  $X$ , qui est une fonction quelconque de  $x$ , c'est-à-dire une expression formée de  $x$  & de ses puissances combinées, comme l'on voudra, avec des coefficients constants; puisque cette fonction est d'un degré déterminé, que l'exposant de la plus haute puissance de  $x$  soit le nombre fini  $n$ , il est évident qu'on aura en équation finie le rapport des secteurs  $ACB$ ,  $BCE$ , sçavoir en ôtant du segment  $AP$ , le triangle  $CBP$  & l'ajoutant à  $BPE$ . Le rapport des arcs  $AB$ ,  $BE$  quelconques donné, on aura conséquemment par équation finie celui de

$CP$ ,  $CE$ , ou  $CP$ ,  $PE$ ; c'est-à-dire qu'on pourra indéfiniment diviser la circonférence du cercle en deux parties en raison quelconque, sans avoir à résoudre qu'une équation d'un degré déterminé  $n$ ; mais la théorie des sections angulaires nous apprend que cela est impossible. Car la raison proposée entre les arcs  $AB$ ,  $AE$  étant exprimée par deux nombres premiers entr'eux & plus grands que  $n$ , l'équation qui en résultera sera nécessairement d'un degré plus élevé que  $n$ ; & si ce rapport est irrationnel, il faudra nécessairement une équation d'un degré infini. Quelque soit le nombre  $n$ , il ne peut donc être fini & déterminé, puisqu'il doit répondre à tous les cas imaginables des sections angulaires, & qu'il y en a une infinité qui conduisent à des équations infinies.



---



---

## CHAPITRE IV.

*Des découvertes faites sur la mesure du Cercle à l'aide des nouveaux calculs, où l'on fait par occasion l'histoire de la naissance du calcul intégral.*

I. **L**ES découvertes qu'on vient de voir sur la mesure du cercle suffiroient déjà pour donner une grande idée de la sagacité des Géomètres qui les ont produites; mais sans les déprimer en aucune manière, nous osons dire qu'elles ne sont encore qu'une petite partie de ce que la Géométrie a fait à cet égard. C'est proprement aux calculs modernes que nous sommes redevables des grandes lumières sur ce sujet; ce sont les *Wallis*, les *Newton*, & quelques illustres analystes, dignes successeurs de ces excellens génies, qui lui ont donné la dernière perfection dont il paroît

susceptible. L'ordre des progrès de ces découvertes nous engage à développer la naissance du calcul intégral; nous en avons saisi l'occasion avec d'autant plus d'empressement que c'est le principal endroit par où nous avons espéré de rendre cet ouvrage intéressant aux Géomètres.

II. Les Géomètres sçavent que l'objet de la Géométrie de l'infini est de trouver le rapport de la somme des élémens infinis en nombre qui croissent ou décroissent suivant un certaine loi & dont une figure est composée, avec la somme des élémens égaux entre eux, & au plus grand, qui composent la figure uniforme de même base & de même hauteur. On n'eut pas beaucoup de peine à déterminer ce rapport, quand ces élémens suivirent une loi simple, telle que celle des termes d'une progression arithmétique, ou de leurs puissances. *Fermat*, *Descartes* & *Roberval* s'apperçurent même avant *Cavalleri*, de la formule générale qui exprime ce

rapport : *Cavalleri* s'y éleva aussi bientôt après de lui-même dans ses *Exercitations*. Les ordonnées étant comme les puissances  $m$  de l'abscisse, soit entières, soit rompues;  $\frac{1}{m+1}$  exprime en général le rapport de la figure à celle de même base & même hauteur.

Mais tout cela n'étoit que quelques rayons échappés d'une plus grande lumière, que *Wallis* dévoila dans son *Aritbm. infinitorum*, 1657. Cet illustre Géometre, en suivant le fil de l'analogie, qui fut toujours sa méthode favorite, ajouta beaucoup à ces découvertes; ce fut, par exemple, l'analogie qui le conduisit à étendre la formule donnée ci-dessus, aux cas même où l'ordonnée est en raison réciproque de l'abscisse. On lui doit l'ingénieuse idée de regarder les fractions comme des puissances dont les exposans sont négatifs : ainsi

$\frac{1}{x^m}$  n'est autre chose que  $x^{-m}$ . Il fit

enfin à l'égard de cette sorte de Géométrie, qui s'occupe de la mesure des grandeurs, ce que *Descartes* avoit fait sur celle qui recherche les propriétés des lignes courbes; il y appliqua un calcul commode, & par là soumit à la Géométrie quantité d'objets qui lui avoient jusqu'alors échappé.

On tire aisément de la théorie de *Wallis* la mesure de toutes les paraboles, de leurs solides de circonvolution, &c. de toutes les figures enfin dont les élémens exprimés analytiquement ne renferment point de quantité complexe, & de variables sous le signe radical, ou qui peuvent s'en dégager par quelque substitution. Ainsi les figures dont les élémens sont exprimés indéfiniment par  $\sqrt{aa + xx^0}$ ,  $\sqrt{aa + xx^1}$ ,  $\sqrt{aa + xx^2}$ , &c. se quarreront aisément, car ces expressions sont respectivement 1.  $aa + xx$ ,  $a^4 + 2aaxx + x^4$ , qui donnent, suivant les principes de ce

E.vj.

calcul,  $x$ ,  $aa x \pm \frac{x^3}{3}$ ,  $a^4 x \pm \frac{2aa x^3}{3}$

$\pm \frac{x^5}{5}$ , pour les aires correspondantes

aux abscisses  $x$ . Ces conséquences sont tout-à-fait conformes au résultat du calcul intégral appliqué aux mêmes exemp.

Il n'y a de la difficulté que dans les termes où les puissances de  $aa \pm xx$  sont des nombres rompus, ou lorsqu'elles sont négatives. Ce premier cas est celui de l'expression de l'ordonnée du cercle, qui est  $\sqrt{aa - xx}$ , ou  $aa - xx \frac{1}{2}$ ;  $x$  étant l'abscisse prise à compter du centre & le rayon étant  $a$ , on ne connoissoit pas encore à cette époque, la manière de développer cette expression en termes rationnels, & c'étoit une condition nécessaire pour y appliquer l'arithmétique de l'infini.

III. *Wallis*, après avoir quarré un grand nombre de figures, se trouva donc arrêté comme on l'avoit été jusqu'alors à la mesure du cercle; il tenta



de surmonter cet obstacle, & au défaut d'une méthode directe, il imagina les *interpolations*, auxquelles il a même donné son nom, car on les appelle souvent *Wallisiennes*. Cette méthode d'interpolation consiste à observer dans une suite de termes quelconques la loi générale qui regne entr'eux, & à insérer entre deux termes un ou plusieurs autres qui s'y conforment. C'est ainsi, pour en donner un exemple assez simple, qu'ayant la progression des nombres triangulaires 0. 1. 3. 6. 10. 15. &c. dans laquelle on voudroit insérer un terme entre chacun d'eux, on remarqueroit que leur différence étant arithmétiquement croissante, il faut donc que cette loi s'observe encore entre les termes de la nouvelle progression, c'est-à-dire que la différence y croisse encore arithmétiquement. Pour y parvenir, soient ~~deux~~  $x$  &  $z$  les deux termes à insérer entre 0 & 1, 1 & 3; cela fait, on aura d'abord  $x$ ,  $1 - x$ ,  $z - 1$

en proportion arithmétique continue

ce qui donnera  $x = \frac{3-z}{3}$ . La seconde

équation viendra de la progression

arithmétique discrete qui doit se trou-

ver entre les termes  $x; 1-x; z-1$   
 $3-z$ : ce qui donne  $z = \frac{2x+1}{2}$ .

Or cette valeur de  $z$  substituée dans la

premiere expression de  $x$ , donnera enfin

$x = \frac{3}{8}$ ; on trouvera de même  $z = 1\frac{7}{8}$

la suite interpolée sera donc  $0. \frac{3}{8}. 1$

$1\frac{7}{8}. 3. 4\frac{3}{8}. 6. \&c.$  dont les différences

sont encore en progression arithmétique,

sçavoir  $\frac{3}{8}. \frac{5}{8}. \frac{7}{8}. \&c.$  c'est là l'es-

prit des interpolations; & en voilà assez

pour mettre les personnes intelligentes

en état d'aller plus loia dans l'occasion

appliquons ceci à la mesure du cercle.

On remarquera donc avec *Wallis*,

qu'on a une suite d'expressions, comme

$\frac{aa-xx^0}{aa-xx^0} \cdot \frac{aa-xx^1}{aa-xx^1} \cdot \frac{aa-xx^2}{aa-xx^2}$

$\frac{aa-xx^3}{aa-xx^3} \cdot \&c.$  dont les exposans de

*Algebra & arithmetica infinitorum.*

issances, sçavoir 0. 1. 2. 3. &c. croissent arithmétiquement. On a aussi les nmes des élémens que ces expressions signifient, ou les rapports des figures proposées de ces élémens à la figure uniforme de même base & même hauteur; sont dans le cas particulier où  $x = a$ , sont, dis-je,  $1. \frac{2}{3}. \frac{8}{15}. \frac{48}{105}$ . respectivement, ou, pour observer plus facilement la loi qui regne entre ces expressions,  $1. \frac{2}{3}. \frac{2 \times 4}{3 \times 5}. \frac{2 \times 4 \times 6}{3 \times 5 \times 7}$ . &c. Or on infere dans la suite des expressions ci-dessus  $\frac{aa - xx^0}{xx^1}$ , &c. celle-ci  $\frac{aa - xx^1}{xx^2}$ , elle tombera entre le premier & le second, comme celles-ci  $\frac{aa - xx^2}{xx^3}$ .  $\frac{aa - xx^3}{xx^4}$  tomberont entre le second & le troisième, le troisième & le quatrième, & il se formera une progression régulière de l'expression  $\frac{aa - xx}{xx}$ , dont les exposans seront successivement 0.  $\frac{1}{2}$ . 1.  $1 \frac{1}{2}$ . 2.  $2 \frac{1}{2}$ . &c. en croissant arithmétiquement croissans, mais

par des différences de moitié des précédentes. Or ne pouvant avoir directement les formations de ces termes nouveaux, on les auroit du moins si on pouvoit de même inférer entre les termes  $1. \frac{2}{3}. \frac{8}{15}. \frac{48}{105}$ . &c. si on pouvoit, dis-je, inférer de nouveaux termes entre le premier & le second, le second & le troisième, &c. & que ces nouveaux termes, suivant l'esprit des interpolations, se conformassent exactement à la loi qui régné dans cette progression, de même que leurs correspondans  $\frac{aa - xx^2}{x}$ . &c. se conforment à la loi de la progression où on les a inférées. Le problème de la quadrature du cercle envisagé de cette manière, se réduit donc à interpoler entre 1 &  $\frac{2}{3}$  le terme qui convient à la progression  $1. \frac{2}{3}. \frac{2 \times 4}{3 \times 5}. \frac{2 \times 4 \times 6}{3 \times 5 \times 7}$ . &c.

IV. Il seroit long, & beaucoup plus que les limites de cet ouvrage ne me le permettent, de développer

tout le reste de la théorie, toutes les remarques adroites que fait *Wallis* dans cette vûe; il trouve enfin \* que ce terme est la suite infinie

$$\frac{2 \times 4 \times 4 \times 6 \times 6 \times 8 \times 8 \times 10 \times 10}{3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 9 \times 9 \times 11 \times}$$

&c. ou,

ce qui revient au même,  $\frac{2}{3} \times \frac{16}{15} \times \frac{36}{35}$

$\times \frac{64}{63} \times \frac{100}{99}$  &c. à l'infini, ou encore

$\frac{8}{9} \times \frac{24}{25} \times \frac{48}{49} \times \frac{80}{81}$ , &c. à l'infini. Celle-

ci, dans quelque endroit qu'on la termine, donne une valeur plus grande

que la vraie; la précédente la donne

toujours moindre, d'où l'on peut se

former des limites de plus en plus ser-

rées: mais si l'on vouloit employer cette

expression à des approximations de l'aire

du cercle, *Wallis* en fournit un moyen

plus court que le précédent: le cercle est

toujours plus grand que cette expres-

sion  $\frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \dots \cdot z}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 9 \cdot \dots \cdot z - 1} \sqrt{\frac{z - 1}{z}}$

& moindre que

$$\frac{2 \times 4 \times 4 \times 6 \times 6 \times 8 \times 8 \times 10 \dots \times z}{3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 9 \times 9 \dots \times z - 1} \sqrt{\frac{z}{z - 1}}$$

\* *Arithm. infinit. prop. 121.*

$x$  exprime ici le dernier terme, ou celui où l'on veut s'arrêter, & il faut qu'il soit tel que son inférieur correspondant soit moindre de l'unité; ou, ce qui est la même chose, que le nombre des termes soit pair. Ces limites sont démontrées par la manière dont *Wallis* trouve son expression, car il ne la conclut infinie que parce qu'il la trouve de cette forme, d'abord plus grande que  $\frac{2 \times 4}{3 \times 3} \sqrt{\frac{3}{4}}$  & moindre que  $\frac{2 \times 4}{3 \times 3} \sqrt{\frac{4}{5}}$ , & ensuite plus grande que  $\frac{2 \times 4 \times 4 \times 6}{3 \times 3 \times 5 \times 5} \sqrt{\frac{5}{6}}$ , & moindre que  $\frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5} \sqrt{\frac{6}{7}}$ , & ainsi de suite à l'infini. Or il sera aisé d'assigner par là quel nombre de termes il faudroit employer pour arriver à un degré d'exactitude requis. Au reste si quelqu'un doutoit de la vérité de cette expression, je remarquerai en sa faveur, qu'elle se réduit à la suite si

connue pour le cercle  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \&c.$   
 M. *Euler* le démontre dans les Mémoires de Pétersbourg (a), dans l'un desquels ce sçavant Géometre enseigne à transformer de différentes manieres les suites infinies pour les réduire à la forme qu'on juge la plus avantageuse ; ceux qui ne se rendent qu'à la multitude des preuves, regarderont celle-ci comme une confirmation frappante de la vérité de l'une & de l'autre suite.

V. *Wallis* paroît être dans une opinion fort semblable à celle de *Gregori* sur la quadrature du cercle, il panche beaucoup à la regarder comme absolument impossible : les paroles suivantes (b) contiennent son sentiment à ce sujet ; elles sont remarquables. *Je suis fort porté à croire, dit-il, ce que j'ai soupçonné dès le commencement, que le rapport (du cercle à une figure rectili-*

(a) T. 9, ann. 1737, p. 178.

(b) Alg. c. 83. Sch.

ligne), est d'une nature à ne pouvoir être désignée par aucune expression encore reçue, pas même par des nombres sourds, de sorte qu'il seroit peut-être nécessaire d'introduire quelque nouvelle manière d'expression autre que les nombres rationaux & sourds. Une des raisons qui déterminoit *Wallis* à cette manière de penser, étoit la remarque qu'il faisoit, que la Géométrie connoît dès long-tems une infinité de grandeurs absolument irréductibles à des nombres rationaux. L'ordre & l'analogie ne conduisent-elles pas à penser en conséquence qu'il peut y en avoir d'autres qui sont à l'égard des nombres sourds eux-mêmes, ce que ceux-ci sont à l'égard des premiers? J'ajouterai que la Géométrie ne se borne pas à ce seul exemple; il y a des ordres entiers de problèmes absolument irréductibles à d'autres inférieurs: la rectification de l'ellipse & de l'hyperbole paroît être de



cette nature , comparée à la quadrature de ces courbes ; & celles-ci le sont probablement de même , comparée à quelque figure rectiligne que l'on voudra , soit rationnelle , soit irrationnelle au quarré de leur diametre. Dans ce cas il est aussi chimérique de chercher la quadrature du cercle & de l'hyperbole autrement que par approximation , que de prétendre assigner exactement la racine d'un nombre qui n'est pas quarré.

VI. La découverte qu'on vient d'exposer fut bientôt suivie d'une autre qui ne lui cede point en beauté ; elle est dûe à Milord *Brouncker*. Consulté par *Wallis* , lorsqu'il travailloit à interpoler sa suite  $1. \frac{2}{3}. \frac{8}{15}$  . &c. consulté , dis-je , de quelle maniere il croiroit pouvoir y parvenir , il s'y appliqua ; & pendant que *Wallis* rencontroit , guidé par son analyse , l'expression qu'on a déjà fait connoître , il trouva de son



diametre au cercle, en faisant le diametre égal à l'unité; mais lorsqu'on la terminera, on aura alternativement des limites par excès & par défaut: ainsi

$$1 + \frac{1}{2} \text{ est trop grand, } 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2}$$

est trop petit, &c. Au reste ces limites seront beaucoup plus resserrées si l'on fait toujours le dernier dénominateur égal à la racine de son numérateur augmenté de 2, on aura alors

$$1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{5}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{25}{7},$$

dont la premiere est encore plus grande que la vérité, la seconde moindre, la troisieme plus grande, & ainsi à l'infini. Une invention si remarquable méritoit d'être confirmée par une démonstration; M. Wallis en a donné une à la fin de son Arithmétique des infinis: mais on ne connoît point l'analyse qui y con-

duisit Mylord *Brouncker*, & on doit regretter, avec *M. Euler* (a), qu'elle n'ait jamais été communiquée.

VII. Les fractions de cette forme ont plusieurs propriétés remarquables, qui leur ont mérité l'attention spéciale de *M. Euler* : on voit sur ce sujet un savant écrit de ce Géometre dans les Mémoires de Petersbourg (b). Parmi plusieurs usages auxquels il les emploie, il y en a un qui appartient à l'objet présent. Il s'en est servi pour résoudre ce problème : une fraction exprimée par un grand nombre de chiffres étant donnée, par exemple, la raison de la circonférence au diamètre de 3, 14159, 26535, &c. à 1, 0000, 0000, &c. il s'agit de trouver toutes les fractions en moindres termes, qui approchent de si près de la vérité qu'il soit impossible d'en approcher davantage sans en employer de plus grandes. On

(a) Mémoires de Petersbourg, t. 9, p. 108.

(b) *Ibidem*. p. 98.

veut, par exemple, trouver quelle est la fraction, dont le numérateur ne passant pas 10, ou 100, ou 1000, différera le moins qu'il est possible de la vérité; il faut pour cela réduire ce rapport en fraction continue; c'est ce qu'on fera en divisant 3. 1415 &c. par 10000 &c. le quotient est 3, ensuite on divisera 10000, par le reste, 1415, &c. & l'on trouve 7; on continuera de même en divisant 1415 &c. par le reste de celle-ci, & on aura 15, & ainsi de suite; la fraction continue

$$\text{sera donc } 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{192}, \&c.}}$$

ce qui donne la solution du problème, car  $\frac{3}{1}$  est moindre qu'il ne faut; les deux premiers termes sont  $\frac{22}{7}$ , la proportion d'*Archimède*, qui de toutes celles qui ne passent pas 100, est la plus exacte par excès; les trois premiers termes donnent la raison trop petite de

333, 106; en prenant un terme de plus on a celle de *Meius*, qui est excédente 355. 113 : l'une & l'autre est la plus exacte (l'une par défaut, l'autre par excès), de toutes celles qui n'ont pas un numérateur plus grand que 1000; celle de *Meius* sur-tout approche extrêmement de la vérité. On en voit la raison dans la fraction continue, c'est que le terme suivant  $\frac{1}{192}$  est très-petit; on trouve enfin de suite 193993; 33102. 104348; 33215. 208341; 66317. 521030; 195849. &c. qui ont des propriétés semblables; & que *M. Euler* enseigné à trouver par un moyen fort simple. *M. Wallis*, qui a résolu ce problème par une méthode beaucoup plus laborieuse, a donné une table de ces fractions poussée assez loin. \*

VIII. C'est une remarque digne d'attention dans l'histoire des Sciences,

*Algebra*, c. 8.

que les découvertes les plus heureuses ont presque toujours été précédées de quelques légères ébauches, qui en ont été l'occasion & le motif. Cela se vérifie ici : les idées de *Wallis* sur les interpolations, mises en œuvres plus heureusement par *Newton*, ont été le principe de presque toutes les découvertes de la nouvelle Géométrie. Les suites infinies de la forme dont nous les employons, le développement des puissances, ou le fameux binome de *Newton*, & un grand nombre de nouvelles expressions de l'aire du cercle, furent le premier fruit des tentatives qu'il fit pour surmonter l'obstacle qui avoit arrêté *Wallis*. *Newton* nous raconte lui-même le progrès de ces découvertes, dans sa seconde lettre\*, écrite à Oldembourg en 1676. Nous ne sçaurions suivre un guide plus sûr.

\* *Commercium Epist. de anal. promotâ*, p. 67.

*Newtoni opuscula*, t. 1, p. 328.

*Wallis*, comme on l'a vû, avoit réduit la quadrature du cercle à déterminer la sommation du terme

$\sqrt{1 - x^2}$ , dans les principes de l'arithmétique des infinis : sommation qui dans le cas défini du quart de cercle entier, ou de  $x = 1$ , est le terme à interpoler entre les deux premiers de la suite hypergéométrique  $1. \frac{2}{3}. \frac{8}{15}.$  &c. *Wallis* avoit bien remarqué \* que

¶ dans la suite  $x. x - \frac{x^3}{3}. x - \frac{2x^5}{3}$   
 $+ \frac{x^5}{5}.$  &c. on pouvoit trouver le

terme moyen entre les deux premiers, on auroit quelque chose de plus parfait que la quadrature qu'on a fait connoître ; car on auroit eu alors la mesure indéfinie du segment correspondant à l'abscisse  $x$  : mais il ne put y parvenir, quoiqu'il se fut assez bien mis sur la voie ; la réussite en étoit réservée aux premiers essais de *Newton*.

\* *Ibid.*, c. 32.



Pour suivre plus aisément la marche de ce puissant génie dans cette recherche, il nous faut exposer plus distinctement les expressions qu'on a données ci-dessus; on a donc

$$x - \frac{0}{3} x^3$$

$$x - \frac{1}{3} x^3$$

$$x - \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{3} x^5$$

$$x - \frac{3}{3} x^3 + \frac{3}{3} x^5 - \frac{x^7}{7}$$

$$x - \frac{4}{3} x^3 + \frac{5}{3} x^5 - \frac{4}{7} x^7 + \frac{1}{9} x^9.$$

Ce nombre suffira pour l'objet qu'on se propose.

*Newton* remarquoit donc d'abord que toutes ces expressions commençoient par  $x$ , que tous leurs termes étoient alternativement positifs & négatifs; que les puissances de  $x$  alloient toujours en croissant, comme  $x$ .  $x^3$ .  $x^5$  &c. Il ne s'agissoit que de trouver les coefficients; pour cela il observoit encore que les coefficients des termes qui sont dans le second rang perpendiculaire, sont successivement  $\frac{0}{3}$ .  $\frac{1}{3}$ .  $\frac{2}{3}$  &c. ainsi l'expression

à insérer entre  $x - \frac{1}{3}x^3$  &  $x$  ou  $x - \frac{0}{3}x^3$ , doit avoir un coefficient moyen arithmétique entre  $\frac{0}{3}$  &  $\frac{1}{3}$ , sçavoir  $\frac{1}{3}$ . Les deux premiers termes seront donc  $x - \frac{1}{3}x^3$ ; & comme les dénominateurs croissent arithmétiquement & sont 3. 5. 7. &c. tout est fait à cet égard, il ne reste plus que les numérateurs de ces coefficients. C'est aussi précisément le nœud de la difficulté, & il y eut bien de la sagacité à remarquer, comme fit *Newton*, que  $m$  étant le numérateur du coefficient du second terme, ceux des suivans étoient successivement  $\frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2}$ ,  $\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3}$ , &c. c'est ce qu'il est aisé d'éprouver sur les termes où ces coefficients sont connus.

Appliquons à présent cette dernière remarque à l'expression  $x - \frac{1}{3}x^3$ , &c. où le numérateur du second terme est

$\frac{1}{2}$ . On trouve, en mettant cette valeur en la place de  $m$  dans les formules ci-dessus, pour les suivans —  $\frac{1}{8}$ .  $\frac{1}{16}$ . —  $\frac{1}{128}$ . &c. ainsi ayant égard à la composition des signes, on trouve pour le troisième terme —  $\frac{1}{8} x^5$  ou bien

—  $\frac{1}{40} x^5$ ; pour le quatrième —  $\frac{1}{16} x^7$ ,

ou —  $\frac{1}{112} x^7$  &c. cette expression sera enfin  $x - \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{40} x^5 - \frac{1}{112} x^7 - \frac{1}{1152} x^9$  &c. ou, afin de mieux voir la loi de sa continuation,  $x$

—  $\frac{1}{2 \cdot 3} x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7$

—  $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} x^9$  &c. la première suite

qui ait été donnée de l'aire du cercle. Si le détail où l'on vient d'entrer a déplu à quelque lecteur, on le prie de faire attention que la nature de cette découverte, l'une des plus intéressantes de la Géométrie, le demandoit. La vraie histoire des Sciences consiste à développer autant qu'il se peut le procédé même

de l'invention, & cela est d'autant plus nécessaire que ce procédé est ordinairement différent de celui que l'on expose dans la suite.

IX. *Newton* ne tarda pas à découvrir un moyen plus court & plus simple de parvenir à la même vérité : il s'aperçut bientôt après qu'il ne s'agissoit que de développer le terme  $\sqrt{1 - xx}$ , en expressions rationnelles ; il le fit d'abord en interpolant, par une méthode semblable, le second terme \* dans la suite :

1

\*

 $1 - xx.$  $1 - 2xx - x^4$ 

ici il ne faut qu'omettre les diviseurs 3. 5. 7. de la précédente, & diminuer chaque puissance de  $x$  d'une dimension,

on a alors  $1 - \frac{xx}{2} - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6,$

&c. Cette remarque mit *Newton* en possession de sa formule pour élever

le binome  $a + b$  à une puissance quelconque  $m$ , formule qui sert encore à extraire les racines, en faisant  $m$  un nombre rompu. Il s'aperçut enfin que pour trouver la valeur rationnelle de  $\sqrt{1 - xx}$ , il n'y avoit qu'à en extraire la racine quarrée par l'opération ordinaire : on trouvera ici cette seule différence, que l'opération ne se terminera pas, de même que dans les extractions de racines de nombres qui ne sont pas des puissances exactes. Par cette méthode, la plus simple de toutes, du moins dans ce cas particulier, on trouve  $\sqrt{1 - xx}$  comme ci-devant égal à  $1 - \frac{xx}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{16}$ , &c. ce qui suivant la méthode de *Wallis*, donne pour l'aire du cercle la même suite  $x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{40} x^5 - \frac{x^7}{112}$ , &c.

Ces trois méthodes différentes, & qui conduisent précisément à la même valeur de l'aire du cercle, doivent se

servir de confirmation mutuelle auprès de ceux pour qui cette analyse seroit trop relevée : elles n'ont pas besoin de ce secours auprès des Géometres un peu versés, pour qui elles auront chacune en particulier assez d'évidence. Je remets à tirer plus bas quelques conséquences & quelques détails en faveur de ceux que ces vérités générales ne satisferoient pas.

X. L'invention des calculs différentiel & intégral, ou, comme on les nomme en Angleterre, des fluxions, & fluentes, succéda bientôt à ces premières découvertes sur la mesure du cercle, & en fournit de nouvelles; l'illustre *Newton* en étoit déjà possesseur en 1668. *Mercator* publioit alors sa *Logarithmotechnie*, ouvrage dans lequel, comme on sçait, il quarroit l'hyperbole par une suite infinie, & tiroit de là la construction des logarithmes. C'est une découverte qui étoit familiere dès les années 1665, 1666, à *Newton*, in-

connu encore & ne cherchant point à se faire connoître ; car il raconte qu'il s'amusa alors à calculer les logarithmes par la quadrature des aires hyperboliques. *Pudet dicere*, écrivoit-il à *Collins*, en 1676, *ad quot figurarum loca computationes has, otiosus eo tempore perduxi. Nam tunc sane nimis delectabar inventis hisce.*

La publication de l'ouvrage de *Mercator*, qui auroit excité un autre à divulguer tant de découvertes, faillit au contraire à déterminer *Newton* à supprimer toutes les siennes ; il se persuada que *Mercator*, après avoir trouvé la quadrature de l'hyperbole ne tarderoit pas à rencontrer celle du cercle ; ou que si elle lui échappoit, d'autres étendroient sa découverte & l'appliqueroient à cette courbe. Il n'y avoit en effet qu'un pas à faire, & un pas en apparence peu difficile ; mais ce n'est pas là le seul exemple dans l'histoire des sciences, où l'on voit une découverte

manquée par celui-là même qui l'avoit amenée à sa maturité. *Newton* enfin ne croyoit pas être encore d'un âge assez mur pour écrire, trait admirable & unique de modestie dans un génie si supérieur ! qu'il devoit être gravé dans l'esprit de ces hommes, dont les ouvrages prématurés annoncent la téméraire entreprise d'instruire le public de ce dont ils ont à peine une légère teinture !

Ce ne fut que sur les instances de *Barrow*, que *Newton* se détermina à communiquer ces découvertes analytiques. *Barrow* étoit venu à connoître sur ces entrefaites cet homme rare, & il en avoit senti tout le mérite, car il étoit lui-même homme de génie & grand Géometre : *Newton* lui remit, aussi-tôt après la publication de la *Logarithmotechnie* de *Mercator*, un écrit intitulé, *Analysis per aequationes numero terminorum infinitas*, qui fut envoyé à *Collins*, le *Mersenne* de l'An-



gleterre. On trouve dans ce traité, imprimé dans le *Commercium epistolicum*, sur la copie de *Collins*, collationnée au manuscrit de *Newton*; on y trouve, dis-je, presque tout le calcul moderne; les quadratures & les rectifications des courbes, soit de celles qui en sont susceptibles en termes finis, soit de celles qui ne les admettent qu'en suite infinie; la formation de ces suites, leur retour, l'extraction des racines, la résolution des équations de tous les degrés; le principe enfin du calcul des fluxions & fluentes, qui y est clairement énoncé & déduit du mouvement (page 14 du *Comm. Epist.*). Une exposition plus détaillée de toutes ces découvertes appartient à une histoire particulière de la Géométrie. On se bornera ici à ce qui regarde spécialement la mesure du cercle, que *Newton* perfectionne dans cet écrit de bien des manières. Il y enseigne à trouver indéfiniment la grandeur de l'arc, soit

134 QUADRATURE

par la connoissance du sinus versé ; c'est-à-dire de l'abcisse, commençant à l'extrémité du diamètre comme  $AD$ , soit par celle du sinus droit ou de l'abcisse (fig. 19), prenant son origine au centre. Il en fait de même de l'aire ; ainsi supposant le rayon du cercle égal à 1, l'aire du segment  $CDEB$ , qui répondra à l'abcisse  $x$  ou  $CD$ , est égale à l'expression

$$x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112}, \text{ \&c.}$$

& l'arc  $DE$  est égal à la suivante ;

$$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}, \text{ \&c.}$$

Au reste les coefficients  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{40}$ ,  $\frac{1}{112}$  sont les produits successifs  $\frac{1}{2 \cdot 3}$ ,  $\frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5}$ ,

$\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}$ , &c. ce qui donne le moyen

de continuer la progression. Mais si l'on veut la grandeur du segment  $ADE$ , nommant  $AD = x$ , & le rayon 1, sa valeur est

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{3} x - \frac{x^2}{2 \cdot 5} - \frac{x^3}{4 \cdot 7 \cdot 2} - \frac{3x^4}{4 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 4}$$

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot x^3}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 8} - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot x^6}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 13 \cdot 16} ,$$

dont la progression est aisée à remarquer, au dernier facteur du diviseur près, qui dans chaque terme, à commencer du troisième, va toujours en doublant; la même supposition faite, la valeur de l'arc  $AE$  est

$$\sqrt{2x} \times 1 + \frac{x}{6} + \frac{3}{40} x^2 + \frac{1}{112} x^3 + \frac{35}{1152} x^4, \text{ \&c.}$$

On peut enfin, *vice versa*, trouver la grandeur du sinus soit versé, soit droit, l'arc ou l'aire étant donnée par la méthode du retour des suites. *Newton* en donne quelques exemples: l'arc  $AE$  étant  $x$ , le rayon 1, le sinus versé  $DA$  est égal à la suite

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2 \times 3 \times 4} + \frac{x^6}{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} - \frac{x^8}{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8}, \text{ ou } \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} - \frac{x^8}{40320} + \text{\&c.}$$

& le sinus  $DE$  à celle-ci,  $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$

—  $\frac{z^7}{5040}$  +  $\frac{z^9}{362880}$  — &c. Il est aisé d'appercevoir que les diviseurs numériques sont ici les produits successifs  $2 \times 3$  ;  $2 \times 3 \times 4 \times 5$  ;  $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$ , &c.

XI. Les découvertes de *Newton* ayant été publiées & communiquées à divers Géometres par l'entremise de *Collins*, celui qui se hâta le plus d'y ajouter, & qui le fit le plus heureusement, fut *M. Jacques Gregori*; c'étoit un Géometre de grande espérance, un homme à seconder *Newton* si la mort ne l'eût enlevé à la fleur de son âge. Il l'avoit précédé dans l'invention du télescope catadioptrique, & il marcha de près sur ses traces dans quelques-unes de ses découvertes analytiques.

A peu près dans le même temps que *Newton* se dispoit à répondre aux instances de *Barrow*, *Gregori* publioit dans ses *Exercitationes* une suite infinie pour exprimer l'aire du cercle : cet

ouvrage parut peu après celui de *Mercator*. La suite de *Gregori* est celle-ci ;

$$4rr \text{ divisé par } 2d - \frac{e}{3} - \frac{e^2}{90d} - \frac{e^3}{756d^2} \\ - \frac{23}{113400d^3} - \frac{260e^5}{7484400d^4}, \text{ \&c. le}$$

rayon est désigné dans cette expression par  $r$  ;  $d$  est la moitié du côté du carré inscrit, &  $e$  la différence du rayon avec ce côté. Cette suite converge assez rapidement, elle n'a que le désavantage de se servir de termes un peu compliqués, & de ne pas être indéfinie.

*Gregori* fut bientôt informé par *Collins* de la découverte de *Newton* sur l'aire des courbes, & quelques-unes de ses suites lui furent communiquées. La préoccupation où il étoit sur la sienne & sur sa méthode lui firent d'abord croire qu'elles devoient avoir la même origine, ce qui contribua à les lui rendre moins remarquables ; voyant même qu'elles ne se rapportoient point aux siennes, il conçut quelques doutes sur

leur légitimité : mais ce ne fut qu'un sentiment passager , auquel succéda bientôt celui de la justice que méritoient les inventions de *Newton* ; non seulement il s'assura de leur vérité , mais à l'aide d'une profonde méditation , il parvint à découvrir la méthode elle-même que *Newton* s'étoit formée. On lui rend ce témoignage dans plusieurs endroits du *Commercium epist.* \* Il renvoya bientôt après à *Collins* la suite pour exprimer l'arc par la tangente ,

sçavoir ,  $a = t - \frac{t^3}{3rr} + \frac{t^5}{5r^4} - \frac{t^7}{7r^6}$

&c. où  $t$  est la tangente ,  $r$  le rayon , &  $a$  l'arc cherché. Cette suite , l'une des plus élégantes par sa simplicité & la régularité de la loi de sa progression , est , tout compensé , celle qui maniée avec adresse fournit les approximations les plus commodes. *Grégori* donna aussi des suites pour exprimer la tangente & la secante , l'arc étant connu , & même

\* Pages 29 , 48 , 71 , éd. de 1714 , in-4° :

pour tirer immédiatement de l'arc donné ses sécante & tangente artificielles, c'est-à-dire leurs logarithmes. La rectification de l'ellipse & de l'hyperbole en suites infinies, que *Collins* ne lui avoit point communiquée, étoit aussi de ce nombre. Je n'ai fait mention de ces dernières découvertes, étrangères à mon sujet, que pour justifier les éloges que j'ai donné à ce grand Géometre : je reprends le fil de mon histoire.

XII. On doit reconnoître, & c'est une vérité dont le *Commercium epistolicum* fournit des preuves, que toutes ces nouveautés brillantes d'analyse prirent naissance en Angleterre, & que les Géometres du continent y eurent alors peu de part ; ce fut seulement quelques années après (en 1674) que M. *Leibnitz* trouva sa suite pour le cercle, sçavoir, le diamètre étant l'unité,  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}$ , &c. On ne peut disconvenir que cette suite soit la

même au fond que celle de *Gregori*; qui trouvoit (faisant le rayon = 1 & la tangente aussi = 1) la même expression pour le demi-quart de cercle, ou l'arc de  $45^\circ$ ; cependant plusieurs circonstances doivent écarter l'imputation de plagiat intentée à ce sujet contre *Leibnitz*.

1°. Cette découverte est chez lui une suite de la méthode de transformation qu'il avoit imaginée pour débarrasser l'expression de l'ordonnée du cercle de l'irrationalité qui l'accompagne, afin d'y appliquer le développement de *Mercator*. Cette méthode, exposée au long dans le cours d'*Ozanam*, avoit été communiquée aux Géomètres vers l'an 1674. *Leibnitz* s'est plaint plusieurs fois du silence de cet écrivain sur l'auteur de cette ingénieuse invention, dont on seroit tenté de lui faire honneur, si l'on ne sçavoit que ce Mathématicien étoit d'une classe bien inférieure à celle



des analystes dont il est question ici.

2°. La bonne foi de *Leibnitz* paroît évidemment dans les Lettres qu'il écrivoit sur cela à *Oldenbourg*, en 1674, & dans lesquelles il lui faisoit part de sa découverte avec une sorte de transport \*. Croira-t-on qu'il eût été si peu fin que de tenir un pareil langage s'il l'avoit reçûe de *Collins* ou *Oldenbourg*, comme on l'a prétendu faire soupçonner ? Les réponses de ce Secrétaire de la Société Royale de Londres le lui auroient bien rappelé ; il se contente au contraire de l'informer, comme pour la première fois, des progrès que *Newton* & *Gregori* avoient fait dans l'analyse. Ces raisons me font penser qu'il y auroit de l'injustice à dépouiller *Leibnitz* de cette découverte, comme ont voulu faire quelques partisans trop zélés de la gloire de la nation Angloise. *Newton* plus équitable, & sçachant que ce qui

\* *Comm. epist.* p. 37, ed. in-4°.

s'étoit présenté à *Gregori* pouvoit aussi avoir été trouvé par *Leibnitz* au-delà des mers, ne fait point de difficulté de l'appeller la suite de *Leibnitz*. \* *Leibnitz* avoit eu dessein de la publier dans un traité particulier qu'il se proposoit d'intituler du nom de *Quadratura arithmetica*; il est souvent parlé de ce projet dans le *Commercium epistolicum*: sans doute lorsqu'il fut en possession de plus grandes découvertes, celle-ci ne lui parut plus assez remarquable pour en faire la matière d'un ouvrage: Il en donna le précis dans les actes de *Leipsick*, année 1682, sous le titre de *Vera proportio circuli ad quad. circumscriptum*.

XIII. Les raisons que je viens de présenter pour disculper *Leibnitz* de l'accusation de plagiat intentée contre lui, recevront un nouveau poids de la remarque suivante; c'est que la découverte dont il est ici question semble

\* *Comm. epist.* p. 79, & ailleurs.

n'avoir pas été d'une difficulté si supérieure, qu'elle ne se soit présentée en même tems à divers Géometres. Elle n'échappa pas à *M. de Lagny*, si nous l'en croyons lui-même; il nous assure, dans les Mémoires de l'Académie de 1719, qu'il avoit trouvé dès l'année 1682 la même suite, nullement informé encore de ce que *Gregori* ni *Leibnitz* avoient fait à ce sujet; & l'on n'en sera point surpris, car cette année-là est la première où fut publiée la suite en question dans les actes de *Leipsick*: *M. de Lagny*, alors à *Toulouse*, ne pouvoit que difficilement avoir connoissance, soit des lettres de *Leibnitz* & *Newton*, toujours restées entre des mains privées, soit de ces Journaux que l'Allemagne voyoit tout nouvellement paroître. Ajoutons à cela que la méthode de *M. de Lagny*, de même que celle de *Leibnitz*, dont elle diffère cependant, donne du poids à ce qu'il dit, car elle paroît avoir été imaginée

dans les mêmes vûes, je veux dire pour éviter l'irrationalité, qui seule empêchoit d'appliquer au cercle la méthode de division de *Mercator*, la seule encore connue pour quarrer les figures. Si *M. de Lagny* a pu faire cette découverte, ne sera-t-il pas fort probable que *M. Leibnitz*, qui a donné des preuves d'un génie fort supérieur, l'ait fait dans les mêmes circonstances ?

XIV. Depuis que le calcul intégral a fait des progrès parmi les Géometres, rien n'est plus connu que les différentes expressions qu'on vient de donner du cercle & de ses parties : il ne faut qu'être initié dans ce calcul pour les trouver. On ne s'attachera donc point à les développer ici par son moyen, ceux qui l'ignorent peuvent consulter les ouvrages qui en ont traité : voici seulement quelques expressions du cercle, qu'on n'avoit pas pû faire connoître dans le cours de la narration précédente.

Si la corde d'un arc est  $x$ , le diamètre 1, le segment est égal à

$$\frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{3x^7}{4 \cdot 4 \cdot 7} + \frac{3 \cdot 5x^9}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 9}, \&c.$$

Cela est aisé à démontrer, soit en le tirant immédiatement de l'expression du petit triangle  $ACB$  (fig. 19), qui est

$$2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$$

soit en le dérivant de la suite qui exprime le demi-segment  $ADE$ , la demi-corde  $AE$  étant  $= \frac{1}{2}x$ .

On a donné précédemment, d'après MM. Leibnitz & Gregori, la suite  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}, \&c.$  pour l'expression de l'arc de  $45^\circ$ , ou de l'aire du quart de cercle, le rayon étant 1.

M. Newton a trouvé que cette suite,  $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \&c.$  exprimait aussi l'arc de  $90^\circ$ , la corde étant l'unité, & le rayon étant conséquemment  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ .

Voici encore une autre manière d'exprimer l'aire du cercle.

Que le diamètre soit 1, & la tangente

$t = \frac{1}{2}$ , l'aire de tout le cercle sera la somme de ces trois suites ;

$$t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + \frac{t^9}{9} \&c.$$

$$t^2 + \frac{t^4}{3} - \frac{t^6}{5} + \frac{t^8}{7} - \frac{t^{10}}{9} \&c.$$

$$t^4 - \frac{t^{10}}{3} + \frac{t^{16}}{5} \&c.$$

Je passe à présent à montrer l'usage de ces expressions, qu'on n'a encore envisagé que d'une manière générale.

XV. Il est d'abord évident que chacune de ces suites fournit un moyen commode pour trouver la grandeur approchée de tout segment, de tout secteur, de tout arc de cercle, lorsque la valeur de l'indéterminée qui lui convient sera assez petite pour faire converger la suite rapidement : je vais m'expliquer par un exemple. Qu'on demande l'aire du segment  $CDEB$  (fig. 20.), où l'abscisse n'est qu'une petite partie, par exemple, un tiers du rayon,

Alors la suite qui convient à ce cas, sça-

voir,  $x - \frac{1}{2 \cdot 3} x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5$ , &c. se

réduira à  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 27} - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 243}$ ,

&c. ou  $\frac{1}{3} - \frac{1}{162} - \frac{1}{9720}$ , &c. Or il

est visible que les deux premiers termes

seuls donnent la grandeur de ce seg-

ment à moins d'une 9000<sup>e</sup> près. Ainsi

le plus souvent un très-léger calcul

approche extrêmement de la vérité,

& dans d'autres cas moins avantageux,

celui de 4, 5 ou 6 termes suffira.

Je ne m'arrête pas davantage à ceci;

dans d'autres cas où la suite seroit

médiocrement convergente, on pourra

même éviter la peine de sommer un

nombre de termes médiocre; il y a

des méthodes que l'on indiquera, &

par lesquelles on convertit une suite

peu convergente en une autre qui l'est

beaucoup.

XVI. Lorsque l'on a voulu appli-

quer ces suites à en tirer de grandes

approximations de la valeur entière du cercle, on a cherché, pour diminuer le travail, les cas les plus avantageux pour les faire converger. Si voulant, par exemple, exprimer l'aire du quart de cercle, on s'étoit contenté de donner à l'abscisse  $x$  la valeur qui lui convient alors, dans la suite  $x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{40}x^5 - \frac{1}{112}x^7$ , &c. on auroit eu, puisqu'elle est alors l'unité, on auroit eu, dis-je,  $1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \&c.$  qui est en effet la vraie grandeur du quart de cercle. Mais comme cette suite converge peu, il faudroit sommer un grand nombre de termes, peut-être 30 ou 40, pour en tirer une approximation seulement en dix décimales; au lieu qu'en faisant  $x$  égal à  $\frac{1}{2}$ , le travail est considérablement abrégé; car alors l'arc  $BE$  (*fig. 20*) étant le  $\frac{1}{2}$  du quart de cercle, si de la valeur de  $CBE D$  on ôte le triangle  $CDE$  connu, le reste, savoir le secteur  $CBE$ , triplé, sera le quart de cercle. Or la valeur de



**CDEB** converge assez rapidement pour la trouver sans beaucoup de peine; car la suite

$$x - \frac{1}{2 \cdot 3} x^3 - \frac{x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5}$$

$$- \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7 \text{ \&c. lorsqu'on fera } x = \frac{1}{2},$$

$$\text{se convertit en } \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 8} - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 32}$$

$$- \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 128}, \text{ \&c. qui est composée}$$

de fractions assez sensiblement décroissantes.

On s'engageroit au reste dans d'étranges calculs, si on entreprenoit de sommer ces fractions à la maniere ordinaire: la méthode des fractions décimales en diminuera considérablement la fatigue.

Cependant cette méthode elle-même ne suffiroit pas, si l'on n'usoit encore de quelque adresse pour s'épargner quantité d'opérations superflues. En effet en calculant chaque terme de la maniere qui se présente d'abord, il faudroit, après avoir trouvé le numé-

rateur & le dénominateur de chaque fraction, il faudroit, dis-je, augmenter le numérateur d'un certain nombre de zéros, & puis diviser par le dénominateur, qui bientôt seroit composé d'une multitude de chiffres. Or on voit aisément combien ce procédé seroit laborieux & incommode, au lieu qu'avec un peu d'attention il se présente un moyen de l'abrégé considérablement. Ce moyen consiste à réduire la suite proposée à une autre forme, dans laquelle chaque terme se déduit du précédent, en l'affectant d'un coefficient dont la progression est facile à appercevoir. Ayant, par exemple, nommé le premier terme négatif  $A$ , le second est  $= \frac{3A}{4 \cdot 5 \cdot 4}$ , comme il est aisé de l'éprouver en mettant au lieu de  $A$  sa valeur; nommant ensuite  $B$  ce second terme, le troisième  $C = \frac{3 \cdot 5 B}{6 \cdot 7 \cdot 4}$  & le quatrième  $D = \frac{5 \cdot 7 C}{5 \cdot 9 \cdot 4}$ , de manière que

la suite entière paroît sous cette forme :

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 6 \cdot 4} - \frac{3 \cdot A}{4 \cdot 5 \cdot 4} - \frac{3 \cdot 5 \cdot B}{6 \cdot 7 \cdot 4} - \frac{5 \cdot 7 \cdot C}{8 \cdot 9 \cdot 4} - \frac{7 \cdot 9 \cdot D}{10 \cdot 11 \cdot 4}, \text{ \&c. où il suffit de la}$$

plus légère inspection pour la continuer à l'infini.

Supposons donc à présent qu'il s'agisse de déterminer en 10 décimales l'aire du quart de cercle comparé au quarré du rayon, nous employerons pour cela la suite préparée comme l'on vient de voir, où l'abcisse  $x$  a été faite  $= \frac{1}{2}$ , afin de trouver le segment  $BCDE$ . J'ai calculé en particulier chaque terme jusqu'à 15 décimales, afin d'être plus assuré que la dernière de celles que j'emploie ici est exacte. Nous aurons donc d'abord  $\frac{1}{2} = 0.50000, 00000, 00.$  &  $\frac{1}{48} = 0.02083, 33333333$ ; ensuite multipliant ce nombre par 3, & le divisant par le produit de 4, 5, 4, ou 80, on a pour quotient 0, 00078, 12499, 99; de même

multipliant celui-ci par 15, & divisant par 168, on trouve le terme  $C = 0,00006, 97544, 64$ , & ainsi à l'égard des autres; on arrange enfin tous ces termes affectés du même signe dans une colomne, comme on le voit ici :

$A =$	. . . . .	0, 02083, 33333, 33
$B =$	. . . . .	78, 12499, 99
$C =$	. . . . .	6, 97544, 64
$D =$	. . . . .	84771, 04
$E =$	. . . . .	12137, 67
$F =$	. . . . .	1925, 59
$G =$	. . . . .	327, 94
$H =$	. . . . .	58, 77
$I =$	. . . . .	10, 95
$K =$	. . . . .	2, 10
$L =$	. . . . .	41
$M =$	. . . . .	8
$N =$	. . . . .	1
$O =$	. . . . .	0

---

0, 02169, 42612, 52

---

Orons la somme de ces termes,

002169 &c. de  $\frac{1}{2}$ , ou 0. 5000 &c. le restant sera 0, 47830, 57387, 48 ; mais il faut retrancher de là le triangle  $CDE$ , dont l'aire est égale à  $\frac{1}{4} \sqrt{\frac{3}{4}}$  ou  $\frac{1}{8} \sqrt{3} = 0. 21650, 63509, 46$ . La soustraction faite, on trouve 0. 26179, 93878, 02, pour la valeur du segment  $CDEB$ , ce qui par conséquent multiplié par 3, donne pour le quart de cercle 0. 78539, 81634, 06, le quarré du rayon étant 1. 00000, 00000, 00. Or cette expression, qui excède un peu la vérité, parce que dans tous les termes négatifs le dernier chiffre est moindre que le véritable, quoique de moins d'une unité ; cette expression, dis-je, coïncide avec celle de *Ludolph* jusqu'au dixième chiffre inclusivement : car la raison du quart de cercle au quarré du rayon est la même que celle de l'arc de  $45^\circ$  au rayon ; par conséquent l'arc de  $45^\circ$  est exprimé par le nombre ci-dessus ; donc en le quadré-

plant on aura la demi-circonférence comparée au rayon, ou la raison de la circonférence entière au diamètre. Or ce nombre multiplié par 4 est 3, 14159, 26536, 24, ce qui convient avec les nombres de *Eudolpb* jusqu'au onzième chiffre, qui est un peu trop grand dans cette expression, par la raison que nous en avons donnée plus haut.

Mais si l'on vouloit avoir une expression certainement au-dessous de la vérité, pour la comparer à la première, & être plus assuré des vraies limites de la circonférence, on l'auroit aisément en supposant les onze derniers termes de la suite ci-dessus augmentés d'une unité; à l'égard des deux premiers, ils approchent si près de leur juste valeur, qu'on peut les regarder comme vrais, & le peu dont ils s'écartent de l'exactitude par défaut, ne sçauroit contrebalancer l'excès qu'on donne à tous les autres. On aura par ce

moyen la somme de tous les termes négatifs moindre que 0, 02169 42612, 63, & par conséquent ôtée de  $\frac{1}{2}$  ou 0. 50000, &c. elle laissera un reste plus grand que la vérité; la traitant enfin comme la première, on trouvera 0, 78539, 81633, 73, qui multipliée par 4, donne pour valeur approchée de la circonférence 3, 14159, 26534, 92, qui ne pèche par défaut que dans le onzième chiffre.

XVII. On manieroit de la même façon la plupart des autres suites proposées plus haut; mais à considérer les moyens d'approximation qu'elles présentent, il est aisé d'appercevoir qu'elles n'ont pas toutes le même avantage, & que la plupart sont peu propres à donner ces immenses approximations de l'aire du cercle qu'on connoît aujourd'hui: aussi ne s'en est-on point servi indifféremment; on a donné la préférence à celle où, étant la tangente, l'arc est exprimé

par  $t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7}$ , &c. il ne s'agit pour cela que de donner à  $t$  une valeur moindre que l'unité, en la choisissant telle, qu'elle appartienne en même tems à un arc commensurable avec la circonférence entière. Car il est visible que si l'on supposoit  $t = 1$ , dans lequel cas l'arc correspondant seroit de  $45^\circ$ , la suite se réduiroit à  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$  &c. mais il faudroit une somme immense de ses termes pour en tirer une approximation en dix chiffres; ainsi, quoique remarquable dans la théorie par son élégance, elle ne seroit ici d'aucun usage. Pour l'y rendre propre il faut faire  $t = \sqrt{\frac{1}{3}}$ , l'arc correspondant sera alors de  $30^\circ$ , ou la douzième partie de la circonférence, & la suite se transformera en celle-ci:  $\sqrt{\frac{1}{3}} \times 1 - \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{9 \cdot 5} - \frac{1}{27 \cdot 7} + \frac{1}{81 \cdot 9}$ , où chaque terme est moindre que le tiers du précédent; on pourroit même la



rendre plus convergente en ajoutant les termes deux à deux, le second avec le troisième, le quatrième avec le cinquième, & divisant ensuite par 4, ce qui donneroit la quarante-huitième partie de la circonférence exprimée de cette manière :  $\frac{1}{4} \sqrt{\frac{1}{3}} \times 1 \frac{3}{3 \cdot 5 \cdot 9}$

$$\frac{5}{7 \cdot 9 \cdot 81} \frac{7}{11 \cdot 13 \cdot 729} \text{ \&c. c'est ainsi}$$

que quelques Géomètres l'ont employée pour en tirer des approximations. Mais en comparant les avantages & les désavantages de cette expression, on remarquera bientôt que cette préparation ne fait que la rendre moins commode ; en effet, dans ces sortes de calculs on doit bien moins chercher à sommer un petit nombre de termes qu'à le faire très-commodément, dût-on en employer beaucoup davantage. Aussi cette raison a-t-elle fait donner la préférence à la première suite, quoiqu'il y faille prendre le double de termes que dans la dernière pour arriver au même degré

d'exactitude, car cela est abondamment compensé par la facilité des opérations. On voit en effet qu'ayant une fois la valeur de  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ , en autant de décimales ou quelque peu plus qu'on en veut employer dans son approximation, il n'y a qu'à diviser cette valeur par 3, & le quotient qui en résulte par 3, & puis le nouveau quotient encore par 3, & ainsi de suite; après quoi reprenant chacun de ces quotiens, à commencer au premier qu'a donné la division de  $\sqrt{\frac{1}{3}}$  par 3, le diviser encore par 3, ensuite le second quotient trouvé ci-devant par 5, le suivant par 7, &c. & ainsi jusqu'à ce que dans le nombre de chiffres auquel on s'est fixé, il n'y ait plus que des zéros. Alors prenant la somme de tous les termes positifs & celle de tous les négatifs, ôtant enfin celle-ci de la première, le restant est la douzième partie de la circonférence. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire

de donner un exemple de ce procédé, qui doit paroître assez clair après ce qu'on vient de dire.

XVIII. Ces moyens d'approximations, incomparablement plus abrégés que ceux des anciens par les polygones inscrits & circonscrits, ont mis les modernes en état de laisser ceux-ci bien loin derrière eux. La proportion de *Ludolph*, si renommée avant la naissance de la nouvelle Géométrie, n'est plus qu'une petite partie de celle dont nous sommes aujourd'hui en possession. Voici par quels degrés elle s'est élevée à l'immense nombre de *M. de Lagny*.

*A. Sharp*, Géometre Anglois, en employant la méthode précédente, la poussa jusqu'à 74 chiffres ; il a communiqué le procédé de son travail dans ses *Tables mathématiques*. *M. Machin*, de la Société Royale de Londres, l'a prolongée jusqu'à 100 termes ; j'ignore à la vérité dans quel ouvrage, mais c'est

M. Euler qui nous l'apprend (a). M. de Lagni enfin enchérissant sur eux, l'a continuée jusqu'à 127; il a fait plus, il l'a vérifiée en calculant la même suite par deux voies différentes (b), & elles lui ont donné le même résultat. Nous sçavons par là que si le diamètre est l'unité suivie de 126 zéros, la circonférence est plus grande que le nombre suivant; 3, 14159, 26535, 89793, 23846, 26433, 83179, 50288, 41971, 69399, 37510, 58209, 74944, 59230, 78164, 06286, 20899, 86280, 34825, 34211, 70679, 82148, 08651, 32723, 06647, 09384, 46, & qu'elle est moindre que ce même nombre augmenté de l'unité.

XIX. Mais quelque commode que soit la méthode expliquée dans l'article XVII, du moins si nous la comparons au

(a) Mém. de Pétersbourg, t. 9.

(b) Mém. de l'Acad. 1719.

procédé laborieux des anciens, on ne peut cependant se dissimuler qu'elle n'avoit pas encore atteint la perfection lors même qu'on en faisoit un si grand usage ; car la suite employée par M. M. *Sharp, Machin & de Lagny*, a un défaut qui en diminue beaucoup le mérite. Ce défaut consiste dans cette immense extraction de racine qui doit servir de préliminaire au calcul, à cause de l'expression irrationnelle  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ , qui multiplie toute la suite. D'un autre côté si l'on emploie celle de  $45^\circ$ , elle ne converge pas sensiblement. Néanmoins il falloit nécessairement opter entre l'une ou l'autre : car ce sont les plus simples de celles qu'on pouvoit employer, toutes les tangentes rationnelles qui ne surpassent pas le rayon, n'appartenant point à des arcs commensurables à la circonférence, & toutes celles qui appartiennent à de petites portions commensurables de cette circonférence étant extrêmement compli-

quées d'irrationalités. M. Euler a cherché à donner à cette méthode ce degré de perfection qui lui manquoit, & il y a réuffi des deux manières que je vais exposer.

XX. La premiere a pour objet de délivrer la fuite de l'arc par la tangente, de l'irrationalité qui en rend le calcul si incommode; elle est fondée sur une propriété des tangentes au cercle qui donne cette analogie: *comme la différence du rectangle de deux tangentes avec le quarré du rayon, est à ce quarré, ainsi la somme des tangentes à la tangente de la somme des arcs.* Il en conclut que l'arc de  $45^\circ$ , le seul commensurable à la circonférence, & ayant en même tems une tangente rationnelle, se peut diviser en deux arcs dont les tangentes sont aussi rationnelles; & comme elles seront chacune moindre que l'unité, elles donneront pour leur arc correspondant deux suites toutes rationnelles & fort convergentes. Il est

bien vrai que l'arc que chacune exprimera, considéré à part, sera incommensurable avec la circonférence, mais cela n'importe en rien, puisque leur somme sera commensurable avec elle. Nommant ainsi la tangente de  $45^\circ = 1$ , & les deux tangentes cherchées  $\frac{1}{a}$ ,  $\frac{1}{b}$ , on a, suivant le théorème précédent,  $1 = \frac{a+b}{ab-1}$ , & de là  $b = \frac{a+1}{a-1}$ , ce qui donne 2 & 3 pour les moindres & les plus simples valeurs de  $a$  &  $b$ ; un de ces deux arcs sera donc

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \frac{1}{9 \cdot 2^9}, \&c.$$

& le second sera

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} - \frac{1}{7 \cdot 3^7} + \frac{1}{9 \cdot 3^9}, \&c.$$

& conséquemment l'arc entier de  $45^\circ$  sera égal à la somme de ces deux suites.

On pourroit, par le même artifice,

réduire chacune ou celle qu'on voudroit de ces deux suites en deux autres qui seroient encore plus convergentes. Ainsi l'arc dont la tangente est  $\frac{1}{2}$ , se partage de nouveau en deux autres, dont elles sont  $\frac{1}{3}$  &  $\frac{1}{7}$ ; mais cela est inutile, & deviendroit même plus nuisible qu'avantageux: car dans le calcul de la seconde suite on auroit à diviser continuellement par 49, ce qui est moins facile que deux divisions par un nombre simple. Les deux premières remplissent presque tout l'objet qu'on peut se proposer: car je remarque, ce qui est essentiel, que l'invention de chacun de ces termes est peu laborieuse, à quelque nombre de décimales qu'on veuille les pousser; la raison en est qu'on rencontrera le plus souvent des nombres dont les chiffres seront ou continuellement les mêmes, comme  $\frac{1}{3} = 0.33333$ , &c.  $\frac{1}{4} = 0.250000$ , &c. ou qui reviendront après certaines périodes; ainsi le seul travail du calcul consistera presque à ajouter



les termes correspondans des deux

suites  $\frac{1}{3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^5} - \frac{1}{3^7}$ , &c.

$\frac{1}{2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5}$ , &c. & à les diviser

ensuite successivement par 3. 5. 7. 9.

11. &c. il faudra de ces termes environ

autant qu'on aura dessein d'employer

de chiffres dans l'approximation. Si

quelqu'un la vouloit pousser à 150

décimales, il y parviendroit avec beau-

coup moins de peine qu'il n'en a coûté

à M. de Lagny pour le faire jusqu'à

127.

XXI. Le second desavantage, non

seulement de la suite  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ , &c.

& des autres qui appartiennent au cer-

cle, mais encore de la plupart de celles

qu'on emploie dans la Géométrie mo-

derne, est d'être assez souvent trop peu

convergentes. Elles ne sont plus dès

lors d'un usage commode, & cet in-

convénient les rendroit inutiles dans

un grand nombre de cas, si l'on n'é-

toit parvenu à y remédier. Quelques

Géometres se font appliqués à donner à la méthode des suites cette perfection essentielle. Je n'ai point encore pû voir le traité *de Summatione & interpolatione serierum* de M. *Stirling*; il doit contenir d'excellentes choses à cet égard. Ce que j'en vais dire est tiré des sçavans Mémoires de M. *Euler* (a), & du livre de M. *Simpson*, *The doctrine and applications of fluxions*, &c. (b).

Soit 1°. la suite  $t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$ , &c.

ou en faisant  $t = \frac{x}{p}$ , celle-ci  $\frac{x}{p} - \frac{x^3}{p^3} + \frac{x^5}{p^5} - \frac{x^7}{p^7}$ , &c. qu'on a vû désigner

l'arc de cercle, dont la tangente est  $t$  ou  $\frac{x}{p}$ . Il faut d'abord avoir ajouté un certain nombre de termes du commencement de cette suite; plus on en aura, plus exacte sera l'approximation

(a) *Comm. Acad. Petrop. ann. 1737, t. 9, & t. 8, ad ann. 1736.*

(b) *Part. II, sect. 7.*

qu'on tirera de l'expression suivante. Nommons, pour abrégé,  $S$  la somme de ces premiers termes,  $n$  leur nombre, &  $2n - 1 = r$ , enfin  $1 + pp = m$ , on aura alors, suivant les principes de M. Euler, la somme entiere

$$\begin{aligned}
 & \text{re de la suite égale à } S + \frac{1}{p'} \left( \frac{1}{m r} \right. \\
 & \frac{2 p^2}{m^2 r^2} + \frac{2^2 p^4 - p^2}{m^3 r^3} - \frac{2^3 p^6 - 4 p^4 + p^2}{m^4 r^4} \\
 & \left. + \frac{2^4 p^8 - 11 p^6 + 11 p^4 - p^2}{m^5 r^5} - \dots \&c. \right)
 \end{aligned}$$

Ainsi l'on réduit la sommation d'une suite qui ne converge presque pas sensiblement à celle d'une autre qui converge fort vite, & l'on transforme une suite qui est déjà convergente en une autre qui l'est en quelque maniere infiniment plus. On abrège donc par là considérablement le calcul dans tous les cas. Pour en donner un exemple, je vais choisir le plus desavantageux, celui où la tangente étant l'unité, la suite est  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}, \&c.$  Suivant la

méthode de M. Euler, les six premiers termes suffiront pour prévenir une erreur d'une 1000000<sup>e</sup>; or ces six premiers termes ajoutés ensemble font 0.744012, & en employant la formule, on a  $p = 7$ ; &  $1 + pp = 2$ ;  $2n - 1 = 11$ ; de manière qu'on a à ajouter pour complément de cette

somme,  $\frac{1}{2 \cdot 11} = \frac{2}{4 \cdot 121} + 0 + \frac{1}{11^2}$

$+ 0 = \frac{8}{11^6}$ , ce que deviennent les

six premiers termes de la seconde suite

multipliés par  $\frac{1}{p^r}$ , ou 1. Ces termes

réduits en fractions décimales, sont

0.041386, qui ajoutés à 0.744012,

donnent pour grandeur de l'arc de 45<sup>o</sup>,

ou pour celle du quart de cercle, com-

paré au carré du rayon, 0.785398,

d'où on tire la raison du diamètre à la

circonférence 1 : 3.141592, expression

qui est conforme dans ces sept chiffres

avec celle de Ludolph. Il auroit fallu

environ

∞ termes, de la suite  $1 - \frac{1}{2}$   
 $+ \frac{1}{3}$ , &c. pour trouver une approxi-  
 mation aussi exacte: on doit juger par  
 là de la justesse de celles que donnera  
 la même méthode appliquée à des suites  
 déjà médiocrement convergentes.

La serie suivante, qui a le même ob-  
 jet que celle qu'on vient de voir, est dûe  
 à M. *Simpson*: elle a quelque avantage  
 sur l'autre, en ce qu'elle est plus aisée  
 à continuer, la loi de la progression  
 des coefficients étant plus apparente. Je  
 conserve ici les mêmes dénominations  
 que dans la premiere formule que j'ai  
 déjà donnée, à cela près que  $r$  sera  
 $= 2n + 1$ , &  $m = 1 + tt$ ; alors  
 on a, suivant M. *Simpson*, pour la  
 valeur très-convergente de la suite

$z - \frac{z^3}{3}$ , &c. cette formule  $S + \frac{z^r}{r m}$

$$\left( 1 + \frac{2. z^2}{r + 2. m} + \frac{2. 4. z^4}{r + 2. r + 4. m^2} \right.$$

$$+ \frac{2. 4. 6. z^6}{r + 2. r + 4. r + 6. m^3}$$

H

$$+ \frac{2. 4. 6. 8. 2^8}{r + 2. r + 4. r + 6. r + 8. m^4}$$

+ &c. ). Le signe ambigu  $\pm$  signifie qu'il faut ajouter si le premier terme qui suit ceux qu'on a renfermés dans la somme  $S$  est positif; il faudra soustraire s'il est négatif. Cette méthode égale la précédente en exactitude. En l'appliquant à  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$ , &c. six termes seulement de cette suite, joints aux six premiers de la seconde, donnent, comme ci-devant, l'expression 0. 785398 pour la valeur du quart de cercle, le carré du rayon étant 1.

La plupart des autres suites qu'on peut employer pour trouver l'aire du cercle, sont susceptibles d'abréviations semblables. Mais il seroit trop long d'en exposer ici la théorie générale, qui dépend de celle de la sommation des suites. Le simple historique auquel on s'est borné ne permet pas d'entrer dans ces détails, & l'on se contentera

d'avoir indiqué les livres où on peut les trouver.

XXII. Les suites infinies fournissent enfin des moyens commodes pour trouver des constructions géométriques ou des expressions analytiques, qui représentent, à très-peu de chose près, des espaces ou des arcs circulaires; car on peut combiner de telle manière deux grandeurs, que la suite dans laquelle elles se résoudreont, coïncide dans ses premiers termes avec celle qui représente la valeur de cet arc, ou cet espace circulaire qu'on veut réduire en ligne droite ou en figure rectiligne. En prenant donc cette première suite, ou la grandeur finie qu'elle exprime, pour la dernière, on aura fort près la valeur de celle-ci, puisque ce moyen en donne non seulement les premiers termes, mais encore une partie de tous les autres. Les exemples suivans, dont quelques-uns sont

tirés des Lettres de *Newton*\*, & de son Traité des fluxions, vont éclaircir cela. Et ce qu'on y exécute sur le cercle, peut commodément se pratiquer dans une infinité d'autres cas & sur d'autres courbes, dont on a quelquefois besoin de calculer l'aire approchée avec plus de promptitude que de précision.

Qu'on veuille donc trouver l'arc, la corde étant donnée. On sçait que celui-

là étant  $z$ , la corde est  $z - \frac{z^3}{4 \cdot 6 \cdot r^2}$

+  $\frac{z^5}{4 \cdot 4 \cdot 120 \cdot r^4} - \&c.$  nous la nom-

merons  $A$ ; soit  $B$  la corde de la moi-

tié de cet arc, elle est  $\frac{1}{2}z - \frac{z^3}{4 \cdot 8 \cdot 6 \cdot r^2}$

+  $\frac{z^5}{4 \cdot 4 \cdot 32 \cdot 120 \cdot r^4} - \&c.$  Si l'on com-

bine ces deux grandeurs en ôtant la première de huit fois la seconde, le restant sera très-prochainement égal à trois

\* Voyez *Comm. Epist. p. 56* & *suiv.*



fois l'arc, car huit fois  $B = 4 \varepsilon$

$$- \frac{\varepsilon^3}{4 \cdot 6 \cdot r r} + \frac{\varepsilon^5}{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 120 r^4}, \text{ \&c.}$$

dont ôtant  $A$ , le reste est  $3 \varepsilon - \frac{\varepsilon^5}{21760}$

- &c. Or comme ces derniers termes

sont très-petits, pour peu que  $\varepsilon$  soit

moindre que l'unité, il s'ensuit qu'on

peut les négliger entièrement, & que

$8B - A = 3 \varepsilon$ . Il est donc vrai,

comme *Huygens* l'a démontré, que huit

fois la corde de la moitié d'un arc

moins la corde de l'arc entier, égalent

trois fois l'arc, ou que huit fois la corde

d'un arc moins celle de l'arc double,

diffèrent très-peu du sextuple de cet arc.

On peut encore dire que quatre fois

la corde moins le sinus d'un arc, sont

égales, à une très-petite différence près,

à cet arc triplé.

On trouve de même que si l'on pro-

longe le diamètre  $BA$  (*fig. 21*) de la

quantité  $AE = CB - \frac{1}{5} BF$ , l'arc

$BG$  excède très-peu le segment de

la tangente  $BH$ , coupé par la ligne  $EGH$ . Cette proposition démontre la vérité de celle de *Snellius*, qui faisant  $eA =$  au rayon, disoit que  $BH$  étoit moindre que l'arc  $BG$ . Cette dernière est vraie à plus forte raison, car la ligne  $Ae$  étant toujours plus grande que  $AE$ , la ligne  $Bb$  est nécessairement moindre que  $BH$ . Mais de cela même il est aisé de conclurre que  $BH$  approche bien plus près de la légitime valeur de  $BG$  que  $Bb$ , qui cependant, comme nous l'avons fait voir, en est très-peu éloignée.

Quand on a la grandeur d'un arc, il est fort facile de trouver l'aire du secteur ou du segment: ainsi les méthodes précédentes pourroient suffire à cet objet. Cependant comme on peut le faire immédiatement, en voici quelques moyens que nous fournit *M. Newton* dans les endroits cités. Le segment  $BGF$  étant proposé, on pourra prendre pour sa valeur l'expres-

sion  $\frac{2}{3} BG + GF \times \frac{2}{15} BF$ . Mais si l'on veut une plus grande exactitude, qu'on divise  $BF$  en deux également au point  $I$ , alors le rectangle  $4GI + BG \times \frac{2}{15} BF$  approchera tellement de la valeur exacte du segment  $BFG$ , que lors même qu'il deviendra le quart de cercle, il s'éloignera à peine de la vérité d'une 1500<sup>e</sup> partie de l'aire totale.

M. *Leibnitz*, dans une de ses Lettres à *Newton*, a donné cette expression pour trouver l'arc, le cosinus étant connu : que le rayon soit l'unité, &  $c$  ce cosinus, l'arc sera  $\sqrt{6 - \sqrt{2+c} + 12}$ . Ici l'erreur, selon la remarque de M. *Newton*, étant  $\frac{v^3}{90} + \frac{v^4}{194}$ , &c. la lettre  $v$  désignant le sinus versé, ou  $1 - c$ , elle sera fort petite quand  $v$  sera moindre que le tiers du rayon. Cette condition est nécessaire pour l'employer avec quelque sûreté ; il y en

aura davantage à se servir de la suivante, dûe à M. *Newton*.  $v$  étant toujours le sinus versé, qu'on fasse comme  $120 - 27v$  à  $120 - 17v$ ; ainsi la corde  $\sqrt{2v}$  a une quatrième proportionnelle, elle approchera si près de l'arc correspondant, que l'erreur sera seulement d'environ  $\frac{61 v^3 \sqrt{2v}}{44800}$ ,

ce qui égalera à peine cinq secondes lorsque l'arc ne surpassera pas  $45^\circ$ , & sera même moindre qu'une seconde s'il n'étoit que de  $30^\circ$ .

Après avoir exposé les découvertes de ces grands hommes, qui semblent ne rien laisser à désirer sur ce sujet, me sera-t-il permis de faire part d'une méthode qui m'a paru commode pour déterminer par approximation la valeur de ces différens espaces, ou arcs circulaires? Elle est fondée sur un certain moyen de trouver la somme approchée des suites qui les expriment;

moyen que j'ai autrefois appliqué, avec quelques changemens, à former des regles pratiques & exactes pour toiser les surfaces des voûtes *en cul de four, surhaussées* ou *surbaisées*; c'est-à-dire, pour m'énoncer en termes plus intelligibles aux Géometres, des sphéroïdes allongés & aplatis. Car on sçait, pour peu qu'on ait passé les bornes de la Géométrie ordinaire, que les surfaces de ces corps suivent le même rapport que des espaces elliptiques ou hyperboliques. Soit donc un segment circulaire *BGF* (*fig. 21*) dont l'abcisse est  $x$ , le diametre l'unité; on a vû qu'il se réduit à la suite  $\sqrt{x} \times (\frac{2}{3} x - \frac{1}{5} x^2 - \frac{1}{28} x^3 - \frac{1}{72} x^4 - \frac{1}{576} x^5, \&c.)$  Pour en trouver la somme approchée, je cherche une expression qui se resolve en une suite à peu de chose près égale à celle-là; je la suppose  $\frac{2}{3} x \sqrt{x - nxx}$ , & l'ayant développée en suite, j'ai  $\sqrt{x} \times (\frac{2}{3} x$   
H y

$$- \frac{1}{3} n x^2 - \frac{1}{12} n^2 x^3 - \frac{1}{24} n^3 x^4$$

$$- \frac{1^0}{3 \cdot 8 \cdot 16} n^4 x^5, \&c.)$$

Je remarque enfin que si je donne à  $n$  une telle valeur que les seconds termes de chaque suite soient égaux, ce qui suffira si  $x$  n'est qu'une petite partie du diamètre, alors on aura les deux premiers termes avec une partie de chacun des suivans; & par conséquent à peu de chose près, la somme de la suite. Afin donc de déterminer  $n$ , j'égale les deux premiers termes d'où je tire  $n = \frac{2}{3}$ , ainsi l'expression  $\frac{2}{3} x \sqrt{x - \frac{2}{3} x x}$ , fera la valeur approchée du segment circulaire, quand son abcisse ne passera pas le quart ou les  $\frac{2}{3}$  du diamètre. En effet, mettant à la place de  $n$  & de ses puissances, leurs valeurs dans la suite donnée ci-dessus, elle se réduit à  $\sqrt{x} x (\frac{2}{3} x - \frac{1}{3} x^2 - \frac{2}{300} x^3 - \frac{27}{3000} x^4, \&c.$  dont la différence avec la première n'est que  $0 - 0 + \frac{1}{210} x^3 + \frac{1}{205} x^4, \&c.$  Lors donc que  $x$  fera seulement

$\frac{1}{4}$ , cette différence ne montera qu'à  $\frac{1}{13440} + \frac{1}{52480} + \dots$  ce qui sera une très-petite valeur.

Mais quand il s'agira de sommer un segment dont l'abcisse sera plus grande qu'un quart du diamètre, alors il faudra faire en sorte que les troisièmes termes des deux suites soient égaux entr'eux, ce qui rendra la dernière beaucoup plus approchante de la première, pourvu qu'on ait l'attention de ne pas négliger la différence qui se trouvera alors entre les deux seconds termes. Comparons donc & égalons

$\frac{1}{12} n^2 x^3$  à  $\frac{1}{28} x^3$ , on tire de là  $n = \sqrt{\frac{3}{7}}$ ; cette valeur substituée dans la seconde suite, la transforme en celle-ci :

$$\sqrt{x} \times \left( \frac{2}{3} x - \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3}{7}} x^2 - \frac{3}{7 \cdot 12} x^3 - \frac{3}{7 \cdot 24} \sqrt{\frac{3}{7}} x^4 - \frac{90}{24 \cdot 16 \cdot 21} x^5 \dots \right),$$

dont la différence avec celle qui exprime l'aire du segment, est  $\sqrt{x} (\pi 0$

$$+ \sqrt{\frac{1}{21}} - \sqrt{\frac{1}{21}} x^2 + 0 - \frac{1}{495} x^4$$

—  $\frac{1}{382} x^5$  — &c.) de là il suit qu'ajou-

tant à l'expression  $\frac{2}{3} x \sqrt{x} - \sqrt{\frac{3}{7} x x}$ ,

la valeur de  $\sqrt{\frac{1}{21}} - \sqrt{\frac{1}{25}} x^2$ , on aura, à peu de chose près, la somme de la suite qui exprime la grandeur du segment *BGF*. Et en effet, lorsque  $x$  deviendra égale au rayon ou à  $\frac{1}{2}$ , puisque le diamètre est 1, la différence fera seulement  $\frac{1}{11314} + \frac{1}{17480} +$  &c. mais tous ces termes & les suivans ne peuvent faire, comme l'on voit, qu'une très-petite quantité. Cette différence seroit encore beaucoup moindre si la grandeur d' $x$  n'étoit que de  $\frac{1}{3}$  ou  $\frac{1}{4}$ ; on pourra donc prendre pour celle d'un segment circulaire quelconque dont l'abscisse est  $x$ , le diamètre l'unité, on pour-

ra, dis-je, prendre  $\frac{2}{3} x \sqrt{x} - \sqrt{\frac{3}{7} x x}$

+  $\sqrt{\frac{1}{21}} - \frac{1}{5} x^2$ , ou  $\frac{2}{3} x \sqrt{x} - 0.654 x x$

+  $0.019. x x$ .

On peut traiter de même l'expres-



fon  $x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152},$

&c. qui exprime l'aire du segment circulaire  $CBED$  (fig. 19), l'abscisse étant prise à compter du centre ; car réduisant en suite l'expression indéterminée

$x\sqrt{1-nxx}$ , puis comparant le troisième terme  $\frac{n^2x^5}{8}$  au troisième de la

première  $\frac{x^5}{40}$ , on trouve  $\frac{1}{3} = n^2$ , &

alors la grandeur  $x\sqrt{1-\sqrt{\frac{1}{3}}xx}$ ,

ou  $x\sqrt{1-0.429xx}$ , en lui ajoutant

$\sqrt{\frac{1}{20}} - \frac{1}{6}x^3$  fera très-prochainement

égale au segment cherché, car

cette expression développée en suite,

est  $x - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{3}}x^3 - \frac{1}{40}x^5 - \frac{1}{80}\sqrt{\frac{1}{3}}x^7$

$- \frac{1}{640}x^9$ , &c.

Or cette suite ne diffère de la précédente que de l'excès du second terme

$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{3}}x^3$  sur  $\frac{1}{6}x^3$ , (c'est pourquoi

nous l'ajoutons à l'expression proposée), & de la quantité  $-\frac{1}{108}x^7$ .

—  $\frac{1}{359} x^9$  — &c. Conséquemment lorsque  $x$  ne sera que la moitié ou les deux tiers du rayon, cette dernière quantité s'évanouira presque, à cause de la hauteur des puissances des termes  $x^7$ ,  $x^9$  & les suivans; car dans le premier cas elle se réduira à  $\frac{1}{37424} + \frac{1}{183808} +$  &c. du rectangle de l'abscisse par le rayon.

Il est facile d'appercevoir qu'on pourroit sans peine approcher davantage de l'exactitude en suivant le même procédé, c'est-à-dire en déterminant  $n$  par le moyen d'un terme plus éloigné de la suite, & puis ajoutant ou retranchant la différence des seconds ou troisièmes termes de la nouvelle suite avec ceux de la première. Car à mesure que deux termes plus éloignés de ces suites viennent à coïncider, elles se rapprocheront davantage l'une de l'autre dans les termes qui viendront après; & comme les différences des coefficients de ces termes ne peuvent manquer d'être

des fractions, parce qu'eux-mêmes sont nécessairement des fractions, qu'elles affecteront des termes où l'indéterminée  $x$  est déjà élevée à une haute puissance, cela rendra nécessairement la valeur de toutes ces différences peu considérable, & même insensible dans bien des cas.

Ces diverses expressions, comme aussi les suites extrêmement convergentes qui donnent le sinus, la tangente, &c. par l'arc, peuvent être fort utiles dans certaines circonstances. Un Astronome qui dans des pays éloignés seroit privé de ses tables par quelque accident, se verroit sans ce secours absolument déconcerté; avec celui que lui présentent ces inventions, il pourroit continuer ses calculs, & tirer les résultats de ses observations. Plusieurs Auteurs ont traité de ces moyens de se passer des tables, entr'autres *Snellius*, dans sa *Cyclométrie*; *M. Huygens*, dans le traité de *Circuli magnitudine inventa*; *M. Leibnitz*,

dans un écrit inséré dans les Actes de Leipzig, sous le titre de *Trigonometria canonica à tabularum necessitate liberata* (a), & plusieurs autres.

XXIII. Je ne sçaurois passer sous silence l'ingénieuse méthode pour la quadrature approchée des courbes, dont M. *Newton* a donné la première idée dans son traité intitulé *Methodus differentialis*. Elle consiste à déterminer, par le moyen de plusieurs ordonnées connues, & également ou inégalement distantes entr'elles, (b) de la courbe proposée, l'équation d'une autre courbe de genre parabolique qui passe par toutes leurs extrémités. On appelle ici courbes de genre parabolique celles qui ont une équation de cette forme,  $a + bx$

(a) Année 1692.

(b) On s'est borné ici au cas où les ordonnées sont également distantes entr'elles, la solution étant considérablement compliquée dans celui où leurs distances entr'elles sont inégales.

$+ cx^2 + dx^3$ , &c. parce que ce sont en effet des paraboles de genre supérieur, comme on le voit dans l'énumération des courbes du troisième ordre, donnée par M. *Newton*. Or comme une courbe de cette nature est toujours absolument quarrable, qu'elle serre de très-près la courbe proposée, & d'autant plus qu'elle passe par les extrémités d'un plus grand nombre d'ordonnées, il s'ensuit qu'on aura, en la quarrant, l'aire approchée de la première.

L'étendue & l'objet de cet écrit ne me permettent pas de développer ici les propositions fondamentales dont *Newton* fait usage pour parvenir à la solution de ce problème. Je me contenterai de présenter cette solution elle-même, & j'indiquerai un moyen simple & lumineux de s'assurer de son exactitude.

Soit donc donné le nombre & la grandeur de plusieurs ordonnées éga-

lement distantes entr'elles,  $A, B, C, D, E$ ; nous supposons ici qu'il y en a 5; on prendra leurs premières différences  $A - B, B - C, C - D, D - E$ , qu'on écrira avec les signes qui leur conviennent, suivant qu'elles se trouveront positives ou négatives, le terme à soustraire pouvant être plus ou moins grand que celui dont on doit le retrancher. Nous nommerons, pour abrégé, ces premières différences  $a, b, c, d$ ; on prendra ensuite les différences de celles-ci,  $a - b, b - c$ , &c. que nous appellerons encore pour simplifier  $a', b', c'$ : soient encore les différences de ces dernières, prises dans le même ordre,  $= a'' b''$ , & la dernière  $a'' - b'' = a'''$ ; cela fait, soit toujours  $m$  l'ordonnée du milieu, qui est ici  $C$ . Qu'on nomme  $p$  la moyenne arithmétique entre les deux différences moyennes. (voy. fig. 22)

$b$  &  $c$ ; soit  $b' = q$ ;  $\frac{a'' + b''}{2} = r$ ,  
 $a''' = f$ , & ainsi de suite, si le nombre

des ordonnées eût été plus grand. Ici  $f$  est le dernier terme, & quelquefois, suivant la nature de la progression des ordonnées, la suite des différences se terminera plutôt : mais cela ne jettera aucune difficulté dans la solution ; les termes qui manqueront seront simplement réputés 0.

Après cette première préparation il faut multiplier de suite les termes de cette progression  $1 ; x ; \frac{x}{2} ; \frac{x^2 - 1}{3x} ; \frac{x}{4} ; \frac{x^4 - 4}{5x} ; \frac{x}{6}$ , &c. par eux-mêmes continûment, c'est-à-dire d'abord le premier par lui-même, puis le premier & le second, ensuite les trois premiers, &c. cela donnera la suite des produits  $1 ; x ; \frac{x^2}{2} ; \frac{x^3 - x}{3x} ; \frac{x^4 - xx}{24}$ , &c. qu'on multipliera respectivement par  $m. p. q. r. s$ , &c. Ces produits, liés par le signe  $+$ , feront la valeur de l'ordonnée correspondante à l'abscisse  $x$  ; ainsi l'équation de la courbe

sera  $m + px + q \frac{x^2}{2} + r \frac{x^3}{6}$   
 $+ \int \frac{x^4 - xx}{24}$ . Il faut remarquer qu'a-

lors les abscisses  $x$  prennent leur origine au point  $F$ , qu'elles s'étendent positivement de  $F$  vers  $H$ , & négativement de  $F$  vers  $b$ ; c'est-à-dire que la valeur de  $x$  est positive pour la partie de la courbe  $FGIH$ , & qu'elle doit être négative pour la partie contraire, suivant les règles si connues aujourd'hui de l'analyse des courbes. Ainsi, pour avoir l'ordonnée  $po$ , il faudroit, dans l'équation précédente, changer les signes de toutes les puissances impaires de  $x$ .

Il est aisé de s'assurer, par la méthode suivante, de la justesse de la solution qu'on vient de voir; il n'y a qu'à examiner si lorsque les abscisses deviennent  $o$ ,  $FQ$ ,  $FH$ ,  $fq$ ,  $fb$ , il en résulte les ordonnées  $FG$ ,  $QR$ ,  $HI$ ,  $gr$ ,  $bi$ . A l'égard de la première cela est évident, car quand  $x = o$ , il ne reste pour la valeur de l'expression que



le premier terme  $m$ , qui est égal à l'ordonnée moyenne  $C$  ou  $FG$ . Pour démontrer les autres cas, il faut développer les différences que nous avons désignées par des lettres simples; ce procédé nous donnera pour les premières  $A - B$ ;  $B - C$ ;  $C - D$ ;  $D - E$ ; & le coefficient  $p =$  à la moyenne entre les deux du milieu  $= \frac{B - D}{2}$ . Les secondes différences seront  $A - 2B + C$ ;  $B - 2C + D$ ;  $C - 2D + E$ ; dont la moyenne est  $B - 2C + D$ , qui est  $q$ . Les troisièmes différences sont  $A - 3B + 3C - D$ ;  $B - 3C + 3D - E$ . Et la quatrième  $A - 4B + 6C - 4D + E$ . Ici nous remarquerons en passant que les coefficients de ces expressions sont toujours ceux du binôme  $a + b$ , élevé à la puissance dénotée par le rang de la différence. Faisons à présent  $x = 1$  ou  $FQ$ , l'équation se réduira à  $P_0$  ou  $x = m + p + \frac{q}{2}$ ; & si au lieu de

*m. p. q.* on met leurs valeurs trouvées ci-dessus, elle deviendra  $C + \frac{B-D}{2}$   
 $+ \frac{B-2C+D}{2} = B$ , c'est-à-dire la valeur de *QR*. Qu'on fasse  $x = -2$  ou *fb*, on aura  $y = m - 2p + 2q - r + \frac{1}{2}s$ , où mettant au lieu de *m. p. q. r. s* leurs valeurs en *A. B. C. D. E.* tout se réduit à  $y = E$ , ou *HI*. Il en sera de même si on donne à *x* les autres valeurs *fq* ou *Fb*, c'est-à-dire qu'il en résultera les ordonnées *qr, hi*; ainsi la courbe passe par les sommets de toutes ces ordonnées.

Il n'a encore été question que du cas où les ordonnées sont en nombre impair; quand ce nombre sera pair, par ex. *A. B. C. D*, on prendra, comme à l'ordinaire, leurs premières, secondes, troisièmes différences, jusqu'à la dernière (*voy. fig. 23*); on nommera *m* la moyenne arithmétique entre les deux du milieu, *p* la différence *b* ou

$B - C$ ,  $q$  la moyenne entre  $a'$ ,  $b'$ , enfin  $a''$  sera appelée  $r$ . On multipliera ensuite, comme ci-dessus, les termes

suivans,  $1; x; \frac{4xx-1}{4 \cdot 2x}; \frac{x}{3}; \frac{4xx-4}{4 \cdot 4x};$

$\frac{x}{5}; \frac{4xx-9}{4 \cdot 6x};$  &c. & leurs produits

successifs étant affectés des coefficients

$m. p. q. r. s.$  &c. donneront  $m + px$

$+ \frac{4qxx-q}{4 \cdot 2} + \frac{4rx^3-rx}{12 \cdot 2},$  &c.

pour l'équation cherchée de  $y$ , qui ne comprend ici que ces quatre premiers termes, parce que tous ceux au-delà de  $r$  sont  $= 0$ . Ici l'origine des abscisses est toujours le point qui partage en deux également l'intervalle des deux ordonnées moyennes, & elles s'étendent positivement vers  $H$ , & négativement dans le sens contraire.

Rien à présent n'est plus aisé que de trouver l'aire entière de la courbe qui passe par les points  $i, r, G, R, I$ ; il suffit d'être initié dans le calcul intégral pour voir qu'il faut multiplier la

somme des ordonnées  $PO$ ,  $po$  par  $dx$ , & intégrer comme à l'ordinaire; car multipliant  $PO$  par  $dx$ , cela est visible à l'égard du segment  $FGOP$ . Mais il semble qu'on devroit multiplier  $po$  par  $-dx$ , car  $fp = -x$ ; cependant comme par ce moyen l'aire  $FGop$  paroîtroit sous une forme négative, & que néanmoins elle doit être ajoutée positivement à la première, il faudroit changer ses signes avant l'addition. Or la multiplication de  $po$  par  $dx$ , & non par  $-dx$ , produit précisément cet effet de changer les signes, ainsi il n'y a qu'à prendre la somme de  $PO$ ,  $po$  & la multiplier par  $dx$ , son intégrale sera l'aire  $OPpo$ ; & quand  $FP$  sera faite  $= FH$ , cette intégrale sera l'aire entière  $HIGib$ .

Prenons à présent le cas des cinq ordonnées; en changeant les signes des termes où sont les puissances impaires de  $x$ , dans la valeur  $PO$ , ce qui donne la valeur de  $po$ , & les ajoutant ensemble,

semble, nous aurons  $PO + p_0 = 2m$

$$+ q x^2 + \frac{f x^4 - f x^2}{12}. \text{ On peut remar-}$$

quer ici que tous les termes affectés des différences premières, troisièmes, cinquièmes, &c. s'évanouissent, & qu'il ne s'agit que de doubler les autres, ce qui facilitera beaucoup cette opération; cela est également vrai dans le cas des ordonnées en nombre pair. Enfin cette expression multipliée par  $dx$  &

$$\text{intégrée, devient } 2 m x + \frac{q x^3}{3} + \frac{f x^5}{60}$$

$$- \frac{f x^3}{36}. \text{ Il ne reste donc qu'à faire } x=2,$$

& l'on aura pour l'aire cherchée  $4 m$

$$+ \frac{8}{3} q + \frac{32}{60} f - \frac{8}{36} f \text{ égal à } 4 x (m + \frac{2}{3} q + \frac{8}{60} f - \frac{1}{18} f).$$

On trouvera, par un moyen semblable, que dans le cas des quatre ordonnées l'intégrale est  $3 x (m + \frac{2}{24} q - \frac{1}{8} q) = 3 x (m + \frac{1}{4} q).$

Le théorème de *Newton*, présenté sous cette forme, seroit déjà d'une grande utilité pour calculer assez com-

modément les aires approchées des courbes, & sur-tout de celles qui se résolvent en suites peu convergentes, dont l'approximation est extrêmement pénible; mais ce théorème fournit encore une pratique plus commode que je vais exposer. *Newton* s'étant contenté de l'indiquer dans le dernier scholie de son traité, ce que je vais ajouter en sera une espèce de commentaire, de même que le discours précédent a pu servir à jeter quelque jour sur le reste de cet excellent traité.

Reprenons encore ici les cas des cinq ordonnées, pour lesquelles nous avons trouvé  $4 (m + \frac{2}{3} q + \frac{2}{15} f - \frac{1}{18} f)$ ; or l'on a fait voir plus haut qu'elles étoient les valeurs de  $f$  &  $q$ , en expressions où il n'entre que des ordonnées: celle de  $q$  y a été trouvée  $= B - 2 C + D$ , & celle de  $f = A - 4 B + 6 C - 4 D + E$ . On pourra donc substituer à  $m, q, f$  ces valeurs, & dans ce cas l'opération faite,

la formule ci-dessus devient  $\frac{4}{90}$   
 $(7A + 32B + 12C + 32D$   
 $+ 7E)$ , ce qui est égal à  $\frac{1}{90}(7A + E$   
 $+ 32B + D + 12C)$ , multiplié  
 par 4, ou plus généralement par l'inter-  
 valle entre la première & la dernière  
 ordonnée que nous nommerons doré-  
 navant  $R$ . On s'assurera par un sem-  
 blable procédé que lorsqu'on n'em-  
 ploiera que trois ordonnées, l'aire  
 approchée sera  $\frac{1}{8}(A + C + 4B)R$  ;  
 pour sept elle sera  $\frac{1}{840}(41A + G$   
 $+ 216B + F + 27C + E$   
 $- 272D)R$ . Nous ne pousserons pas  
 plus loin cette table pour les ordon-  
 nées impaires, parce qu'il est rare  
 qu'on ait besoin d'en employer plus  
 de sept ; d'ailleurs il est aisé d'y sup-  
 pléer dans le besoin.

La méthode n'est pas différente pour  
 les ordonnées en nombre pair. On a vû  
 plus haut que la formule pour 4 deve-  
 nait  $3(m + \frac{1}{2}q)$ , & un peu aupara-

vant on a remarqué que  $q$  étoit la moyenne entre les deux différences  $A - 2B + C$ , &  $B - 2C + D$ ,

c'est-à-dire  $= \frac{A - B - C + D}{2}$ , &

que  $m$  étoit la moyenne entre  $B, C$ ,

c'est-à-dire  $\frac{B + C}{2}$ , conséquemment

la formule se réduira à  $\frac{1}{8} (\overline{A + D}$

$+ 3 \overline{B + C})$  ou bien, en nommant encore  $R$  la portion de l'axe entre la première & la dernière ordonnée,  $\frac{1}{8}$

$(\overline{A + D} + 3 \overline{B + C}) R$  : pour fix

ordonnées on aura  $\frac{1}{288} (19 \overline{A + F}$

$+ 75 \overline{B + E} + 50 \overline{C + D}) R$ .

Nous allons enfin ranger toutes ces expressions en forme de table, pour la commodité des lecteurs qui en auroient besoin ; mais pour abrégé nous y nommerons  $A'$  simplement la somme de la première & la dernière ordonnée,  $B'$  celle de la seconde & la pénultième, &c. & dans le cas des ordonnées



impaires, la dernière lettre sera l'ordonnée du milieu. Nous avons négligé les cas où l'on n'emploieroit qu'une ou deux ordonnées, parce qu'on ne doit en attendre aucune exactitude. La première colonne perpendiculaire contient le nombre des ordonnées, à côté duquel est exprimée l'aire.

$$3 \quad \frac{1}{6} (A' + 4 B') R.$$

$$4 \quad \frac{1}{8} (A' + 3 B') R.$$

$$5 \quad \frac{1}{90} (7 A' + 32 B' + 12 C') R.$$

$$6 \quad \frac{1}{288} (19 A' + 75 B' + 50 C') R.$$

$$7 \quad \frac{1}{840} (41 A' + 216 B' + 27 C' + 272 D') R.$$

M. *Newton* ajoute, ce qui peut servir à simplifier beaucoup ces calculs, que si l'on prend le double de l'ordonnée du milieu, & que l'on joigne ensemble les ordonnées qui en sont également distantes, comme  $QR$  avec  $qr$ ,  $HI$  avec  $hi$ ; qu'enfin l'on substitue ces sommes à chacune des premières.  $QR$ ,  $HI$ , il se formera une nouvelle.

courbe  $ypoi$ , dont l'aire sera égale à celle de la première. C'est ce qui a été démontré plus haut, que pour avoir l'aire des deux parties de la courbe par une même & unique intégration, il falloit ajouter les deux ordonnées  $PO$ ,  $po$ , multiplier leur somme par  $dx$ , & qu'en intégrant ensuite, on auroit à la fois les deux aires  $POGF$ ,  $poGF$ . *M. Newton* propose encore quelques moyens propres à transformer ces courbes, mais mon dessein n'est pas ici de faire un commentaire de son traité entier; ainsi je reviens à mon objet principal, en faisant une application de cette méthode à la mesure du cercle.

Nous supposerons donc pour cet effet que le rayon est 8, & qu'il est divisé en huit parties égales, afin d'avoir cinq ordonnées dans le segment  $A E e a'$  qui répond au demi-rayon; mais ces ordonnées auront en fractions décimales les valeurs suivantes.

$Aa = 8.000000$  ;  $Bb = \sqrt{63}$   
 $= 7.937253$  ;  $Cc = \sqrt{60} = 7.$   
 $745966$  ;  $Dd = \sqrt{55} = 7.416198$  ;  
 $Ee$  enfin  $= \sqrt{48} = 6.928203$ . Ainsi la  
 somme  $Ae$  de la première  $Aa$  & de la der-  
 nière  $Ee$  fera  $14.928203$  ; celle de la 2<sup>e</sup>.  
 & la quatrième ( $Bb$ ) fera  $15.353451$  ; on  
 aura enfin  $Cc = 7.745966$ . Par consé-  
 quent les  $7A' + 52B' + 12C'$  de  
 la formule qui convient au cas des cinq  
 ordonnées, seront  $688.759445$ , ce qui  
 doit être multiplié par 4 & divisé  
 par 90. Ces opérations donneront  
 $30.611539$  pour l'aire du segment  
 $AaeE$ , ce qui ne diffère de sa vraie  
 valeur que dans le sixième chiffre. Car  
 si l'on en retranche le triangle  $AEE$   
 $= 13.856406$ , le restant  $16.755124$   
 exprimera le secteur  $Aae$  dont le tri-  
 ple ou  $50.265372$  sera le quart de  
 cercle entier, le quarré du rayon étant  
 $64.000000$  : & enfin réduisant ce  
 rapport au dénominateur  $1.000000$ .

on trouvera le premier nombre = 0.785396 ; suivant d'autres formules plus exactes on auroit eu 0.785398. L'erreur de celle-ci n'est donc que dans le sixième chiffre, & elle est environ  $\frac{2}{1.000000}$  ou  $\frac{1}{5.000000}$  ; le nombre 0.785398 étant à peine plus grand qu'il ne faut, puisque le chiffre suivant n'est que l'unité.

Nous donnerons encore un exemple de l'application de ces formules à la mesure d'un espace circulaire. Ici nous ne prendrons que quatre ordonnées également distantes dans le même segment dont il vient d'être question. Pour cela il faudra supposer le rayon divisé en six parties égales, & alors ces quatre ordonnées seront en fractions décimales 6.00000 ; 5.91756 ; 5.65685 ; 5.19615 ; par conséquent  $A' + 4 B'$  de la formule des quatre ordonnées auront pour valeur 45.91938, qu'il faudra multiplier par 3 & diviser par 8, ce qui donnera

17. 21977. Afin de voir jusqu'à quel point on approche de l'exactitude, il n'y a qu'à en retrancher le triangle  $AEe$ , qui est ici 7. 79422, & le reste 9. 42555 étant triplé, donne pour le quart de cercle 28. 276650; ce qui comparé au carré du rayon 36000000, est la même chose que 0. 785460 à 1. 000000. L'erreur est donc moindre que l'unité au cinquième chiffre, & elle va en tout à peu près à un 12000 seulement, ce qu'on doit regarder comme peu considérable eu égard à la facilité de l'opération.

Mais si on faisoit usage de la remarque de *Newton*, & qu'on doublât, dans le cas des cinq ordonnées, celle du milieu  $Cc$ , qu'on prit enfin les sommes des ordonnées  $QR, qr; HI, hi$  pour en faire les nouvelles ordonnées  $Q_2, HI$  de la courbe  $ypqr$ , il faudroit seulement employer la formule (*A*

$\frac{A' + 4B'}{6} \frac{R}{6}$ , ou  $\frac{1}{3}(A' + 4B')$ , puis-  
 qu'ici  $R = 2$ ; on auroit alors  $A'$   
 $+ 4B' = 91.833939$ : or ce nombre  
 divisé par 3 donneroit 30. 611313,  
 qui approche considérablement en-  
 core de la vraie valeur. Car en retra-  
 chant le triangle  $AEe$ , 13. 856406,  
 & triplant le reste 16. 754907, on a  
 pour rapport du quart du cercle au  
 quarré du rayon, celui de 50. 264721  
 à 64. 000000; ce qui est la même  
 chose que celui de 0. 785386 à  
 1. 000000. L'on voit que le premier  
 nombre s'accorde avec ceux que donne  
 la proportion de *Ludolph*, jusqu'aux  
 deux derniers chiffres qui devoient être  
 98 au lieu de 86, de sorte que l'erreur  
 n'est que d'une 83000. Il y a donc  
 quelque avantage, comme le remar-  
 quoit *M. Newton*, à réduire le cas des  
 cinq ordonnées à celui de trois, puis-  
 que l'erreur est encore presque insen-  
 sible, & que l'opération est considéra-

blement abrégée. C'est pourquoi, afin de faire cette réduction commodément, nous substituerons dans la pratique à la formule usitée alors, celle-ci  $\frac{1}{12}$   $(A' + 4B' + 2C') \times R$ . en prenant comme à l'ordinaire  $A'$  pour la somme de la première & la cinquième,  $B'$  pour la seconde & la quatrième, &  $C'$  pour la moyenne. Car cette formule équivaldra à la réduction qu'on vient de faire des cinq ordonnées à trois.

XXIV. M. *Thomas Simpson*, un des plus profonds Géometres qui illustrent aujourd'hui l'Angleterre, a donné\* une nouvelle méthode pour la dimension des aires des courbes que nous croyons devoir joindre ici aux précédentes. Il suppose, de même qu'on a fait dans l'article ci-dessus, un certain nombre d'ordonnées à égales distances; &, par une opération fort simple, il

\* *Math. Dissertations*, p. 109.

trouve l'aire de la courbe avec une exactitude qui approche beaucoup de la vérité : cette méthode est fondée sur la considération suivante. Soit la courbe  $IRGi$  (fig 22.), & qu'on conçoive les sommets des deux ordonnées  $FG$ ,  $hi$ , joints par une ligne droite, on peut imaginer dans le petit segment  $Gri$ , un segment parabolique inscrit qui aura son sommet en  $r$ , & son axe ou diamètre dans la position  $rq$ . Lors donc que les ordonnées équidistantes seront suffisamment voisines, on pourra regarder cet arc parabolique comme coïncidant avec la courbe proposée. Or ayant tiré une parallèle à  $Gi$  par le sommet  $R$ , ce segment est égal aux deux tiers du parallélogramme  $Gri$ , ou son égal  $Fh$  par  $ur$ . L'aire  $FGrib$  est donc égale au trapeze  $FGib$ , plus aux deux tiers de ce petit parallélogramme. Mais  $ur$  est la différence de  $qr$  & de  $qu$  moyenne arithmétique entre  $GF$  &  $hi$ , c'est par conséquent



$$qr = \frac{GF + hi}{2} \text{ ou } \frac{2qr - GF - hi}{2};$$

ce qui étant multiplié par  $\frac{2}{3} Fh$ , donne  $\frac{1}{3} qh \times (4qr - 2GF + hi)$ . D'un autre côté le trapeze  $FGih = (GF + hi) \times qh$ ; d'où l'on tirera, en ajoutant ces deux grandeurs & réduisant à même dénomination, l'aire  $FGrih = \frac{1}{3} qh \times (hi + 4qr + GF)$ . Par la même méthode on trouvera l'aire  $FGRIH = \frac{1}{3} QH \times (GF + HI + 4QR)$ : conséquemment l'aire entiere sera  $(hi + 4QR + 2GF + 4QR + HI)$  multipliée par  $\frac{1}{3} QH$  ou  $qh$ . De là il suit que si l'on prend quatre fois les ordonnées 2<sup>e</sup>. 4<sup>e</sup>. 6<sup>e</sup>. &c. une fois la première & la dernière, & le double de toutes les autres, qu'on multiplie enfin ces sommes par le tiers de la distance commune  $QH$  des ordonnées, on aura fort près l'aire de la courbe. Donnons-en un exemple.

Nous reprendrons pour cela les 5 ordonnées du segment  $AacE$ , dont

l'abscisse  $AE$  est égale au demi-rayon ; l'intervalle  $BA$  est l'unité ; ainsi l'aire  $AacE$  sera  $\frac{1}{3} (Aa + Ee + 4Bb + 4Dd + 2Cc)$  ce qui deviendra en mettant à la place de ces ordonnées leurs valeurs , ce qui deviendra , dis-je , 30. 611313. d'où l'on tirera , comme on a fait plus haut , le rapport du quart de cercle au carré du rayon , comme 0. 785386 à 1. 000000 : or ce rapport est vrai jusqu'au pénultième chiffre , qui ne devrait être plus grand que d'une unité pour s'accorder avec celui qu'on a si souvent cité. Je ne crois pas qu'on puisse rien trouver de plus simple , & en même temps de plus approchant de la précision.

Au reste , il est aisé d'appercevoir que cette règle exige nécessairement que le nombre des ordonnées soit impair ; mais c'est une sujétion légère qui diminue très-peu ses avantages. Il est aussi à propos , afin qu'elle ait son effet entier , que la courbe soit ou toute con-

verse, ou toute concave vers son axe, à moins que les ordonnées ne soient extrêmement voisines ; autrement il faudroit tirer une ordonnée du point d'inflexion, qui la partageroit en deux segmens, l'un concave, l'autre convexe, vers l'axe, & on les mesureroit à part.

J'ajouterai qu'on pourroit dans certains cas rendre cette regle beaucoup plus parfaite, en déterminant quelle espece de parabole conviendroit le mieux avec le petit segment curviligne. Il faudroit pour cela examiner quel rapport auroient les secondes différences des ordonnées avec les secondes différences des abcisses. Si celles-là, par exemple, étoient comme les cubes de celles-ci, il est visible que le segment parabolique le plus voisin de celui de la courbe appartiendroit à une parabole dont l'équation est  $y^3 = x$  ; alors la regle changeroit un peu, ce petit segment étant au parallelogramme circonscrit comme 3 à 4 ; mais je me

contenterai d'indiquer cette addition à l'ingénieuse regle de *M. Simpson*, parce que ce n'est pas ici le lieu d'en approfondir davantage la théorie. Les Géometres me comprendront du premier coup, & il faudroit pour les autres des explications assez longues.

XXV. Je terminerai ce chapitre en donnant une idée de l'ingénieux moyen dont *M. Jean Bernoulli* a fait usage pour déterminer des limites de plus en plus rapprochées du rapport de la circonférence circulaire au diamètre. On s'est borné à ce brief extrait de son écrit, parce que sa nature ne permet gueres de l'analyser avec plus de detail, sans tomber dans une prolixité que nous cherchons à éviter. Les Lecteurs dont nous aurons excité la curiosité, pourront consulter les œuvres de ce grand Homme, qui sont ou qui doivent être entre les mains de tous ceux qui aspirent à des connoissances profondes dans la Géométrie & l'analyse.

La méthode dont nous venons de parler, consiste en ceci. Qu'on imagine une courbe telle qu'un quart de cercle (dont les tangentes aux deux extrémités se rencontrent l'une l'autre perpendiculairement) se développer en commençant par une de ses extrémités: l'extrémité de cette circonférence courbe qui se roidit en ligne droite & se déplie, décrira une nouvelle courbe qu'on pourra supposer se développer aussi, mais en sens contraire, c'est-à-dire en commençant par le côté qui a été décrit le dernier; de-là en naîtra une troisième qu'on concevra développée de la même manière, & ainsi à l'infini. Toutes ces courbes, comme le remarque M. *Bernoulli*, approchent de plus en plus de l'égalité & de la similitude parfaite, & elles ne tardent même pas à être sensiblement égales; on peut encore observer qu'elles deviennent de plus en plus semblables à des cycloïdes. C'est une conséquence de cette vérité

connue que ces courbes sont les seules ordonnées parallèles, dont le développement ne fait que les reproduire.

Ayant donc nommé  $a$  la première courbe, c'est-à-dire le quart de circonférence dont le rayon est l'unité, *M. Bernoulli* détermine la longueur de toutes les autres par une suite d'expressions fort régulières & fort aisées à continuer pour tel nombre de courbes qu'on peut désirer. Ces expressions ont de plus cet avantage, d'être extrêmement simples; car après les réductions convenables, elles ne renferment que la grandeur  $a$  élevée à une puissance dont l'exposant est celui du rang de la courbe en comptant la première, & affectée uniquement de quelques coefficients numériques.

Que l'on suppose donc, ajoute *M. Bernoulli*, que deux de ces courbes qui se suivent immédiatement soient égales entr'elles, & qu'on égale les

expressions qui les désignent. Comme elles ont cette forme  $Ma^r$ ,  $Na^r + 1$ , il en résultera nécessairement une équation simple entre  $a$  ou le quart de la circonférence, & une fraction numérique qui sera sa valeur ; or il est évident que cette valeur approchera d'autant plus de l'exactitude, que la supposition qui l'a donnée s'en écartera moins.

Cette considération conduit à déterminer des limites alternativement moindres & plus grandes qu'il ne faut ; car en égalant la première & la seconde courbe, on trouve un rapport du quart de cercle au rayon qui excède le vrai ; au contraire la supposition d'égalité entre la seconde & la troisième en donne un trop petit, & ainsi de suite : au reste ces limites approchent avec assez de promptitude les unes des autres ; en effet la comparaison de la douzième & de la treizième courbe fournit une proportion du diamètre à

la circonférence , telle que celle de  $1 : 00000. 00.$  à  $3. 14159. 00$ , & l'égalité supposée entre la treizième & la quatorzième , la donnent comme  $1. 00000. 00$  à  $31415935$  ; or ces deux valeurs de la circonférence  $3. 14159. 00$ ,  $31415935$  , sont l'une trop petite , l'autre trop grande , & coincident néanmoins jusqu'au sixième chiffre ; ainsi elles sont vraies dans les six premiers , comme on le sçait d'ailleurs par les approximations si connues de *Viete* , *Ludolph* , &c.

## CHAPITRE V.

### *Histoire des Quadrateurs les plus célèbres.*

**J'**A I donné dans le cours de cet Ouvrage le nom de Quadrateurs à ces hommes qui , pour la plûpart à peine initiés dans la Géométrie , entreprennent de quarrer le cercle , ou s'obsti-



nent à maintenir d'absurdes paralogismes pour une solution légitime de ce problème. Ayant à les nommer souvent, il me falloit un terme nouveau pour éviter les circonlocutions, ou ne pas leur prodiguer le titre de Géomètres qu'ils méritent si peu. J'ai fait usage de la liberté qu'*Horace* accorde dans une pareille circonstance; le mot de quadrateur m'a paru assez heureux pour mon objet, & je l'ai adopté.

Le même motif qui m'a porté à désigner ces esprits d'une trempe si singulière, par une dénomination nouvelle, m'a conduit à ne parler d'eux que dans un article à part. Le seul *Hippocrate de Chio* & *Gregoire de S. Vincent* méritoient quelque distinction à cet égard. Aurois-je dû exposer de suite les découvertes dont nous nous sommes occupés jusqu'ici, & les ridicules prétentions de tant de Quadrateurs anciens & modernes? Non sans doute, c'eût été trop honorer ces derniers & faire une espede

d'injure aux Auteurs des inventions ingénieuses qu'on a exposées dans les chapitres précédens ; les noms d'un *Archimede*, d'un *Wallis*, d'un *Newton*, figureroient mal à côté de ceux des *Bryson*, des *Oronces*, des *Delaleu*, des *Basselin*, &c.

Mais, diront sans doute quelques personnes judicieuses, quelle utilité peut-il y avoir à tirer de la poussiere ces noms déjà dégradés auprès de la postérité & de leur siècle même, par les erreurs de ceux qui les ont portés ? Je me suis fait cette question plus d'une fois, & plus d'une fois j'ai été sur le point de supprimer cet article entier ; cependant après quelques réflexions j'ai pensé que l'histoire d'un problème célèbre par tant de tentatives & de chûtes honteuses, ne pouvoit être complète qu'en faisant connoître du moins quelques-uns de ceux qui se sont signalés par ce ridicule ; il y a d'ailleurs une sorte de justice à traduire devant la postérité,

deshommes qui semblent avoir de propos délibéré fermé les yeux à la plus grande évidence. Si l'erreur grossière, & presque volontaire, n'étoit punie que de l'obscurité & de l'oubli, ce châtiment léger seroit trop peu capable de retenir les nombreux imitateurs de ceux dont je parle : ils deviendront peut-être plus circonspects en voyant le mépris & l'espece de tache qui accompagne les noms de ceux dont ils suivent les traces.

II. Il y eut parmi les Anciens, comme parmi nous, un grand nombre de ces foibles Géometres, qui se persuaderent d'avoir trouvé la Quadrature du cercle ; j'en ai déjà cité quelques-uns par occasion. La prétendue quadrature de *Bryson*, qui faisoit le cercle moyen proportionnel, entre les quarrés inscrit & circonscrit, est une erreur indigne de la Géométrie, soit qu'on l'entende du moyen arithmétique ou du moyen géométrique ; car la différence est de près d'une vingt - unième dans le premier

cas ; & à l'égard du dernier , on sçavoit déjà de son tems que le moyen géométrique entre ces quarrés étoit l'octogone inscrit.

C'est sans doute de ce nombreux essain de Quadrateurs que parle *Archimede* , dans la préface de sa Quadrature de la parabole. On y lit que plusieurs avoient déjà tenté de quarrer le cercle & l'ellipse , mais qu'ils n'avoient qu'enfanté des paralogismes , ou supposé des principes qu'on ne pouvoit leur accorder. La ressemblance de notre âge avec celui d'*Archimede* est entière ; combien de Quadrateurs qui commencent à partir de quelque principe directement contraire à la Géométrie ! Nous en avons un aujourd'hui pour qui la partie n'est pas moindre que le tout , pour qui la diagonale du quarré n'est pas incommensurable au côté , qui réussit enfin à merveille avec ces principes féconds à quarrer le cercle , non par la méthode des Géomètres , mais par le  
*méchanisme*

*méchanisme en plein des figures ; ce sont là ses propres termes ; spectatum admissum risum teneatis amici.*

III. Je ne dirai rien des siècles d'obscurité qui ont précédé le renouvellement des sciences parmi nous : on a dû trouver souvent la quadrature du cercle dans ces temps où les plus habiles sçavoient à peine une partie de la Géométrie élémentaire d'*Euclide* : je ne m'amuserai pas à y fouiller pour en retirer la précieuse découverte de quelque nom inconnu & qui mérite de l'être ; je passe à un tems sur lequel nous avons plus de lumière.

IV. Le premier qui , à la renaissance des Lettres , occupa les Géometres à réfuter ses erreurs , est le fameux Cardinal de *Cusa* ; il prétendit avoir réussi à quarrer le cercle par deux voyes différentes. Suivant l'une il faisoit rouler sur un plan un cercle ou un cylindre , jusqu'à ce que le point qui l'avoit touché au commencement de la révolution ,

retournât s'y appliquer; cependant il faut lui rendre cette justice, il n'étoit pas assez mal-adroit pour prétendre déterminer ce point par un mécanisme si grossier; il cherchoit à le faire géométriquement, mais son opération est tout à fait erronée: son autre méthode lui donnoit cette fausse détermination de la circonférence; *si l'on a un cercle, disoit-il, & qu'on en décrive un second dont le diamètre soit égal au rayon du premier, augmenté du côté du quarré inscrit; le triangle équilatéral inscrit dans ce second cercle, sera isopérimètre au premier.* Ce n'est pas même là une approximation, car un calcul très-simple fait voit que la circonférence ainsi déterminée, s'écarte beaucoup en dessous des limites d'Archimede. Royaimont s'y prit de cette manière pour réfuter la prétention de ce Cardinal Géometre: ce qu'il fit dans plusieurs Lettres écrites en 1464 ou 1465, mais imprimées seulement en 1533, avec quelques autres ouvrages

posthumes de ce sçavant Astronome. Quant à la première quadrature du Cardinal de *Cusa*, elle fut de nouveau réchauffée au commencement du seizième siècle, par un certain *Bovillus* de Vermandois, que sa seule obscurité a préservé de la risée des Géometres.

V. A ces malheureux Quadratureurs, succéda, vers le milieu du seizième siècle, *Oronce Finée*. Celui-ci se proposa un objet bien plus vaste qu'aucun Mathématicien de ses prédécesseurs; la Quadrature du cercle n'est qu'une petite partie des nombreuses découvertes qui composent son Livre, *de rebus Mathematicis hætenus desideratis*. L'invention des deux moyennes proportionnelles, la trisection de l'angle, l'inscription de tous les polygones de côtés impairs dans le cercle, que sçais-je, rien ne se refusa à ses efforts; il surmonta lui seul toutes les difficultés qui avoient jusques-là arrêté les Géometres, mais l'illu-

de ses disciples nommé *Buteon*, Mathématicien, plus judicieux, l'attaqua le premier, & démontra ses erreurs. Il fut secondé d'un Mathématicien Portugais, justement célèbre de son tems; sçavoir *Pierre Nonius*, ou *Nugnes* dans sa langue, qui releva les bévues d'*Oronce* avec plus d'étendue, dans un livre exprès intitulé *de erratis Orontii*. Ainsi s'évanouit l'espérance d'une immortalité brillante dont *Oronce* s'étoit flaté, & cet ouvrage sur lequel il s'étoit reposé pour sa réputation, fut regardé comme une des plus misérables productions qu'on eut vûe depuis long-tems.

Au reste, *Oronce* prétendoit, ce qu'il peut être utile à quelqu'un de sçavoir pour le préserver de la même erreur; il prétendoit, dis-je, que la circonférence du cercle étoit la moindre des deux moyennes proportionnelles entre les contours des quarrés inscrit & circonscrit; mais cette moyenne excède les simples limites d'*Archimede*, & on



le réfuta dès-lors en le lui montrant. Depuis ce tems M. *Huygens* a démontré immédiatement que la circonférence du cercle étoit toujours moindre que la moindre des deux moyennes, soit arithmétiques, soit géométriques, entre les contours des polygones semblables, inscrit & circonscrit, quels qu'ils soient.

VI. On vit peu de tems après la chute d'*Oronce*, paroître dans la carrière un nouveau prétendant à l'honneur de quarrer le cercle; il se nommoit *Simon Wan - Eyk* (*du - Chesne*). Celui-ci fut apparemment moins maladroît que les précédens; car *Pierre Méius* qui le réfuta, fut obligé pour le faire, de déterminer des limites beaucoup plus resserrées que celles d'*Archimede*: ce fut là l'occasion de sa découverte du rapport approché de 113 à 355, qui convient avec les chiffres de *Ludolph*, jusqu'au septième inclusivement. La Quadrature de *Duchesne* ne.

résista pas à cette rigoureuse épreuve, & fut universellement reconnue pour fausse.

V I I. Parmi ceux qui se sont flatés dans ces derniers tems d'avoir atteint précisément la vraie mesure du cercle, aucun ne l'a fait avec plus de confiance que *Joseph Scaliger*. Non content de la célébrité dont il jouissoit à titre d'une profonde érudition, il prétendit acquérir le premier rang parmi les Mathématiciens. La découverte de la Quadrature du cercle lui en parut un moyen assuré, & il la trouva comme font tous ceux qui, à peine initiés dans la Géométrie, s'engagent à la rechercher, persuadés qu'elle ne leur échappera pas : il exposa sa rare découverte dans son livre intitulé *nova Cyclometria*, en 1592 ; & l'air d'assurance avec lequel il l'annonça, en imposa à bien des gens, qui n'hésiterent pas à lui ceindre le laurier de Géometre ; mais ceux à qui seuls il appartenoit de décider du mérite géo-

métrique, en jugerent bien autrement : le grand nom de *Scaliger*, demandoit de grands adversaires. *Kiète*, le premier Mathématicien de son âge, le réfuta, de même qu'*Adrianus Romanus*, Géometre célèbre des Pays-Bas, & le P. *Clavius* ; ce dernier sur-tout le mortifia extrêmement, il fit voir que de la Quadrature prétendue de *Scaliger*, il s'en ensuivoit que la circonférence du dodécagone inscrit étoit plus grande que celle du cercle qui le renfermoit : il ne se borna pas à cela, ses autres solutions pitoyables de la trisection de l'angle, de l'inscription des polygones quelconques impairs, ne furent pas traitées avec plus d'indulgence. Le Géometre Allemand mit au grand jour ses paralogismes, sa contradiction perpétuelle avec les principes les plus assurés de la Géométrie. Pour mettre le comble à l'amertume de la critique, il forma de ces grossières bévues, le contraste humiliant pour *Scaliger*, avec sa confiance

& la maniere insultante dont il avoit traité *Euclide* & *Archimede*. Il n'y eut qu'une voix à son sujet, du moins parmi les Géomètres. J'ajoute à dessein cette restriction, car je n'ignore pas que tel est regardé comme un grand homme par gens hors d'état de l'apprécier, qui n'est qu'un objet de mépris pour ceux qui cultivent le même art ou la même science : nous en avons de nombreux exemples. Quant à *Scaliger*, couronné par ses amis ou quelques ignorans, il fut mis par ceux qui étoient versés dans la Géométrie, au rang des plus mal-adroits Quadratureurs.

VIII. Une histoire aussi détaillée des autres Géomètres de cette espece seroit longue, & le peu d'intérêt qu'on doit y prendre ne la rendroit pas supportable. Je me borne donc à faire passer brièvement en revue ceux dont il me reste à parler. J'ai regret de trouver ici *Longomontanus* : ce célèbre Astronome du commencement du siècle

dernier, se fit un vrai tort, par sa foiblesse, à se faire illusion sur la Quadrature du cercle. Il voulut que le diamètre fût à la circonférence comme 100000 à 314185 (a); cela est suffisamment réfuté par les rapports qu'on a donnés ci-dessus, suivant lesquels la circonférence est moindre que 314160 des mêmes parties; mais *Longomontanus* mérite quelque indulgence, eu égard aux travaux utiles dont on lui est redevable en Astronomie. A peu près dans le même tems, *Jean-Baptiste Porta*, Napolitain, tenta la voye des lunulles pour parvenir à la Quadrature du cercle. On trouve bien des puérilités dans son ouvrage, qui aboutit enfin à des paralogismes palpables; quoiqu'il y eût mille propriétés curieuses des lunulles, que des Géometres qui ne songeoient pas à la Quadrature du cercle ont apperçues (voyez note 1, c. 2.),

(a) Huygens, *de circuli magnitudine inventa*, p. 20.

*Porta* n'en rencontra aucune , mais seulement des erreurs. Tel est ordinairement le procédé de ceux qui s'adonnent à ce problème : il est hors d'exemple que leur travail ait procuré la moindre découverte géométrique ; j'en excepte le seul *Grégoire de S. Vincent* , dont j'ai parlé avec éloge.

Le fameux *Hobbes* donnoit il y a près d'un siècle dans un travers semblable ; on peut même dire qu'il surpassa en ridicule tous ses prédécesseurs en ce genre ; car non seulement il crut avoir réussi à quarrer le cercle , & à trouver les deux moyennes proportionnelles , mais on ne vit jamais un pareil acharnement à les soutenir contre *Wallis* , qui prit la peine de le réfuter par plusieurs écrits. Le dépit qu'il en conçut se tourna contre les Géomètres & la Géométrie elle-même. D'abord il en avoit admis la méthode & les principes ; les contradictions que *Wallis* lui opposa , le conduisirent peu-à-peu à

s'inscrire en faux contre tous les axiomes, & il en entreprit la réforme entière dans le livre intitulé, *de ratiociniis & fastu Geometrarum*. Cette querelle lui fit enfanter une foule d'autres écrits, dont les extraits consignés dans les Transactions philosophiques, ne contribueront pas à établir sa réputation dans la postérité.

Je citerois encore un grand nombre d'autres personnages à mettre à côté de ces premiers. Un *Olivier de Serres*, qui trouvoit sçavamment que le cercle étoit double du triangle équilatéral inscrit; il ignoroit, ce qui donne une grande idée de ses connoissances en Géométrie, que ce double est l'exagone. Un sieur *Delalen*, qui fatigua vers le milieu du siècle passé, les Géomètres, par son obstination à maintenir ses paralogismes, contre les réfutations solides & évidentes qu'on y opposa. Un sieur *Mallement de Messange*, célèbre dans les Journaux du tems, par ses impertinens

systèmes physiques (a). Un sieur *Dathlepe Cluver* (b), qui quarroit méthaphysiquement le cercle, & déquarroit ( qu'on me permette ce terme ) la parabole, insultant aux Géometres, qui avoient été si long-tems les dupes d'*Archimede*. Il ne tint pas à M. *Leibnitz* de se donner la comédie & à toute l'Europe, en le mettant aux prises avec M. *Newentitt*, qui dans le même tems entassoit bien de mauvais raisonnemens sur le calcul différentiel. Le sieur *Mashulon* enfin, condamné il y a environ trente ans, par un Tribunal de Justice à la peine qu'il s'étoit imposée lui-même, si l'on convainquoit sa quadrature de fausseté: la perte d'une somme de 1000 écus fut la punition qu'il essuya pour avoir eu l'ambition de quarrer le cercle, & la témérité de défier pardevant Notaires les Géometres de relever la moindre erreur dans ses raisonnemens.

(a) Journal des Sçavans, 1672, 80, 81, &c.

(b) Act. de *Leipsick*, ann. 1695.



Parmi cette foule de Quadrateurs obstinés à se refuser aux preuves les plus évidentes, le sieur *Basselin* est un des plus récents; il ne faut qu'avoir jetté les yeux sur son livre, pour juger que c'étoit un des plus pitoyables & des plus embarrassés. Son prétendu rapport s'accordoit à peine avec les limites connues de *Endolph*, jusqu'au quatrième chiffre; aussi prétendoit-il infirmer leur certitude, parce qu'elles sont au-dessous du juste milieu de celles d'*Archimede*. On lui demandoit quelle assurance il avoit que la véritable grandeur du cercle ne fût pas au-dessous de ce juste milieu; c'étoit, répondoit-il, sa quadrature, & il se disoit assuré qu'elle étoit exacte, parce qu'elle se rencontroit dans les limites d'*Archimede*, comme si mille autres rapports aussi faux que le sien, ne se rencontroient pas également entre ces limites. En vain lui faisoit-on mille raisonnemens très-palpables pour le desabuser, ce pauvre

Géometre, qui dans le tems qu'il quarreroit le cercle, ignoroit qu'*Archimede* eût quarré la parabole, est mort dans l'intime persuasion qu'une postérité plus équitable reconnoîtroit quelque jour ce que ses jaloux contemporains lui contestoient; car c'est un foible qui ajoute encore au ridicule des gens de cette espece, que de se persuader que la jalousie seule des sçavans, & sur-tout des Académies, leur oppose les contradictions qu'ils essuyent. Le sieur *Basselin* appréhendoit extrêmement les effets de cette jalousie, ou quelque plagiat odieux; il en agit toujours avec les Commissaires qu'il avoit extorqués, comme un homme qui craint de se voir enlever un secret inestimable; il ne dévoila entièrement sa découverte que dans l'impression, pour s'en assurer la gloire.

IX. J'avois crû d'abord devoir m'imposer la loi de ne point parler des Quadrateurs vivans, puisque je ne pouvois

avec équité les ranger dans une autre classe que ceux qu'on vient de voir ; mais j'ai fait réflexion que puisqu'ils avoient couru le hazard du jugement du public , il m'étoit permis de les citer devant lui : je me bornerai néanmoins à un petit nombre , c'est-à-dire à ceux que le hazard m'a présentés , ou à qui la singularité de leurs prétentions a donné une sorte de célébrité.

M. *Liger* a rempli les *Mercures* d'écrits concernant la Quadrature du cercle, & a fait un ouvrage particulier pour prouver que la partie n'est pas moindre que le tout , qu'il n'y a point d'incommensurables , que la racine quarrée de 24 est la même que celle de 25 , & celle de 50 la même que celle de 49, &c. Il prouve tout cela , non par des raisonnemens métaphysiques , mais clairement & aux yeux , par le *méchanisme en plein des figures* , pour me servir de l'expression qu'il employe dans un écrit que j'ai vû de lui. Le sieur *Tondu de Nangis*

moi-même d'un tems si mal employé, & je craindrois d'encourir le blâme des Géometres, si je leur présentois un plus grand nombre de ces objets, qui ont à peine auprès d'eux le mérite du ridicule.

---

## CHAPITRE V.

*Addition, contenant l'histoire de quelques autres problèmes fameux en Géométrie, comme ceux de la duplication du cube ou des deux moyennes proportionnelles, & de la trisection de l'angle.*

I. **L'**Impression de cet Ouvrage étoit fort avancée, lorsque des personnes aux avis desquelles je défere, m'ont conseillé de profiter de l'occasion présente, pour traiter historiquement ces deux problèmes, qui le cèdent peu en célébrité à celui de la Quadrature

du cercle. Je me suis déterminé sans peine à ce nouveau travail, dans la vûe de l'utilité qui peut en être le fruit. On ne voit en effet que trop de personnes malheureusement obstinées à la recherche des deux moyennes proportionnelles, ou de la trisection de l'angle, sans avoir jamais examiné & connu la nature de ces questions. Ce chapitre, indépendamment qu'il contient un morceau assez curieux de l'histoire de la Géométrie, m'a paru propre à les instruire & à les desabuser; elles y verront qu'elles s'occupent infructueusement à rechercher, ou ce qui est déjà trouvé, ou ce qui est impossible. Je m'explique, ces problèmes sont résolus autant qu'ils peuvent l'être: en ce sens, y travailler c'est chercher ce dont on est déjà en possession; mais prétendre les résoudre par la règle & le compas seulement, c'est-à-dire par de simples intersections de lignes droites & circulaires; c'est s'obstiner à une recherche

vaine & impossible. Cette vérité n'est aujourd'hui sujette à aucune contestation parmi les Géomètres, & l'on s'attachera plus bas à la bien prouver. J'entre en matière & je commence par la duplication du cube.

II. Il s'agit dans cette première question de trouver un cube, ou plus généralement un solide quelconque, précisément double ou en raison donnée, avec un solide semblable. Les Géomètres apperçurent bientôt que cela se réduisoit à déterminer les deux moyennes proportionnelles continues entre deux lignes données. *Hippocrate de Chio* fut, dit-on, l'auteur de cette remarque; elle suit de cette propriété si connue des progressions géométriques, que le carré du premier est au carré du second, comme le premier au troisième; le cube du premier à celui du second, comme le premier au quatrième; &c. c'est-à-dire qu'en général la puissance du premier terme désignée par

l'exposant  $m$ , est à la puissance semblable du second, comme le premier sermo à celui dont le rang dans la suite est exposé par  $m - 1$ . Ainsi la ligne  $A$  étant le côté d'un cube proposé, la première des deux moyennes continues entre  $A$  &  $m$ ,  $A$  sera le côté d'un cube multiple du premier, comme  $m$  l'est de l'unité. Ce qu'on vient de dire des côtés d'un cube s'applique aux côtés homologues des solides semblables; il suffit pour le voir d'être initié dans la Géométrie.

III. Tout le monde sçait la manière dont on raconte l'origine du problème de la duplication du cube; c'est en Géométrie un trait aussi fameux que celui de l'hecatombe immolée par *Pythagore*. Si l'on s'est moqué (a) avec justice de ce prétendu sacrifice, qui n'est compatible ni avec les facultés d'un philosophe, ni avec les dogmes qu'enseignoit celui de Samos, on ne doit pas plus

(a) *Cicéron. Tusculan.*

d'égards à l'histoire qu'on fait du problème des deux moyennes proportionnelles. Je ne répéterai donc pas ici ce qu'on trouve dans tant d'autres endroits, la fable de cette divinité bizarre, qui demandoit un autel précisément double de celui qu'elle avoit, & qui fit continuer la peste qui ravageoit l'Attique, jusqu'à ce qu'on l'eut satisfaite. *Eratosthenes* donne à ce problème célèbre une origine moins brillante. Un certain tragique, dit-il, avoit introduit sur la scène *Minos* élevant un monument à *Glaucus*, ses entrepreneurs lui donnoient cent palmes en tous sens; mais le Prince, sur l'inspection de l'ouvrage, qui ne répondoit pas à sa magnificence, ordonnoit qu'on le fît double: de là, ajoute-t-il, quelques-uns prirent sujet de demander aux Géomètres comment ils exécuteroient une pareille volonté? Ils tenterent la question de bien des manieres, tâchant de construire un cube double d'un autre, jusqu'au



tems d'*Hippocrate*, qui leur enseigna qu'elle se réduisoit à l'invention des deux moyennes proportionnelles continues. Dans la suite l'oracle de *Delphes* ayant demandé qu'on doublât l'autel du dieu qui y présidoit, les entrepreneurs voulant exécuter cet ordre, furent obligés de consulter l'école platonicienne, qui faisoit une étude spéciale de la Géométrie. Telle est suivant *Eratostènes*, la maniere dont le problème de la duplication du cercle se présenta la première fois aux Géometres, & dont il leur fut proposé de nouveau, après en avoir été, ce semble, oublié pendant quelque tems.

Mais quelle que soit l'occasion qui les engagea dans cette recherche, il est certain qu'elle avoit acquise une grande célébrité dès le tems de *Platon*. *Valere Maxime* raconte au reste un trait fabuleux, quand il dit que ce Philosophe renvoya à *Euclide* les députés qu'on lui avoit adressés, comme au plus habile

Géometre de la Grèce ; comment cela pourroit-il se soutenir , puisqu'il est certain qu'*Euclide* le Géometre ne florissoit qu'un demi-siècle après *Platon*, & que le Philosophe de *Megare* qui porta le même nom , ne s'occupoit que de sophismes ? Quelques-uns ont soupçonné qu'il falloit lire *Eudoxe* ; il est je crois plus sûr de traiter toute l'histoire de fable.

IV. L'école platonicienne fournit plusieurs solutions du problème de la duplication du cube. *Platon* en donna d'abord une fort simple , & qui n'emploie que les moyens de la Géométrie élémentaire ; il est vrai qu'elle exige un tâtonnement , & l'usage de quelque instrument autre que la règle & le compas , ce qui n'est point admis dans la rigueur géométrique. Ce défaut que le chef des Géometres ne chercha pas à éviter , nous donne lieu de penser qu'il n'eut en vûe que la facilité de l'exécution , & qu'il sacrifia à cet avantage réel une délicatesse

licatesse sur elle. Voici en substance le procédé de Platon. Si l'on a deux triangles rectangles, comme  $ACD$ ,  $CDE$  (fig. 25.) appuyés sur les deux bases perpendiculaires l'une à l'autre  $AD$ ,  $CE$ , les lignes  $AB$ ,  $BC$ ,  $BD$ ,  $BE$  sont en proportion continue. Ayant donc disposé  $AB$ ,  $BE$ , les deux extrêmes données à angles droits, il s'agit de tirer des points  $A$ ,  $E$  les parallèles  $AC$ ,  $ED$  jusques aux prolongemens de  $AB$ ,  $CB$ , & de faire qu'en même temps les deux angles en  $C$  &  $D$  soient droits. Pour exécuter cela avec plus de facilité, Platon imagina un instrument composé d'une base & de deux coulisses perpendiculaires, entre lesquelles s'avancoit une règle mobile, qui par là restoit toujours parallèle à la base. Je n'en donne point la figure, parce que cette construction est assez simple pour qu'on la conçoive aisément sans secours. Cet instrument servoit à trouver à la fois les points  $C$ ,  $D$  : pour cet effet

on écartoit la règle mobile de la base, & l'on faisoit en sorte que les points  $A, E$ , étant dans ces deux parallèles, les lignes  $ABD, EBC$  passassent par les angles de ces parallèles avec l'une des coulisses latérales. Par ce moyen les angles  $C, D$  étoient droits, & en même tems les lignes  $AC, ED$  parallèles, ce qui résolvoit le problème. Quelques-uns variant la construction de *Platon*, se servirent de deux équerres mobiles  $ACD, CDE$ , qu'on dispoisoit de manière que le point  $A$  étant dans le côté  $AC$ , & les lignes  $BC, BD$  passant par  $C$  &  $D$ , les angles des équerres, le côté  $DE$  rencontrât le point  $E$ . Ce dernier procédé a fourni à un analyste du seizième siècle (*Raphael Bombelli*) l'idée de construire par une voie semblable toutes les équations des troisième & quatrième degrés, ce qu'il exécute fort ingénieusement.

V. La solution donnée par *Platon* a, comme on voit, le défaut de ne pouvoir

être avouée par la Géométrie ; elle est à la vérité commode dans l'exécution , mais elle blesse la rigueur dont cette science se fait gloire. *Architas* en donna une autre qui a un défaut tout à fait contraire ; celle-ci est uniquement intellectuelle , d'ailleurs elle est fort satisfaisante pour l'esprit , & l'on peut en concevoir une idée avantageuse du génie de son inventeur. Afin d'abrèger je me contenterai de l'indiquer. *Architas* imagine sur la surface d'un cylindre droit une ligne courbe , décrite par l'intersection continuelle de cette surface , avec la circonférence d'un demi-cercle qui se meut d'une certaine manière ; ensuite il fait rencontrer cette ligne courbe par une surface conique , ce qui donne un point d'où dépend la solution du problème. Au reste , comme je l'ai déjà dit , quelque ingénieux que soit ce procédé , il est tout pour l'esprit , la pratique n'en sauroit tirer aucun secours.

VI. Ceux qui connoissent peu l'ancienne Géométrie , se persuadent ordinairement que la vraie solution de ce problème est d'une date moderne , & que *Descartes* en a le premier dévoilé le principe. Il est vrai qu'il l'a beaucoup perfectionnée , mais les Anciens l'avoient déjà ébauchée dès le tems de *Platon*. Nous avons deux solutions d'un Géometre contemporain , & disciple de ce Philosophe, qui employent les sections coniques ; dans l'une ce sont deux paraboles , dans l'autre une hyperbole entre les asymptotes combinée avec une parabole ; ce Géometre est *Menechme*, frere de *Dinostrate*, à qui un vers d'*Erazostenes* semble attribuer l'invention des sections coniques : ses deux solutions sont trop remarquables pour ne les pas rapporter ici , je les exposerai en suivant la méthode analytique dont il se servit apparemment pour y parvenir.

Je suppose que les extrêmes données soient *A* & *D*, & les deux moyennes

cherchées  $B$  &  $C$ ; le carré de  $B$  sera donc égal au rectangle de  $A \times C$ , à cause de la proportion continue qui régné entre  $A, B, C$ ; par conséquent la ligne  $B$  sera l'ordonnée d'une parabole, dont  $A$  est le parametre &  $C$  l'abscisse. Soit donc décrite sur l'axe  $AC$  indéterminée, une parabole  $ABb$  (*fig. 26.*), les lignes  $BC$  seront quelques-unes des coordonnées  $BC, AC$ , ou  $bc, Ac$ , ou &c. mais  $B, C$  &  $D$  étant continuellement proportionnelles, le carré de  $C$  doit être égal au rectangle de  $B \times D$ , ou l'abscisse  $AC$  cherchée de la première parabole doit être telle que son carré soit égal au rectangle de  $BC$ , par la seconde des extrêmes données.  $AC$  étant donc encore considérée comme abscisse,  $BC$  sera l'ordonnée d'une parabole extérieure  $ABb$ , dont la propriété est, comme l'on sçait, d'avoir les carrés de ses abscisses constamment égaux aux rectangles de ses ordonnées par une ligne constante; au reste cette parabole

extérieure n'est que la parabole ordinaire décrite sur un axe  $AD$ , perpendiculaire au premier. Ainsi l'intersection de ces deux paraboles donnera la solution désirée, puisque par ce moyen  $BC$ , comme ordonnée de la première parabole  $ABb$ , sera telle que  $A : BC :: BC : AC$ ; & qu'en vertu de la seconde  $ABb$ , on a  $BC$  ou  $AD : BD :: BD$  ou  $AC : D$ ; d'où il est manifeste que  $A, BC, AC$  &  $D$  sont en proportion continue.

Une analyse facile conduit de même à la seconde solution de *Menechme*; car puisque les quatre lignes  $A, B, C, D$ , sont en proportion, le rectangle de  $B \times C$  est égal au rectangle constant & donné de  $A \times D$ . Les lignes cherchées  $B, C$ , sont donc les coordonnées d'une hyperbole entre les asymptotes  $ODI$ , où les rectangles, comme  $CIAB, ci a B$ , sont tous égaux entr'eux & au rectangle de  $A \times D$ . Or à cause de la proportion continue, le carré de  $B$  est égal au



rectangle de  $C \times A$  : d'où il suit que  $B$  est l'ordonnée d'une parabole dont le parametre est  $A$ , & l'abscisse  $C$ . Ayant donc pris  $BA$  pour axe, on voit que décrivant la parabole dont le parametre est  $A$ , elle coupera l'hyperbole à l'endroit cherché  $D$ , qui donnera les deux moyennes  $ED$ ,  $BE$ . En effet à cause de la parabole  $A : ED :: ED : BE$ , & ces mêmes lignes  $ED$ ,  $BE$  appartenant à l'hyperbole, donnent  $ED \times BE = A \times D$ , c'est-à-dire  $A : ED : BE : D$ ; d'où se conclut aisément la proportion continue.

Quoique j'aie donné des éloges à ces deux solutions, je n'ignore cependant pas qu'elles ont un défaut assez considérable, défaut qui n'a pas échappé aux Anciens même. Il consiste en ce qu'elles employent deux sections coniques, tandis qu'une seule combinée avec un cercle pouvoit suffire. C'est en quoi les *Descartes*, les *Sluses*, &c. ont beaucoup perfectionné la méthode des

lieux géométriques. Les Anciens employoient ordinairement les premiers qui se présentoient , & ce n'étoient pas toujours les plus simples ; les Modernes ont enseigné à choisir les plus commodes : mais cela doit peu diminuer le mérite de l'Auteur de cette ingénieuse invention ; auroit-on droit d'attendre qu'il lui eût donné tout à coup la perfection dont elle étoit susceptible ? La Géométrie ancienne nous en fournit d'autres exemples où il n'y a rien de pareil à redire.

VII. *Endoxe* de *Cnide* fut un des Géometres contemporains de *Platon* , qui travaillèrent à la duplication du cube ; il ne reste plus de traces de sa solution , graces à la mauvaise humeur d'*Eutocius* , ( a ) qui la déprime fort & nous la represente comme pitoyable. Cependant on en pensera bien autrement si l'on a quelque'égard au témoignage

( a ) *Comm. in Archimed. de sphaera & cylindro.*

d'*Eratostenes* (a), qui en parle avec autant d'éloge qu'*Eutocius* affecte de mépris pour elle, & le jugement de ce Philosophe & Géometre célèbre doit l'emporter sur celui du commentateur d'*Archimede*, venu près de dix siècles après *Eudoxe*, & qui n'a peut-être vû qu'un manuscrit altéré. Cet endroit d'*Eratostenes* nous apprend que le Géometre de Cnide avoit imaginé certaines courbes particulières pour la résolution de ce problème, & que ces courbes étoient différentes des sections coniques, puisqu'il parle plus haut de ces dernières au sujet de *Menechme*. Les courbes inventées par *Eudoxe* avoient probablement de la ressemblance avec celles que le même motif a fait imaginer à divers Géometres, tels que le Pere *Griemberger* (b), *Renaldini* (c), qui nomme les siennes *Mediceæ*, comme

(a) *Ibidem*.

(b) *Villalpandi, descriptio templi Salomonis.*

(c) *De resolutione & comp. mathem. tom. 3.*

si une Maison illustre avoit à tirer quelque nouvel éclat d'une courbe géométrique ; *Barrow* (a), qui fort sagement ne donne aucun nom aux siennes , &c.

VIII. Le problème des deux moyennes proportionnelles continua d'être un sujet sur lequel s'exercerent les plus habiles Géometres. *Eratostenes*, dont nous avons parlé si souvent, le résolut par une voie nouvelle , & qu'il est aisé d'appliquer à trouver tant de moyennes proportionnelles qu'on voudra ; il n'y employe que des lignes droites , aussi est-il obligé de recourir à un instrument autre que la règle & le compas. Celui qu'il propose est composé de plusieurs planchettes mobiles , qui coulent les unes sur les autres parallèlement à elles-mêmes : je ne le décris pas afin d'abréger , on peut le voir dans *Eutocius* ou dans *Pappus* (b). *Eratostenes* écrivit sur cela un petit traité intitulé *Mesolabium*,

(a) *Lectiones Geometricæ.*

(b) *Collections Mathem.* l. 3.

qu'il adressa au Roi *Ptolomée*, & qu'*Eutocius* nous a conservé, de même que les vers par lesquels il célébra son invention. Ces vers cependant ne la préservèrent pas des railleries de *Nicomede*; celui-ci s'en mocquoit comme d'une chose qui n'étoit ni trop subtile ni trop conforme à l'esprit de la Géométrie; mais il y a un peu trop de rigueur dans cette critique. La solution d'*Eratostenes*, quoique mécanique, ne laisse pas d'être assez ingénieuse.

IX. Après ces solutions viennent celles d'*Appollonius*, d'*Heron* d'*Alexandrie* & de *Philon* de *Byzance*; je les joins ensemble, parce qu'elles ne sont proprement que la même, variée au gré de ces Géometres. Suivant l'un d'eux, après avoir fait des deux lignes données  $AC$ ,  $CB$  le rectangle  $AB$  (fig. 28), & partagé la diagonale  $AB$  en deux également en  $R$ , il faut décrire de ce point un arc de cercle  $GIF$ , tel que la ligne  $GF$  menée par ses intersec-

Lvj

tions  $G$ ,  $F$  avec les côtés  $CA$ ,  $CB$  prolongés passe par l'angle  $D$ ; alors les lignes  $BF$ ,  $AG$  sont les moyennes qu'on cherche. Cette construction revient à celle de décrire sur la ligne  $AB$  un demi-cercle, & de tirer  $FDG$ , de sorte que les segmens  $FE$ ,  $DG$  soient égaux : on peut satisfaire en tâtonnant, à ces conditions, & ainsi le faisoit *Philon de Byzance*, & *Appollonius* même, au rapport du commentateur d'*Archimede*. Cet écrivain attribue à *Heron* d'Alexandrie, une solution rigoureusement géométrique, par le moyen de l'hyperbole. Ce Géometre en décrivait une par le point  $D$ , entre les asymptotes  $CA$ ,  $CB$ ; & son intersection avec le demi-cercle  $ADB$  déterminoit le point  $E$ , par lequel il falloit mener la ligne  $FDG$ . Cette solution, il faut le remarquer, est une des plus simples & des plus élégantes; mais on doit en faire honneur à *Appollonius*. Je me fonde en pensant ainsi, sur le témoignage de

*Pappus* ( *a* ) , qui dit qu'*Appollonius* résolut le problème par les sections coniques , & qui attribue à *Heron* celle qu'*Eutocius* donne à cet autre : l'ouvrage d'*Heron* sur les machines de guerre , confirme le rapport de *Pappus*.

X. De toutes les solutions anciennes du problème de la duplication du cube , celle de *Nicomede* est une des plus ingénieuses ( *b* ) ; ce Géometre le réduisit par une analyse très-subtile , à celui d'insérer dans un angle comme *a D b* , une ligne droite de grandeur donnée ,

( *a* ) *Collect. Mathem.* I. 3. p. 4.

( *b* ) *Nicomede* étoit un Géometre dont l'âge paroît devoir être fixé vers le second siècle avant J. C. car on sçait d'abord qu'il étoit postérieur à *Eratostenes* , qui fleurit dans le cours du troisième , puisque , suivant *Eutocius* , il se mocquoit de sa solution. D'un autre côté *Proclus* nous assure qu'il fut l'inventeur des conchoïdes , sur lesquelles *Geminus* , contemporain ou peu postérieur à *Hipparque* , écrit au long dans ses *Enarrationes Geometricæ* que nous n'avons plus ; ces deux circonstances fixent l'âge du Géometre dont nous parlons , entre *Eratostenes* & *Hipparque* , à peu près vers l'an 180 avant l'ère chrétienne.

qui étant prolongée passe par un point assigné  $P$  ; & comme cela ne se peut exécuter généralement par la Géométrie plane , il imagina pour y suppléer la conchoïde , avec un instrument propre à la décrire par un mouvement continu. La propriété de cette ligne  $aAa$  (fig. 29.) est telle que  $bBb$  étant son axe , toutes les lignes  $AB$  ,  $ab$  ,  $ab$  tirées des points de la courbe vers le pole  $P$  , sont égales entr'elles. La figure 30 représente l'instrument dont la construction est assez aisée à appercevoir pour m'en épargner l'explication. On voit facilement que cette ligne est propre par sa génération , à satisfaire au problème auquel *Nicomede* rappelloit celui des deux moyennes proportionnelles ; car soit un angle  $aDb$  , où il s'agit d'insérer la ligne  $ab$  , donnée de grandeur & de sorte qu'étant prolongée, elle passe par le point  $P$  : qu'on décrive sur l'axe  $bDBb$  , &c , une conchoïde dont le pole soit  $P$  , son intersection



avec le côté  $D a$  donnera évidemment le point  $a$  ; d'où doit être tirée la ligne  $a b$  vers le point  $P$ .

Cette construction préliminaire étant supposée , voici comment *Nicomede* résolvoit le problème des moyennes proportionnelles. Il faisoit d'abord un rectangle des lignes données  $AC$  ,  $CB$  , & il les divisoit chacune en deux également aux points  $I$  ,  $L$  ; il menoit ensuite la ligne  $DIH$  , & ayant élevé la perpendiculaire  $LK$  , telle que  $BK$  fût égale à  $CI$  , il tiroit  $KH$  , & sa parallèle  $BS$  ; c'étoit dans l'angle  $FBS$  qu'il falloit adapter la ligne  $SF$  égale à  $CI$  & passant par  $K$  , ce qui déterminoit le point  $F$  ; de sorte qu'en tirant  $FDG$  , les lignes  $BF$  ,  $AG$  étoient les moyennes cherchées.

A l'égard de la démonstration , il donnoit la suivante. J'ai crû devoir la rapporter ici , parce qu'elle est assez composée pour ne pas se présenter facilement , même à des Géometres habiles.

La ligne  $BC$ , disoit-il, étant partagée en deux également au point  $L$ , donne le rectangle de  $BF \times FC$ , plus le carré de  $BL$  égal au carré de  $FL$  : ajoutant donc de part & d'autre le carré de  $LK$ , on a  $CF \times BF + LB^2 + LK^2$ , ou  $CF \times BF + BK^2 = LF^2 + LK^2 = KF^2$  ; mais  $GA : AC :: BC : BF$  : donc  $GA : \frac{1}{2} AC$  ou  $AI :: 2 BC$  ou  $BH : BF$ . Conséquemment en composant,  $GI : AI :: HF : BF :: KF : SF$ , d'où il suit que  $GI$  est égal à  $KF$ , puisque  $AI$  est égal à  $SF$ . Maintenant  $GI^2 = CG \times GA + AI^2$  ; donc  $CG \times GA + AI^2 = CF \times BF + BK^2$  ; parce qu'on a montré plus haut que ces derniers rectangles étoient égaux à  $KF^2$  : donc ôtant ce qu'ils ont de commun, sçavoir,  $AI^2$  &  $BK^2$ , égaux par la construction, restera  $CG \times GA = CF \times BF$  ; d'où l'on tire la proportion  $CG : CF :: BF : GA$  : or,  $CG : CF :: DB$  ou  $AC : BF$  : donc  $AC : BF :: BF : GA$  ; mais  $AC : BF :: GA : AD$  ;

par conséquent ces quatre lignes sont en proportion continue.

Cette démonstration fait voir la raison du procédé d'*Appollonius*, d'*Heron* & de *Philon*; ils avoient réduit le problème à faire en sorte que  $CG \times GA$  fût égal à  $CF \times BF$ : or en décrivant un cercle  $ADBC$ , le premier de ces rectangles est égal à  $GE \times GD$ , & le second à  $FD \times FE$ ; il falloit donc que ces derniers fussent égaux, ce qui arrivera quand  $GD$  &  $EF$  seront égales, & que demandoient en effet *Philon* & *Heron* d'*Alexandrie*: l'autre construction attribuée à *Appollonius*, suit assez visiblement de celle-ci, pour me dispenser d'une explication.

La solution de *Nicomede* a l'avantage de réduire précisément à la même difficulté l'invention des deux moyennes proportionnelles & la trisection de l'angle; il est fort vraisemblable que ce fut l'objet qu'il se proposa, ou le hazard le servit bien heureusement: quoiqu'il

en soit, comme l'on a montré depuis que toutes les équations des troisième & quatrième degré se réduisent à ces deux problèmes, on voit déjà que la conchoïde peut servir à les construire avec la plus grande facilité. *Viete* en avoit fait la remarque; mais personne n'en a tiré meilleur parti que *M. Newton*. Cet illustre Géometre a donné pour chaque forme d'équation du troisième degré, la position du pole, & la grandeur de l'angle & de la ligne à y insérer. D'un avis différent de *Descartes*, dont il discute les motifs de préférence pour les sections coniques, il établit que la conchoïde est la courbe la plus commode pour construire les équations solides; les raisons que *M. Newton* en apporte dans son *Arithm. univers.* méritent d'être considérées.

XI. Il ne reste presque plus à parler que de la solution de *Diocles* (a); celle-

(a) *Diocles* est un Géometre dont l'âge n'est point connu. Je conjecture néanmoins qu'il

ci est encore une des plus remarquables. A l'imitation de *Nicomede*, ce Géometre imagina une courbe particuliere, ſçavoir, celle que nous appellons aujourd'hui la cyſſoïde, nom qui, pour le remarquer en paſſant, paroît avoir été commun à une claſſe entiere de courbes chez les Géometres anciens.

*Pappus* que je crois antérieur à *Diocles*, avoit réduit le problème des deux moyennes proportionnelles à la conſtruction ſuivante. Ayant diſpoſé à angles droits les lignes *DC*, *CL*, & tiré *DLO* (*fig. 31.*), il décrivait du centre *C* le demi-cercle *ABD*; après quoi il ſ'agiſſoit de trouver ſur la prolongation de *DL* un point *G*, tel que menant la ligne *AGH*, les ſegmens *GO*,

vivoit plus tard que *Pappus*, qui eſt du quatrième ſiècle, & je me fonde ſur le ſilence de cet écrivain, qui ne dit rien de ſa ſolution, quoiqu'il employe le même principe. *Eutocius* qui vivoit vers l'an 540, cite *Diocles* & ſon livre de *Pyriis*, des machines à feu; ce qui donne lieu de croire qu'il étoit un Ingénieur.

*OH* fussent égaux. La ligne *CO* étoit la première des moyennes cherchées; en voici la démonstration, qui nous donnera en même tems la propriété principale de la cyffoïde.

Les lignes *GO*, *OH* étant égales, il est évident que *CF*, *CK* le seront aussi, & par conséquent *KH* & *FE*: or *AK*: *KH* ou *FE* :: *AF*: *FG*; & d'un autre côté, à cause des triangles semblables, *HKD*, *AKH*, *AGF*, *KH*: *KD* ou *EF* :: *AF*, *AF*: *FG*. Donc *FE*, *AF*, *FG* sont en proportion continue; par conséquent les quatre lignes *AK* ou *DF*: *FE* *AF*, *FG* sont continuellement proportionnelles, & *FE*, la première des deux moyennes entre *AK* ou *DF* & *FG*; mais comme c'est entre *CD*, *CL* qu'on cherche les moyennes proportionnelles, & que ces deux lignes sont en même raison que *DF*, *FG*, il s'ensuit qu'ayant trouvé la première des moyennes entre ces dernières, il n'y aura plus qu'une simple analogie à faire

pour déterminer celle qui convient à  $CD$ , sçavoir celle-ci, comme  $DE$  à  $FE$ , ou  $AK$  à  $KH$ ; ainsi  $CD$  ou  $AC$  à  $CO$ : par conséquent  $CO$  est la première des moyennes cherchées.

On voit donc que dans toutes les différentes positions de la ligne  $DLE$ , ou de  $A FH$ , le point  $G$  qui résout le problème, est tellement situé, que  $GO = OH$ . De là *Diocles* prit occasion de décrire la courbe où se trouvent tous ces points; au lieu de les chercher mécaniquement. Alors la première propriété de cette courbe est, qu'ayant tiré une ordonnée quelconque  $EGF$ , les lignes  $DE$ ,  $FE$ ,  $AF$ ,  $FG$  sont en proportion continue. Il est aisé d'en faire l'application au problème des deux moyennes; car ayant mis les extrêmes à angles droits comme ci-dessus, décrit le cercle  $ABD$ , & la cyffoïde  $AgGB$ , la ligne  $DL$  prolongée la rencontre en  $G$ ; d'où tirant  $AGH$ , qui coupe  $CB$  en  $O$ , la ligne  $CO$  est la

premiere des moyennes. La construction de *Sporus* differe si peu de celles de *Pappus* & de *Dioscles*, qu'on a lieu de s'étonner qu'*Entocius* ait pris la peine de la developper au long; elle ne méritoit pas ce détail.

Je ne dois pas omettre une remarque qui releve beaucoup la solution de *Dioscles*; c'est qu'on peut décrire sa cysssoïde par un mouvement continu. *M. Newton* en a donné le moyen, & il ne faut pour cela qu'une simple équerre. Le point *P* éloigné de l'axe *CR* de la quantité du diametre *AD* ayant été pris pour pole, qu'on ait une équerre dont le petit côté soit égal à *AD*, & l'autre indéfini; si on la fait mouvoir de maniere que ce dernier côté étant appliqué au point *P*, l'extrémité du petit côté *R* coule le long de l'axe ou règle *CR*; le point *s* qui le partage en deux également, décrira la cysssoïde.

XII. Le problème de la trisection de l'angle est de la même nature que le



précédent ; son affinité avec lui m'engage à exposer d'abord les solutions qu'il reçut dans l'antiquité ; je viendrai ensuite aux recherches que l'un & l'autre ont occasionnées parmi les Modernes.

Les premiers moyens qui se présentent pour parvenir à la trisection de l'angle , sont les suivans , & ils sont si naturels qu'il est à présumer qu'ils ne furent pas long tems ignorés des Anciens. Si  $BAC$  ( *fig 32* ) est l'angle proposé , après avoir abaissé la perpendiculaire  $BC$  , formé le parallélogramme  $CG$  & prolongé  $CA$  indéfiniment , il s'agit de tirer la ligne  $BDE$  de telle manière que la partie  $DE$  soit égale à deux fois la diagonale  $AB$  ; alors l'angle  $DEC$  est le tiers de  $BAC$ . Les Géomètres les moins versés sont en état d'en appercevoir aussi-tôt la démonstration. Il étoit encore aisé de remarquer , que si d'un point  $C$  du demi - cercle  $ACD$  ( *fig 33* ) on tire  $CDE$  , de sorte que la partie  $DE$  interceptée entre la cir-

conférence & le diamètre prolongé, soit égale au rayon, on aura encore l'angle *DEF* égal au tiers de *ABC*.

On s'obstina sans doute long-tems à chercher la solution de l'un & de l'autre de ces problèmes par la Géométrie ordinaire, avant que de s'appercevoir qu'ils étoient d'une difficulté supérieure aux moyens que fournit cette Géométrie. Après un grand nombre de tentatives infructueuses, ou qui n'avoient produit que des paralogismes, on se tourna enfin du côté des sections coniques & de diverses autres courbes. *Pappus* (a) nous rapporte la maniere ingénieuse dont quelques Géometres employèrent l'hyperbole pour résoudre le premier de ces problèmes auxquels on avoit réduit celui de la trisection. Je vais l'expliquer en employant l'analyse qui servit à la trouver.

Que *DE* soit la ligne cherchée, & que l'on acheve le parallélogramme

(a) *Coll. Mathem. l. 4. prop. 31, 32.*

*GDEF,*

$GDEF$ , on voit d'abord que  $EC :: CB :: BG : GD$  ou  $EF$ ; conséquemment  $EF \times EB = AC \times CB$ ; d'où il suit que le point  $F$  est dans une hyperbole entre les asymptotes  $CH, CE$ , & passant par le point  $G$ ; mais  $DE$  est donnée de grandeur, par conséquent aussi son égale  $GF$ ; ce qui fait voir que le point  $F$  est aussi dans la circonférence d'un cercle, dont  $C$  est le centre &  $CF$  le rayon; il est donc dans l'intersection commune de l'hyperbole & du cercle; ce qui le rend aisé à déterminer, puisqu'il n'y a qu'à décrire une hyperbole par le point  $G$ , entre les asymptotes  $CE, CH$ , & tracer un cercle du centre  $C$  au rayon  $CF$  égal à  $2AB$ ; le point où ces deux courbes se couperont, sera tel qu'abaissant l'ordonnée  $FE$ , on aura le point  $E$  qu'on cherche & la position de la ligne  $DE$ .

On peut exécuter la même chose par le moyen de la conchoïde; car il est évident que celle qu'on décrira du pole

M

$P$ , avec les ordonnées convergentes à ce pôle de la longueur qu'on demande, coupera la ligne  $CE$  au point cherché ; ainsi cette courbe sert également à résoudre le problème de la trisection & celui des deux moyennes proportionnelles.

A l'égard de la seconde construction que représente la figure 33, on y satisfera aussi aisément en employant une conchoïde, non pas à la vérité celle dont on vient de parler, que les Anciens nommoient la *première* ; mais la *seconde*, qui se décrit au-dessous de l'axe, au lieu que l'autre est décrite au-dessus. Il est à propos de remarquer ici qu'on ne doit point regarder ces deux conchoïdes comme des courbes différentes ; elles sont les deux branches de la même courbe : c'est ainsi que les hyperboles opposées forment ensemble l'hyperbole entière, avec cette différence que ces dernières s'éloignent de plus en plus de leur axe commun, au

lieu que les branches de la conchoïde s'en approchent de plus en plus.

XIII. Les Anciens donnerent une autre solution du problème de la trisection de l'angle, où ils employèrent l'hyperbole d'une manière différente de celle qu'on a fait connoître un peu plus haut; c'est encore *Pappus* (\*) qui la rapporte: elle est si élégante qu'elle mérite qu'on en fasse mention; c'est une suite de cette belle propriété de l'hyperbole décrite entre des asymptotes, faisant un angle de  $120^\circ$ ; sçavoir, que prenant sur son axe une abscisse  $BA$ , égale à la moitié de l'axe transverse  $DB$  (*fig. 34.*), & tirant de ce point  $A$  & de l'autre extrémité de l'axe  $D$ , deux lignes à un point quelconque  $E$ , l'angle  $EAD$  est toujours double de  $EDA$ ; par conséquent si l'on décrit sur la ligne  $DA$  un arc quelconque, la partie  $AE$  en sera le tiers. Il est aisé de faire l'application de ceci à partager en trois éga-

(\*) *Coll. Mathem. l. 4. prop. 34.*

lement un angle ou un arc quelconque ;  
il n'y aura qu'à décrire sur la ligne  $DA$   
l'arc qui mesure l'angle donné  $DCA$ ,  
alors  $ECA$  en sera le tiers.

Il y a ici une particularité digne  
d'être observée : c'est que non seule-  
ment la même hyperbole retranche l'arc  
 $AS$ , égal au tiers de  $ASD$ , le res-  
tant du premier au cercle, mais que  
l'hyperbole opposée coupe le même arc  
dans un point  $E$ , tel que l'arc  $ACE$  est  
le tiers de la circonférence entière  
augmentée du petit arc  $AED$ . Les An-  
ciens ne paroissent pas avoir fait cette  
dernière remarque, elle auroit pu les  
étonner. A l'égard des Modernes, ils  
n'y trouveront aucun sujet de surprise ;  
ils savent que le problème conduit né-  
cessairement à une construction qui  
doit donner trois valeurs différentes à la  
corde cherchée.

XIV. Plusieurs courbes que les An-  
ciens considérèrent, semblent avoir été  
imaginées dans la vue de servir à ce  
plus de leur axe commun.

problème, du moins envisagé d'une manière plus générale : telles sont la quadratrice & la spirale ; dont la première n'a pas une date moins reculée que *Platon*. En effet, *Dionysius* son inventeur, étoit un des Géomètres de l'école platonicienne. On sçait que cette courbe est formée par l'intersection continue d'un rayon qui se meut d'un mouvement angulaire, & qui parcourt le quart de cercle ; tandis qu'une ligne toujours parallèle à elle-même, partant d'un même terme, se meut de la hauteur du rayon ; ainsi le mouvement angulaire de ce rayon est toujours mesuré par une ligne droite, ce qui fait qu'il est toujours facile de le diviser ; non seulement en parties égales, mais encore suivant un rapport quelconque donné, fut-il irrationnel ; il ne faudra pour cet effet que diviser cette ligne droite de la même manière, ensuite tirer les rayons par les points de la quadratrice qui répondent aux points de

division sur l'axe. La spirale ordinaire a évidemment la même propriété ; c'est aussi une suite de sa génération. Toutes les courbes enfin qui sont décrites par une combinaison de mouvemens rectilignes & circulaires, courbes dont la Géométrie moderne présente un grand nombre, jouissent du même avantage ; mais il est à remarquer que ces courbes ne résolvent le problème que par une espèce de pétition de principe ; il faut les supposer entièrement décrites, & pour les décrire en entier, il faudroit avoir ou la Quadrature indéfinie du cercle, ou la solution du problème général de diviser un angle en raison quelconque ; par conséquent les solutions qu'elles donnent ne sont que des spéculations, dont la pratique ne peut tirer tout au plus que des moyens d'approcher de la vérité.

XV. Les deux problèmes dont on vient de traiter l'histoire chez les Anciens, n'ont pas moins occupé les Mo-



dernes. Plusieurs de ces derniers se sont en effet exercés à en trouver de nouvelles solutions, dans le goût de celles qu'on vient de voir, c'est-à-dire dont les unes consistent dans quelque mécanisme commode & facile, les autres dans l'emploi de quelque courbe particulière. M. *Viète* (a) en a proposé quelques-unes de la première espèce, & après lui M. *Huygens* en a donné un assez grand nombre dans un ouvrage qu'il publioit fort jeune en 1654 (b). M. *Viviani* a construit ces problèmes de diverses manières élégantes & nouvelles dans plusieurs ouvrages (c). Le P. *Griemberger* (d) a imaginé quelques courbes particulières pour servir à la résolution du problème des deux moyen-

(a) *Suppl. Geom. Variarum de rebus math. respons. l. 3. c. 5.*

(b) *Illustrationum quarundam. problem. constructiones.*

(c) *Divin. in Aristaum. Solutio. probl. D. Comiers.*

(d) *Templi Salom. descriptio Thoma Villalpandi.*

nes proportionnelles, en quoi il a été imité par *Renaldini* (a) & *Barrow* (b). Comme la plupart de ces inventions, quoique belles & ingénieuses dans la théorie, n'ont pas une utilité bien marquée, ou me conduiroient trop loin si j'entreprendois de les expliquer, je me contenterai de les avoir citées, afin de passer à ce que mon sujet me présente de plus intéressant.

Le *P. Geva* (c) a proposé un compas de trisection, qui est fondé sur ceci. Soit l'angle  $BAD$  (fig. 35), & que les côtés  $AB$ ,  $AD$ ,  $BC$ ,  $DC$ , de même que  $CF$ ,  $CE$ , soient tous égaux entr'eux, l'angle  $FCE$  sera triple de  $BAD$ , & si l'on continuoit cette progression de lignes égales, on auroit des angles quintuples, septuples du premier; ainsi la construction de ce compas consiste en deux longues branches  $FA$ ,  $AE$  mo-

(a) *De resol. & comp. Mathem.* t. 3.

(b) *Lectiones Geom.*

(c) *Act. Erud.* ann. 1695.

bles, auxquelles sont attachées par des charnières *B.F.* & *D.E.*, les petits côtés qui se meuvent sur une charnière commune en *C.* On a revendiqué dans les mêmes Journaux, un instrument, tout à fait semblable à *M. Tschirnhausen.*

XVI. Quoique les Anciens paroissent avoir résolu ces deux problèmes autant qu'ils peuvent l'être, puisque ne pouvant les construire que par des courbes d'un genre supérieur au cercle, ils y ont employé les sections coniques, la conchoïde &c. de diverses manières très-ingénieuses; cependant on peut dire que ce n'est qu'à la Géométrie moderne qu'est dûe leur solution complète. Ce sont en effet seulement les lumières qu'elle nous fournit, qui nous mettent en état de faire voir qu'ils sont d'une nature à ne pouvoir être généralement résolus par la Géométrie plane, ce qui étoit un point nécessaire à démontrer avant de cesser ses efforts pour y parvenir par cette voye; mais l'analyse mo-

derne leve tout doute à cet égard. D'ailleurs ce que les Anciens ont donné sur ce sujet, comparé aux inventions des Géometres du dernier siècle, n'est qu'un foible jour à côté d'une grande lumiere. Nous sommes aujourd'hui en possession d'une méthode par laquelle on peut trouver d'une infinité de manieres la solution de ces problèmes, & de tous les autres de même espece.

Avant que d'aller plus loin, il est essentiel de démontrer ce que nous avons annoncé dans tant d'endroits, je veux dire l'impossibilité de construire généralement ces problèmes, sans employer de courbe plus composée que le cercle. Je vais donc tâcher de le faire avec toute la clarté dont pareil sujet est susceptible, afin que personne ne soit plus tenté d'en rechercher la solution par des voyes qui ne sçauroient y conduire.

Cette impossibilité est fondée sur la théorie des équations & la nature des

courbes géométriques; ainsi je suis obligé d'en rappeler quelques points en faveur de ceux à qui elles ne seroient pas assez présentes. Le premier est que dans toute équation, la quantité inconnue doit être représentée par autant de valeurs différentes qu'il y a d'unités dans l'exposant de sa plus haute puissance : à la vérité il peut arriver que quelques-unes de ces valeurs soient imaginaires; mais on examinera ce cas, & on fera voir qu'il ne nuit point aux conséquences qu'on tire dans les autres.

Le second principe est, qu'une équation ne se peut construire géométriquement, c'est-à-dire par un procédé certain & qui n'est sujet à aucun tâtonnement, qu'à l'aide de deux lignes qui se puissent couper en autant de points que le degré de l'équation comprend d'unités; en voici la raison. Construire une équation, c'est assigner par une opération générale la valeur de l'inconnue qu'elle renferme; conséquemment

lorsque cette inconnue en aura plusieurs, il faudra une construction capable de les exprimer toutes également; car cette construction n'en regarde pas plutôt l'une que l'autre, puisque les donnés sont les mêmes à leur égard, & que ce sont eux seuls qui peuvent la modifier. Il faut donc que les lignes dont l'intersection doit résoudre le problème, puissent s'entrecouper en autant de points qu'il admet de solutions différentes.

Ce qu'on vient de dire est d'une évidence suffisante, lorsque l'équation proposée a toutes ses racines réelles; mais peut-être n'en trouvera-t-on pas autant dans le cas où elle aura des racines imaginaires. Comme il y a alors quelques valeurs de moins à déterminer, il semblera qu'il n'est pas nécessaire d'employer des courbes capables de se couper en autant de points que s'il n'y en avoit aucune d'impossible.

Ce doute n'est pas dénué de fon-

dement ; il se dissipera néanmoins quand on connoîtra quelle est la nature & l'emploi des valeurs imaginaires dans les équations : ces valeurs ne deviennent telles que parce que certains donnés du problème croissant ou diminuant selon les circonstances , de réelles & inégales qu'elles étoient d'abord , elles sont devenues égales , deux points d'intersections se confondant ensemble , & formant un point de contact ; & qu'enfin ce point de contact disparoît lui-même , l'une des courbes ne touchant ni ne coupant plus l'autre dans cet endroit , de sorte qu'il n'y a plus d'ordonnée. Cela montre que ces racines imaginaires sont toute autre chose qu'un *merum nihil* , & qu'elles ont une sorte d'existence , en ce qu'elles désignent des intersections , que des limitations particulières ont rendues impossibles : toutes les fois donc qu'il y en aura de cette espece dans une équation , il n'en faudra pas moins des courbes qui puis-

sent s'entrecouper en autant de points que si toutes les racines étoient réelles, afin que toutes les intersections qui auront lieu exprimant ces dernières, celles qui viennent à manquer désignent les imaginaires.

Après l'exposition de ces principes, il est aisé de montrer qu'il est impossible de construire généralement les problèmes de la trisection de l'angle & des deux moyennes proportionnelles, par des lignes simples, comme la droite & la circulaire. Il est en effet visible que l'équation qui convient au premier est nécessairement du troisième degré, puisque c'est le cube de la ligne cherchée, qui égale un parallépipède donné, & cette équation qui est de cette forme  $x^3 = a^2 b$  ( $a$  &  $b$  étant les deux extrêmes), sera toujours irréductible, à moins que  $b$  ne soit un tel multiple de  $a$ , que l'exposant de ce multiple ait une racine cube, parce qu'alors



l'extraction de la racine cubique réussiroit.

A l'égard du second problème, il est pareillement nécessaire qu'il soit du troisième degré, & nous allons en convaincre par les remarques suivantes. Quand on propose de partager un arc  $AB$  en trois également, c'est la même question que si l'on demandoit d'inscrire dans un segment dont  $AE$  est la corde, un quadrilatere tel que  $ABCD$ , dont les trois côtés  $AB$ ,  $BD$ ,  $DE$  soient égaux; or ce problème est de telle nature qu'il est susceptible de trois cas qui conduisent absolument à la même équation; car tous les donnés & la maniere de les employer sont les mêmes, soit qu'il s'agisse d'inscrire ce quadrilatere dans le petit ou dans le grand segment (*fig. 36, 37*), & même lorsqu'il s'agira d'en inscrire un de la forme  $abde$  (*fig. 36*), dans le dernier, de sorte qu'on doit aboutir à la même expression. Comme je ne connois aucun livre qui démontre

cette vérité, je crois qu'il est à propos de le faire ici avec quelque détail, afin de ne laisser aucun doute à ce sujet. Je pourrois sans doute m'en dispenser si je n'écrivois que pour les Géometres habiles, mais il est des endroits dans cet ouvrage qui sont particulièrement destinés à l'instruction des plus médiocres.

Dans le premier cas, les triangles  $ABC$ ,  $BAF$  sont semblables, puisque l'angle  $B$  est commun, & que l'angle  $C$  a pour mesure l'arc  $AB$ , tiers de  $ABE$ , tandis que l'angle  $A$  est appuyé sur les deux tiers du même arc, & a son sommet à la circonférence; ainsi  $CA : AB :: AB : BF$ . Ayant donc nommé le rayon  $r$ ,  $AE = b$ , &  $AF$  ou  $AB = x$ , nous aurons  $r : x :: x : \frac{x^2}{r}$ ; ensuite tirant  $DL$  parallèle à  $BC$ , on a  $CD : DB :: DG$  ou  $BF : LG$ , à cause des triangles semblables  $CDB$ ,  $DLG$ ; c'est pourquoi  $r : x :: \frac{x^2}{r} : \frac{x^2}{rr}$ , qui est la valeur de  $LG$ ; or  $AE = AF +$

$BF$  ou  $AB$  ou  $DF + EL$  ou  $EG - LG$ , d'où l'on tire  $b = 2x + \frac{rrx - x^3}{rr}$ , ce qui donne l'équation  $x^3 - 3rrx + rrb = 0$ .

Qu'il s'agisse à présent d'inscrire un pareil quadrilatere dans le grand segment, on aura de même les triangles  $fab$ ,  $acb$  semblables, de sorte que  $\frac{xx}{r}$  fera encore ici la valeur de  $bf$ ; de plus en tirant  $dl$  parallele à  $bf$ , on a les triangles  $ldg$ ,  $fb a$  équiangles; ce qui donne  $dg:lg::cb:bd$  ou  $r:x::\frac{x^2}{r}:\frac{x^3}{rr}$ ; ainsi  $lg = \frac{x^3}{rr}$ ; enfin  $Ca = af + fl - le$ , c'est-à-dire  $b = 2x + \frac{x^3}{rr} + x$ , d'où vient l'équation  $rx b = x^3 - 3rrx$ , ou comme ci-dessus  $x^3 - 3rrx + rrb = 0$ .

Le troisième cas nous fournira la même équation, par une analyse tout-à-fait semblable, pourvû que nous fassions ici attention que la ligne  $EF$  ou  $af$ , ayant été nommée  $x$ , quand elle tomboit au dedans du cercle, on devra la nom-

mer  $-x$ , lorsqu'il faudra la prendre au dehors de  $D$  vers le côté opposé. Après cette observation dont la nécessité est évidente pour tous ceux qui sont un peu versés dans l'analyse, on remarquera que les triangles  $\kappa\epsilon\alpha$ ,  $\epsilon\alpha\phi$  sont semblables, comme l'étoient leurs homologues dans les figures précédentes; ainsi  $r : -x :: -x : \frac{x^2}{r}$ , qui est la valeur de  $\epsilon\phi$ ; & ayant tiré comme on a fait ci-devant  $\delta\lambda$  parallèle à  $\epsilon\phi$ , on aura  $\phi\lambda = \epsilon\delta$  ou  $\epsilon\alpha = -x$ ; par conséquent  $\alpha\lambda$  sera  $-2x$ ; de plus les triangles semblables & égaux  $\gamma\epsilon\delta$ ,  $\alpha\epsilon\phi$  donnent  $\gamma\epsilon = \alpha\phi = -x$ ; enfin à cause des triangles  $\epsilon\kappa\delta$ ,  $\gamma\delta\lambda$  on a  $\epsilon\kappa : \epsilon\delta :: \delta\lambda$  ou  $\epsilon\phi : \gamma\lambda$ , c'est-à-dire,  $r : x :: \frac{x^2}{r} : -\frac{x^3}{rr} = \gamma\lambda$ ; mais  $\epsilon\alpha = \gamma\lambda = \gamma\epsilon = \alpha\lambda$  ou  $\epsilon = -\frac{x^3}{rr} + 3x$ , d'où nous aurons pour la troisième fois  $x^3 - 3rrx + rrb = 0$ .

Si l'on proposoit d'inscrire un semblable quadrilatere dans le petit segment,

la réponse seroit aisée. Il est visible du premier coup d'œil que cela est impossible, à moins que ce quadrilatere ne soit confondu avec  $AE$ , ou supposé en être infiniment voisin, ce qui donneroit par la plus simple analyse  $x = b$ ; ainsi ce dernier cas ne conduit point à la même équation que les précédens, & par cette raison celle qui convient au problème de la trisection de l'angle est du troisième degré & ne le passe pas.

Qu'on se rappelle maintenant les principes qu'on a établis plus haut; il est aisé d'en faire l'application aux problèmes dont nous venons d'examiner la nature. Puisque nous avons démontré qu'ils conduisent nécessairement à des équations du troisième degré; il est évident qu'on ne peut les construire en n'y employant que des courbes capables de donner moins de trois points d'intersection. Ceux qui tâchent de combiner des cercles & des lignes droites pour parvenir à cette solution, perdent in-

fructueusement leur temps & leurs veilles.

On peut donner à cette démonstration un tour qui la rendra encore plus propre à convaincre l'esprit de cette impossibilité. Supposons que quelque voit particulière eût conduit à construire généralement le problème de la trisection de l'angle par la seule Géométrie élémentaire; comme il est d'ailleurs démontré qu'il dépend d'une équation irréductible où la corde cherchée a trois valeurs inégales, on auroit la construction de cette équation, & par conséquent la même opération résoudroit de la même manière trois problèmes dont les solutions doivent être différentes. La Géométrie seroit donc ici en défaut, ce qui est absurde; une science fondée sur des raisonnemens dont la liaison est évidente & des principes certains, ne scauroient jamais conduire à l'erreur.

On objectera peut-être qu'il ne laisse pas d'y avoir des cas où l'on réussit par

la Géométrie plane à diviser un arc en trois parties égales ; tels sont ceux où l'on propose le cercle entier ou quelque une de ses parties aliquotes pareillement paires. Cette observation quoique vraie, ne détruit cependant pas ce que nous venons de dire ; il y a en effet quelques cas particuliers où la corde  $b$  a une telle valeur que l'équation peut être abaissée en la divisant par une de ses racines ; mais cette équation considérée généralement n'en est pas moins irréductible. C'est ainsi que la racine de  $ax - x^2$  ne peut être exprimée en termes finis ; quoiqu'il soit possible quelquefois d'en extraire la racine exactement ; sçavoir, lorsque  $a$  &  $x$  ont des valeurs tellement combinées qu'elles représentent un quarré parfait.

XVII. *Descartes* a donné le premier des règles-générales pour construire les équations solides par une combinaison du cercle & des sections coniques (1).

(1) *Geom. lib. 3.*

& il les a appliquées à la résolution des deux problèmes de la trisection & des deux moyennes proportionnelles. La maniere dont il les résoud est très-simple & mérite d'avoir placé ici. Dans le cas des moyennes proportionnelles, les extrêmes étant  $a$  &  $b$ , il décrit une parabole au parametre  $a$ , & prend une abcisse  $DC$  sur l'axe égale à  $\frac{1}{2} a$ , après quoi il élève une perpendiculaire sur le point  $C$  égale à  $\frac{1}{2} b$ ; le cercle décrit par le point  $D$  comme centre, & passant par le sommet de la parabole, la coupe dans un autre point, dont l'ordonnée abaissée sur l'axe, est la premiere des moyennes cherchées, & l'abcisse qui lui répond est la seconde. S'il s'agit de diviser un arc en trois également, que  $r$  soit le rayon,  $b$  la corde de l'arc proposé, il décrit une parabole au parametre  $r$ ; puis ayant pris sur l'axe une abcisse  $Ad$  égale à  $2r$ , il élève la perpendiculaire  $de$  égale à  $\frac{1}{2} b$ ; le cercle décrit du point  $e$ , comme centre, par le



sommet de la parabole ; la coupe en trois autres points  $G, g, \gamma$ , dont les trois ordonnées sont les trois valeurs de la corde cherchée ; sçavoir,  $GK$  la plus petite, la corde du tiers du petit arc ;  $gk$  la moyenne, celle du restant au cercle entier, & enfin la plus grande qui égale les deux autres prises ensemble, est celle du tiers de la circonférence augmentée du petit arc.

Les Géomètres qui ont succédé à *Descartes*, marchant sur ses traces, ont beaucoup ajouté à ces inventions. *M. de Sluse* est un des principaux : on lui doit d'avoir fait connoître le véritable principe de la construction des équations par les lieux géométriques, & d'avoir enseigné à les varier de plusieurs manières, en employant telle courbe qu'on voudra combinée avec telle autre. C'est là l'objet du sçavant ouvrage (a) qu'il

(a) *Mesolabum, seu dua media proportionales per circulum & ellipson. vel hyp. inscriptis modis exhibita, in 4°. Leodii, 1654.*

publia en 1654, où il réfoud le problème de la duplication du cube d'une infinité de façons : cet ouvrage étoit écrit suivant le style des anciens Géomètres, & à leur imitation son Auteur cachoit la méthode qui l'avoit conduit aux découvertes qu'il y exposoit; il la dévoila seulement en 1668, suivant la promesse qu'il en avoit donnée dans la préface du traité dont on vient de parler (a). Je me livrerois volontiers à expliquer cette méthode si je ne craignois d'être trop long; je me contenterai de renvoyer aux Auteurs sans nombre qui l'ont expliquée. M. *Wolf* sur tout l'a exposée avec beaucoup de précision & de netteté dans son cours de Mathématiques (b); il seroit à désirer, & pour l'avantage de ceux qui cherchent à s'initier dans ces sciences, & pour la réputation de son Auteur, que toutes les parties de ce cours répondissent à celle-là.

(a) *Mesolabium unâ cum adjunctis Miscel.*

(b) *Elem. analys.* T. 1. chap. 7 & 8.

XVIII. Je ne puis mieux terminer le récit des travaux des Géomètres sur les deux célèbres problèmes qui nous ont occupé dans ce chapitre, qu'en exposant quelques-unes des belles solutions que M. *Newton* en a données (a). J'ai déjà dit ailleurs qu'il avoit fait voir, contre le sentiment de *Descartes*, que ce n'étoit pas le degré de composition des équations des courbes, mais uniquement le degré de facilité à les décrire qui devoit déterminer à faire usage des unes plutôt que des autres. Suivant ce principe, M. *Newton* employe la conchoïde à trouver les deux moyennes proportionnelles & la trisection de l'angle, & il le fait avec une élégance fort supérieure à celle des solutions du Géomètre ancien, du moins dans le cas du premier de ces problèmes; je vais mettre le Lecteur en état d'en juger. Les deux extrêmes données étant  $a, b$ , il

(a) *Arithm. univers. appendix de constructione equationum.*

prend (fig 40)  $KA = a$ , & après l'avoir partagée en deux également en  $C$ , il décrit du centre  $K$  une circonférence circulaire  $CX$ , &c. où il inscrit  $CX = b$ ; alors si l'on insère dans l'angle  $EXT$ , la ligne  $ET$  convergente au point  $K$  & égale à  $\frac{1}{2} a$ , les quatre lignes  $KA$ ,  $XT$ ,  $KE$ ,  $CX$  seront en proportion continue. A l'égard de la trisection de l'angle, la corde de l'arc proposé (fig. 41.) étant  $CX$ , &  $CA$  le diamètre, il suffit de prolonger indéfiniment  $AX$ , & d'adapter dans l'angle  $EXC$ , la ligne  $ET = CA$ , & convergente au centre  $K$ , l'arc  $XV$  sera le tiers cherché. Cette dernière construction revient, à la vérité, à celle de *Nicomede*; mais elle est une suite de la règle générale que *Newton* a établie plus haut pour la construction de tous les problèmes de cet ordre: la première est également neuve & recommandable par sa simplicité. *M. Newton* en donne un grand nombre d'autres dans le même.

Ouvrage auquel je renvoye. Ce livre, quoique élémentaire, doit être entre les mains de tous les Géomètres, comme étant marqué, ainsi que toutes les autres productions de ce grand homme, au coin de son génie, & d'ailleurs contenant des recherches & des questions qui ne sont pas au dessous des plus habiles en géométrie.

XIX: Il y eut dans l'antiquité, comme à présent, un grand nombre de prétendues solutions de ces deux problèmes par la Géométrie plane; Pappus (a) nous le dit d'une manière expresse, & le commencement de son troisième livre des *Collections mathématiques*, est employé à réfuter une de ces solutions. Les autres tentatives de cette espèce ont eu le sort qu'elles méritoient, & ne nous sont pas parvenues. Depuis le renouvellement des sciences parmi nous, les fausses duplications du cube ou trisections de l'angle, sont presque aussi

(a) *Coll. mathem. préf. liv. 3.*

communes que les prétendues Quadratures du cercle, & même rien n'est plus ordinaire que de voir ceux qui se vantent d'être en possession du dernier problème, annoncer en même temps les deux autres. *Oronce Finée*, *Joseph Scaviger*, *Delaten*, les sieurs *Clerget*, *Liger*, &c. en font des exemples. Je pourrois aisément former un article assez étendu de leurs malheureuses tentatives; mais les mêmes raisons qui m'ont fait terminer le chapitre précédent, malgré l'abondante matière qui se présente encore pour le grossir, me font mettre fin à celui-ci. S'il est certaines erreurs qui méritent l'attention des Philosophes, il n'en est assurément pas ainsi de celles de ces pygmées en géométrie, elles ne sont dignes que de l'oubli qui les dérobe à la connoissance des Géomètres.



---

*Addition au Chapitre III.*

**O**N a dit dans ce chapitre, en parlant de la démonstration que *M. Gregori* a voulu donner de l'impossibilité de la Quadrature du cercle, qu'elle ne concluoit bien qu'à l'égard de l'indéfinie. Après avoir réfléchi plus attentivement sur cette démonstration, il me paroît que *M. Gregori* a eu raison d'en déduire l'impossibilité de la Quadrature même définie du cercle; car s'il est vrai, comme il semble qu'on ne peut le lui contester, qu'en général le rapport d'un segment ou d'un secteur au polygone inscrit ou circonscrit ne peut être exprimé par une fonction finie, il est évident que cela aura également lieu à l'égard du cercle entier, & de quelque segment ou secteur particulier que ce soit. Il n'y aura donc dans le cercle aucun segment ou secteur dont le rapport avec une figure rectiligne puisse

294 *QUADRATURE DU CERCLE.*  
être exprimé en termes finis; ce qui  
exclut la Quadrature du cercle entier, &c  
de tout autre segment quelconque.

*FIN.*



Fig. 2.




Fig. 4.




Figure 1.









Fig 6




294 QUADRATURE DU CERCLE.

être exprimé en termes finis; ce qui  
exclut la Quadrature du cercle entier, &c  
de tout autre segment quelconque.

F I N.










Fig. 14.



294 *QUADRATURE DU CERCLE.*  
être exprimé en termes finis; ce qui  
exclut la Quadrature du cercle entier, &  
de tout autre segment quelconque.

*FIN.*

Fig. 2.




Fig. 4.




Figure 1.






Fig 6







2.

Fig. 23.






Fig. 25.




6.

Fig. 27.









32.

Fig 34.








Fig. 36.














# T A B L E

## ALPHABETIQUE

### DES MATIERES.

Le nombre romain désigne le chapitre, & le chiffre arabe indique l'article.

#### A.

**A** *Naxagore.* Il recherche la Quadrature du cercle dans la prison, chap. II. part. 2

*Antiphon.* Il compare le cercle à un polygone d'un nombre infini de côtés; il est désapprouvé dans l'antiquité, mais à tort, II. 6

*Appollonius.* Il enchérit sur l'approximation d'Archimede, II. 10. Sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, VI. 8

*Approximations.* Ce que c'est, & leur utilité, I. 5, 11. Diverses approximations: celle d'Archimede II. 7. De Mélius, III. 2: De Viète, III. 3. D'Adrianus Romanus, III. 4. De Ludolph, *ibid.* De M.M. Sharp, Machin, de Lagni, IV. 18.

*Archimede.* Sa mesure approchée du cercle, II. 7 & *suiv.* Son adresse dans ses calculs, *ibid.* 2

- Architas*. Idée de sa solution peu praticable, néanmoins ingénieuse, du problème des deux moyennes, VI. 4
- Aristophane*. Trait de ce comique sur la Quadrature du cercle & sur Meton, II. 3
- Arithmétique de l'infini*. Son objet, cultivée par Fermat, Descartes, Roberwal, Cavalleri, augmentée par Wallis, perfectionnée par Newton, & aboutissant au calcul intégral, IV. 2, 3 & suiv.
- Aynstom*, disciple de Gregoire de S. Vincent, défend la Quadrature, III. 9

## B.

- Basselin*. Sa Quadrature embrouillée, V. 2.
- Bernoulli*. Idée de sa méthode pour déterminer les limites de plus en plus rapprochées du cercle, V. 25
- Brounker* (Mylord). Son expression en fraction continue, de la grandeur du cercle, IV. 6
- Bryson*. Son erreur sur la grandeur du cercle, II 6. V. 2.

## C.

- Cercle*. ( Quadrature du ) Voyez Quadrature.
- Cusa*. ( le Cardinal de ) Fausses quadratures qu'il propose, réfutées par Regiomontanus, III. 1. V. 4

## D.

- Descartes*. Ses constructions du problème des deux moyennes & de la trisection de l'angle, VI. 17

## DES MATIERES. 197

- Dinostrate**, Géometre platonicien, inventeur de la quadratrice, l'employe à la trisection de l'angle, *chap. VI. 14*
- Diocles**. Sa solution du problème des deux moyennes par la cissoïde, *VI. 10*
- Duchesne**, Quadrature réfuté par Pierre Me-tius, lui donne lieu de trouver son rapport fameux, *V. 5*

### E.

- Eratostenes**. Idée de sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, *VI. 6*
- Endoxe** résout le même problème par certaines courbes. Jugemens contradictoires que portent de lui Eutocius & Eratostenes, *VI. 5*
- Euler**. (M.) Application qu'il fait des fractions continues à déterminer les limites les plus simples du cercle, *IV. 7*. Maniere dont il exprime l'arc de  $45^\circ$ . par deux suites convergentes & rationnelles, *IV. 20*. Sa méthode pour la sommation des suites, appliquée à la mesure du cercle, *IV. 23*

### F.

- Fraction continue**. Expression dont on a un exemple, *ch. IV. 6*. Un de leurs usages, *ibid. 7*

### G.

- Gregori**, (Jacques) Géometre anglois, son livre *De verâ circuli & hyperbolæ quadratura*. Il y démontre l'impossibilité de la qua-

drature de ces courbes. Précis de sa démonstration, I L. 10. Sa querelle avec Huygens à ce sujet, *ibid.* Ses approximations communes au cercle & à l'hyperbole, *ibid.* Il donne une suite pour le cercle, IV. 11. Il découvre la méthode de Newton. Il trouve le premier la suite de l'arc par la tangente, & fait diverses autres découvertes analytiques. Eloge de ce Géometre, *ibid.*  
**Grégoire de S. Vincent.** Voyez S. Vincent.

## H.

**Heron d'Alexandrie.** Sa solution du problème des deux moyennes, VI. 2  
**Hippocrate de Chio.** Cherche la Quadrature du cercle, & trouve sa lunule absolument quarrable, I L. 4. Mauvais raisonnement qu'on lui attribue, & sa justification, I L. 9  
**Hobbes.** Prétend avoir trouvé la Quadrature du cercle, la duplication du cube, &c. Réfuté par Wallis, il s'en prend à la Géométrie, & veut la réformer entièrement. Il entasse mille pitoyables réponses, V. 2  
**Huygens.** Son livre intitulé, *Novæ de circuli magnitudine inventa.* Il y perfectionne les inventions de Snellius, III. 7. Approximations géométriques qu'il y donne de la circonférence & des arcs de cercles, *ibid.* Autre ouvrage du même Auteur, sçavoir, *Novæ theorematæ de circuli & hyperbolæ quadratura.* Ce qu'il contient, *ibid.* 8. Il réfute Grégoire de S. Vincent, *ibid.* 9. Sa querelle avec Gregori, *ibid.* 10.

## I.

*Interpolations*, (méthode des) inventée par Wallis. Ce que c'est, IV. 3. Usage qu'il en fait pour la Quadrature du cercle; & ce qu'il en retire, *ibid.* 4. Newton la perfectionne, & elle le conduit au calcul intégral, *ibid.* 8

## K.

*Kolhanski* (le Pere). Approximation géométrique fort élégante, qu'il donne pour la circonférence du cercle. Note de l'art. 7. III.

## L.

*Lagni* (M. de) trouve la suite de l'arc par la tangente, IV. 13. Son rapport de la circonférence au diamètre, exprimé en 127 chiffres, IV. 18

*Leibnitz*, un des inventeurs de la suite de l'arc par la tangente. Sa justification du plagiat que lui ont reproché quelques anglois à ce sujet, IV. 12, 13

*Leotaud* (le P.), Jésuite, un des agresseurs de la Quadrature de Gregoire de S. Vincent, en démontre solidement la fausseté contre lui & ses défenseurs, III. 9

*Longitudes*. Elles ne dépendent point de la Quadrature du cercle; c'est une simplicité de le penser, I. 10

*Longomaneus*. Il se persuade avoir trouvé la Quadrature du cercle, V. Raison qu'il assigne pour celle du diamètre à la circonférence, *ibid.*

*Ludolph à Ceulen.* Ses travaux & son approximation de la circonférence en trente-cinq décimales , III. 4, 5

*Annule d'Hippocrate de Chio.* Addition qu'y font divers Géomètres modernes. En note ,

II. 4

M.

*Machin ( M. ).* Pousse l'approximation de Ludolph à cent chiffres , IV. 18

*Malleme de Messange ,* est célèbre par mille impertinens systêmes physiques , & de plus par ses présearions sur la Quadrature du cercle , V. 10

*Mashulon ( le sieur ) ,* Quadrateur , puni par la perte d'une somme de mille écus , pour avoir défié les Géomètres de démontrer qu'il s'étoit trompé , V. 10

*Menechme ,* Géometre platonicien , résout le problème des deux moyennes , par les sections coniques , de deux manieres différentes , VI. 5. Remarque sur ses solutions , *ibid.*

*Metius.* Rapport approché qu'il donne de la circonférence au diamètre , son avantage , III. 2. Il réfute Duchesne , V. 4

*Moton ,* est mis sur la scene par Aristophane , au sujet de la Quadrature du cercle , II. 3

*Moyennes proportionnelles continues ,* ( problème des deux ) ; Son histoire , VI. Résolu mécaniquement par Platon , 3. D'une maniere trop intellectuelle & trop peu praticable par Architas , 4. Scayamment par Menechme , 5. Solution d'Eratostenes , 6. Celles de Heron , Philon , Appollonius , 7.

## DES MATIERES. 307

Nicomede y applique la conchoïde, 8. Dio-  
scles la cissoïde, 9. Solution de Pappus &  
de Sporus, *ibid.* Indication de diverses solu-  
tions modernes, par Viète, Huygens, &c.  
V I. 24. Il est impossible de résoudre ce pro-  
blème par la Géométrie plane, 15. Des-  
cartes le résout avec une parabole & un cer-  
cle, 17. Solution élégante qu'en donne  
Newton, 18.

### N.

**Newton.** Il travaille d'abord sur les idées de  
Wallis, & trouve la première suite pour la  
mesure indéfinie du cercle, IV. 8. Il est  
bientôt en possession d'une foule de décou-  
vertes analytiques, & entr'autres du calcul  
intégral, 10. Ses diverses suites pour les  
arcs & les segmens circulaires, IV. 10, 14.  
Sa méthode pour la dimension des courbes,  
par le moyen de quelques ordonnées équi-  
distantes, IV. 23. Démontre l'impossibi-  
lité de la Quadrature indéfinie du cercle,  
III. 17

**Nicomede.** Sa solution du problème des deux  
moyennes proportionnelles par la conchoï-  
de. Avantage qu'elle a. Elle est fort approu-  
vée par Newton, qui l'imite dans tous les  
autres problèmes solides, VI. 8

### O.

**Oronas Finés;** Mathématicien de quelque cé-  
lébrité dans le seizième siècle, se trompe  
ridiculement sur la Quadrature du cercle &c.

divers autres problèmes fameux, V. 6. Réfuté par Buteon, Nonius, &c. *ibid.*

## P.

- Philon** de Byzance. Sa solution du problème des deux moyennes, V L. 7.  
**Philon** de Gadare, ancien approximateur, II. 10.  
**Platon**. Il résout mécaniquement le problème de la duplication du cube, VI. 3.  
**Porta** (Jean-Baptiste), Médecin napolitain, travaille sur les lunelles circulaires, pour trouver la Quadrature du cercle, & se trompe, V. 8.

## Q.

- Quadratrice**. Ses propriétés dépendantes de la Quadrature du cercle, I. 7. Leur inutilité pour y parvenir, II. 2.  
**Quadrature du cercle**. Ce que c'est, I. 2. Quadrature absolue, 3. ou approchée, 4. définie ou indéfinie, 8. Quelle est son utilité, 9. Si elle sert aux longitudes, 10. Elle est soupçonnée impossible par Wallis, IV. 5. Tout le monde convient que l'indéfinie est impossible, III. 11. Démonstration qu'on en donne, *ibid.* Gregori prétend la Quadrature définie impossible, III. 10. & l'on croit que sa démonstration est concluante. *Addition à la fin*. Voyez enfin tout le sommaire de cet ouvrage.

## R.

- Regiomontanus** réfute le Cardinal de Cusa, III. 1. V. 4.  
**Romanus** (Adrianus) donne une approxima-



tion en dix-sept chiffres, III. 4. Réfute Scaliger, V. 7

## S.

- Sarassu** ( le P. de ), défenseur de Gregoire de S. Vincent, écrit pour sa quadrature. Sa défense est sçavante & solide par tout ailleurs que sur le point contesté, III. 9
- Scaliger** ( Joseph ). Sa pitoyable Quadrature & ses autres prétentions réfutées, V. 7
- Sharp** ( Thomas ). Pousse l'approximation de Ludolph à soixante-quinze chiffres, IV. 18.
- Simpson** ( M. Thomas ). Sa méthode pour la sommation approchée des suites, IV. 21. Moyen fort simple qu'il donne pour la dimension descourbes par les ordonnées équidistantes, *ibid.* 24.
- Sluse** ( M. de ). perfectionne la regle de Descartes, pour la construction des équations solides, VI. 17. Résout le problème des deux moyennes d'une infinité de manieres, *ibid.*
- Snellius** ( Willebrord ), moyens qu'il imagine pour rapprocher les limites de la circonférence circulaire, & les calculer à moins de frais, III. 6. Ses autres découvertes & travaux dans ce genre, *ibid.*
- Spirale**, son inutilité pour parvenir à la Quadrature du cercle, I. 7. II. 11, 12
- Sporus**, sa solution peu différente de celle de Pappus, VI. 10
- Suite ou serie**. Suites particulieres de Gregori, III. 10. Inventions des suites par Newton, IV. 8. Diverses suites pour l'aire, pour l'arc, pour le sinus ou le cosinus, IV. 10. Maniere de les employer, IV. 15, 16, 17. Maniere

304 TABLE DES MATIERES:  
de les Sommer par approximation , IV. 21, 22  
T.

*Trisection de l'angle.* Problème solide & irrésoluble par la Géométrie ordinaire, VI. 15. Questions auxquelles on voit d'abord qu'elle se réduit, VI. 11. Manieres différentes dont les Anciens les résolurent, *ibid.* 12. Solutions de Descartes, *ibid.* 16. Celle de Newton, *ibid.* 18

V.

*Viete.* Il donne une expression en termes infinis pour représenter le cercle. Son approximation en onze chiffres, III. 3. Autres inventions sur la mesure approchée du cercle. Note de l'art. 7. III.

*Vincenc* (Gregoire de S.), Géometre célèbre, recherche de bien des manieres la Quadrature du cercle, & croit enfin l'avoir trouvée, & même de plusieurs façons. Exposition de sa quadrature principale. Elle est attaquée par Huygens, Roberval, Mersenne, le P. Leotaud. Défendue par Sarassa & Ainscom. Histoire de cette querelle. Il est enfin terrassé par Huygens & le P. Leotaud, III. 9.

W.

*Wallis.* Il perfectionne l'arithmetique des infinis, quare un grand nombre de courbes, IV. 2. Il est arrêté au cercle, & imagine ses interpolations. Il donne par ce moyen la valeur du cercle en termes infinis, IV. 3, 4. Son sentiment sur l'impossibilité de la Quadrature absolue du cercle, *ibid.* 5

*Fin de la Table des Matieres.*

---

# L I V R E S

## DE MATHÉMATIQUE

Qui se trouvent chez le même Libraire.

*Ouvrages de M. BEUDOR, Colonel d'Infanterie, ancien Professeur Royal de Mathématiques, &c.*

**N**ouveau Cours de Mathématique à l'usage de l'Artillerie & du Génie, *in-4°.* avec 34 planches, 15 liv.

La Science des Ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification & d'architecture civile, *in-4°.* grand papier, 24 liv.

Architecture Hydraulique, première partie, qui contient l'art de conduire, d'élever & de ménager les eaux pour les différens besoins de la vie, en deux vol. *in-4°.* grand papier, avec 100 planches, 40 liv.

Architecture Hydraulique, seconde partie, qui comprend l'art de diriger les eaux de la mer & des rivières à l'avantage de la défense des Places, du commerce & de l'agriculture; en deux volumes *in-4°.* grand papier, enrichis de 120 planches, 50 liv.

Petit Dictionnaire portatif de l'Ingénieur, *in-8°.* sous presse.

D

**Ouvrages de M. l'Abbé DEYDIER, Pro-**  
**fesseur de Mathématiques aux Ecoles d'Ar-**  
**tillerie de La Fere.**

**Arithmétique des Géomètres, ou Nouveaux**  
**Elémens des Mathématiques, contenant**  
**l'arithmétique, l'algèbre, l'analyse, les**  
**équations du second & du troisième degré,**  
**&c. in-4<sup>o</sup>. Nouvelle édition. Sous presse.**

**La Science du Géometre, contenant les élé-**  
**mens d'Euclide, la Trigonométrie, la Gé-**  
**métrie pratique, le Nivellement, l'Arpen-**  
**tage, les Sections coniques, &c. in-4<sup>o</sup>.**  
**avec près de 50 planches, 15 liv.**

**La Mesure des Surfaces & des Solides, par la**  
**connoissance des centres de gravité, & par**  
**l'arithmétique des infinis, in-4<sup>o</sup>. avec figu-**  
**res, 12 liv.**

**Le Calcul différentiel & le Calcul intégral**  
**expliqués & appliqués à la Géométrie, in-4<sup>o</sup>.**  
**avec figures, 19 liv.**

**La Mécanique générale, pour servir d'intro-**  
**duction aux sciences Physico - Mathéma-**  
**tiques, qui renferme la statique, le jet des**  
**bombes, l'hydrostatique, l'aérométrie &**  
**l'hydraulique, in-4<sup>o</sup>. avec figures, 19 liv.**

**Le parfait Ingénieur françois, ou la Fortifica-**  
**tion, suivant les systèmes de M. de Vauban**  
**& des autres Auteurs qui ont écrit sur cette**  
**science, avec l'attaque & la défense des**  
**Places. Nouvelle édition, augmentée,**  
**in-4<sup>o</sup>. enrichie de 50 planches, 19 liv.**

**Elémens généraux des parties des Mathéma-**  
**tiques nécessaires à l'Artillerie & au Génie,**  
**en deux volumes in-4<sup>o</sup>. avec plus de 60**

- planches, 1745. 24 liv.
- Lettres d'un Mathématicien à un Abbé, où l'on prouve que la matiere n'est pas divisible à l'infini, *in-12*, 2 liv.
- Lettre de M. de Mairan à Madame la M. du Ch. avec la Dissertation sur les forces motrices des corps, & la nouvelle réfutation des forces vives; par M. l'Abbé Deidier, *in-12*, 3 liv.

*Ouvrages de M. OZANAM, de l'Académie des Sciences.*

- Cours de Mathématique, qui comprend les parties de cette science les plus utiles à un homme de guerre, en cinq volumes *in-8°*. avec plus de 200 planches, 40 liv.
- Les Récréations Mathématiques & Physiques, contenant plusieurs problèmes curieux d'arithmétique, de géométrie, de mécanique, d'optique, de gnomonique & de physique, en quatre volumes *in-8°*. avec quantité de figures. Nouvelle édition, 20 liv.

*Traitéz tirés du Cours de Mathématique d'Ozanam.*

- L'Arithmétique, où toutes les parties de cette science sont démontrées d'une manière courte & facile, *in-8°*. *brosh.* 2 liv.
- La Trigonométrie rectiligne & sphérique, avec les Tables des sinus, tangentes & sécantes, & des logarithmes. Par Adrien Wlacq, *in-8°*. 4 liv. 10 s.
- La Méchanique, où il est traité des machines

- simples & composées, &c. *in-8<sup>o</sup>*. 6 liv.
- La Perspective théorique & pratique**, où l'on enseigne la méthode de mettre toutes sortes d'objets en perspective, &c. *in-8<sup>o</sup>*. avec figures, 6 liv.
- La Gnomonique**, où l'on donne la manière de faire des Cadrans solaires sur toutes sortes de surfaces, &c. *in-8<sup>o</sup>*. avec 30 planches, 6 liv.
- Les Elémens d'Euclide** du P. Deschales, avec l'usage de chaque proposition pour toutes les parties des mathématiques. Par M. Audierne, *in-12*. avec 20 planches. Nouvelle édition, 1753. 3 liv.
- Traité de l'Arpentage & du Toisé**, avec un nouveau tarif pour les bois de charpente, *in-12*. nouvelle édition, augmentée. 1747. 3 liv.
- La Géométrie pratique**, contenant la trigonométrie, la longimétrie, la planimétrie & la stéréométrie, avec un Traité de l'arithmétique par géométrie, *in-12*, avec figures, 2 liv. 10 s.
- Usage du Compas de proportion & de l'instrument universel**, avec un Traité de la division des champs, *in-12*. avec figures. Nouvelle édition, 1748. 2 liv. 10 s.
- Méthode de lever les Plans & les Cartes de terre & de mer**, avec toutes sortes d'instrumens & sans instrumens, *in-12*. avec figures. Nouvelle édition, augmentée, 1750. 2 liv. 10 s.
- Méthode générale pour tracer les Cadrans sur toutes sortes de plans**, *in-12*. avec figures. Nouvelle édition. *Sous presse*.



